Акушерство

Примітка: правильна відповідь А

1 Вагітна звернулась в жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності. Вагітність перша, 2 тижні як відчула ворушіння плоду. Скаржиться на спрагу, млявість, зниження апетиту. В анамнезі у батьків цукровий діабет. При обстеженні в аналізі сечі знайдено цукор. Яку патологію можна запідозрити у вагітної?
A *Цукровий діабет
B Анемія вагітних
C Холецистит
D Панкреатит
E Пієлонефрит

2 В пологовий будинок доставлена вагітна 20-ти років в строці 26 тижнів зі скаргами на різку біль в правій поясничній ділянці, високу температуру тіла, періодична лихоманка, часте сечовипускання. При обстеженні симптом Пастернацького - позитивний. Аналіз сечі - все поле зору вкрите лейкоцитами. Яку патологію ви запідозріли у вагітної?
A *Гострий правосторонній пієлонефріт
B Панкреатит
C Гестоз
D Апендицит
E Холецистит

3 В пологове відділення доставлена роділля 30-ти років у терміні 40 тижнів з переймами, які почалися 15 годин тому. Пологи другі. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через кожні 10-15 хвилин. Серцебиття плода ритмічне, 140/хв. Про яке ускладнення пологів іде мова?
A *Первинна слабкість пологової діяльності
B Провісники пологів
C Надмірно сильна пологова діяльність
D Слабкість потуг
E Вторинна слабкість

4 У жіночій консультації взята на облік вагітна 25-ти років з анатомічно звуженим тазом II-го ступеня. Яке ускладнення в пологах найбільш загрозливе?
A *Розрив матки
B Раннє відходження навколоплідних вод
C Випадіння мілких частин плода
D Слабкість пологової діяльності
E Дистрес плода

5 При взятті вагітної на облік, при вимірюванні тазу встановлено розміри 23-25-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:
A *Загальнорівномірнозвужений таз
B Плоскорахітичний таз
C Простий плоский таз

D Косозміщений таз
E Нормальний таз

6 У пологовий будинок поступила вагітна в строці 40 тижнів.Перейми протягом 4-х годин. При зовнішньому обстеженні голівка плода притиснута до входу в малий таз. При вагінальному обстеженні пальпується лобний шов і передній кут великого тім'ячка, надбровні дуги, перенісся. Поставте діагноз:
A *Лобне передлежання голівки
B Ніжне передлежання
C Сідничне передлежання
D Потиличне передлежання
E Лицеве передлежання

7 Акушерку ФАПу викликали до вагітної. Скарги на різкий біль в ділянці дна матки. Підозра на передчасне відшарування плаценти. Вкажіть, яку допомогу необхідно надати:
A *Викликати бригаду швидкої медичної допомоги
B Холод на низ живота
C Ввести знеболюючі препарати.
D Транспортувати в пологове відділення
E Визначити групу крові

8 Вагітна знаходиться в палаті патології з діагнозом: "Передлежання плаценти". Раптово почалася кровотеча. Що потрібно зробити акушерці в першу чергу?
A *Викликати лікаря
B Ввести кровоспинні засобі
C Ввести скоротливі засоби
D Холод на низ живота
E Визначити положення плоду

9 При обстеженні вагітної на УЗД встановлено центральне передлежання плаценти. Вкажіть метод розродження:
A *Операція кесарів розтин
B Вакуумекстракція плода
C Накладання акушерських щипців
D Консервативним шляхом
E Витягування плода за тазовий кінець

10 У породіллі через 20 хвилин після виділення посліду посилились кровянисті виділення з пологових шляхів. Родові шляхи при огляді цілі, дефекту плаценти та оболонок виявлено не було. Матка розслабляється. Кровянисті виділення посилюються. Вкажіть об'єм долікарської допомоги:
A *Провести зовнішній массаж матки, викликати лікаря
B Ввести кровоспинні засоби
C Холод на низ живота
D Ввести спазмолітики
E Напоїти відваром кропиви

11 В жіночу консультацію звернулася першовагітна, дату останньої менструації

не пам’ятає, перше ворушіння плоду відчула 2 місяця тому. Який метод обстеження повинна застосувати акушерка для визначення терміну вагітності?
A *Прийоми Леопольда-Левицького
B Призначення сечі на наявність ХГ
C Вимірювання обводу живота
D Бімануальне обстеження
E Огляд шийки матки у дзеркалах

12 Вагітна 25-ти років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?
A *Нормальний
B Чоловічий
C Плоскорахітичний
D Простий плоский
E Загальнорівномірнозвужений

13 Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:
A *24 тижні
B 20 тижнів
C 16 тижнів
D 28 тижнів
E 32 тижні

14Вагітна 28-ми років прийшла на черговий огляд у ж/к. Акушерка провела зовнішнє акушерське обстеження застосовуючи прийоми Леопольда. Що вона визначила за допомогою другого прийому?
A *Положення плода, позицію та вид позиції
B Рівень стояння дна матки
C Передлежання плода
D Частину плода, що знаходиться у дні матки
E Відношення передлеглої частини до входу в малий таз

15 Пацієнтці призначено взяття мазка на “гормональне дзеркало”. Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження:
A *На межі переднього і бокового склепіння
B На межі заднього і бокового склепіння
C Із заднього склепіння піхви
D Із переднього склепіння піхви
E Із цервікального каналу

16 Акушерка проводить заняття зі старшокласницями про репродуктивну функцію жінки. Що їй відповісти на запитання дівчинки про кількість фізіологічної крововтрати під час нормального менструального циклу?
A *Крововтрата від 50 до 150 мл
B Крововтрата від 160 до 200 мл
C Крововтрата від 30 до 50 мл
D Крововтрата від 150 до 200 мл

E Крововтрата від 180 до 200 мл

17 На прийом в жіночу консультацію прийшла дівчинка 10-ти років, вона цікавиться в якому віці у неї повинна з'явитися перша менструація?
A *12-15 років
B 8-10 років
C 16-18 років
D 18-20 років
E Після 20 років

18 Акушерка веде прийом на ФАПі. Жінка з безпліддям просить надати рекомендації щодо вимірювання базальної температури:
A *Щоденно, вранці в стані спокою
B Щоденно ввечері після менструації
C Щоденно під час менструації
D Щоденно перед сном після менструації
E Вдень і ввечері після менструації

19В жіночу консультацію прийшла жінка для проходження онкопрофогляду. З яких місць акушерка повинна взяти мазки на онкоцитологію?
A *З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки
B З вульварного кільця і склепіння
C З уретри, піхви і цервікального каналу
D З уретри, піхви, анусу
E З цервікального каналу і уретри

20 Акушерка при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, тверда, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода:
A *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання
B Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання
C Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання
D Поперечне положення, друга позиція
E Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання

21 Послідовий період триває 30 хвилин .Ознаки відокремлення плаценти - відсутні, кровотечі немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невідкладної допомоги?
A *Провести ручне відділення та видалення плаценти
B Виміряти АТ
C Ввести спазмолітики
D Ввести утеротоніки
E Покласти холод на низ живота

22 На 4-у добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 38°*C*, з'явився біль внизу живота, лохії мутні з неприємним запахом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A *Післяпологовий ендометрит
B Післяпологовий пельвіоперитоніт
C Післяпологова виразка
D Післяпологовий параметрит
E Післяпологовий перитоніт

23 Пацієнтка 25-ти років,знаходиться на диспансерному нагляді після міхурцевого занеску. На профілактику і своєчасне виявлення якого захворювання спрямовані дії медичного персоналу?
A *Хоріонепітеліома
B Ендометрит
C Саркома
D Ендометріоз
E Фіброміома матки

24 Породілля через 20 хвилин після народження живого доношеного хлопчика масою 4500,0 г знаходиться у пологовій залі. Плацента відділилась самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововтрата у пологах - 350 мл. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслаблюється, зі статевої щілини виділяється кров зі згортками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?
A *Гіпотонічна маткова кровотеча
B Атонічна маткова кровотеча
C Розрив матки
D Розрив шийки матки
E Кровотеча у зв'язку з порушення зсідання крові

25 У роділлі розвинувся напад судом з втратою свідомості. В анамнезі - гестоз другої половини вагітності. Яку невідкладну допомогу необхідно їй надати?
A *Ввести роторозширювач, язикотримачем зафіксувати язик, викликати лікаря
B Дати кисень
C Ввести анальгетики
D Ввести гіпотензивні засоби
E Заспокоїти роділлю, викликати лікаря

26 У вагітної з пізнім гестозом в строці 36 тижнів розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є першочерговим у наданні долікарської допомоги?
A *Звільнити дихальні шляхи,зафіксувати язик
B Ввести еуфілін
C Ввести утеротоніки
D Ввести знеболюючі засоби
E Ввести гіпотензивні засоби

27 Вагітна скаржиться на ядуху, різке збільшення живота. Строк вагітності 29 тижнів. Обвід живота - 120 см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?
A *Багатоводдя
B Гестоз вагітних
C Багатоплiддя

D Міхуровий занесок
E Аномалії розвитку плода

28 На ФАП родичі доставили вагітну 35-ти років. Дві години тому в неї з'явився раптовий біль у животі та незначні кров'янисті виділення із статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча, ОЖ- 89 см, ВСДМ- 29 см. Визначте необхідні заходи у даному випадку:
A *Виклик спеціалізованої швидкої медичної допомоги та термінова госпіталізація до ЦРЛ
B Введення знеболюючих засобів
C Введення утеротонічних засобів
D Введення кровоспинних засобів
E Огляд за допомогою дзеркал

29 Вагітна вперше звернулась в ЖК щодо взяття її на облік. Які документи необхідно заповнити для цього?
A *Індивідуальна картка вагітної і роділлі (Ф 111-У)
B Картка амбулаторного хворого(Ф 025-У)
C Обмінна картка (Ф 113-У)
D Контрольна картка диспансерного хворого (Ф 030-У)
E Історія пологів (Ф 030-У)

30 В ЖК звернулась вагітна в терміні 12 тижнів вагітності. З якою періодичністю вагітна повинна відвідувати жіночу консультацію в 1 половині вагітності?
A *1 раз на місяць
B 2 рази на місяць
C 1 раз на 10 днів
D Щотижня
E 1 раз на тиждень

31 Народився плід вагою - 2800 г, довжиною - 50 см, крик гучний, шкіра рожева. Які ознаки характерні для доношеного плоду?
A *Зріст 50 см
B Маса тіла 2000 г
C Шкіра білого забарвлення
D Тім'ячка на голові дитини закриті
E Шкіра вкрита пушком

32 Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття плоду - 120/хв., дихання глибоке, рефлекси жваві, м'язовий тонус добрий, шкіра рожева:
A *10 балів
B 6 балів
C 1-2 бали
D 8-9 балів
E 12 балів

33 Роділля 24-х років поступила в пологове відділення в кінці першого періоду пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

A *Повне відкриття шийки матки
B Народження посліду
C Народження плоду
D Відкриття шийки матки на 2 см
E Періодичний ниючий біль

34 Вагітна в терміні вагітності 30-ти тижнів. Якому методу знеболювання пологів акушерка повинна навчити вагітну в умовах жіночої консультації?
A *Фізіопсихопрофілактичному методу
B Призначенню гормональних препаратів
C Призначенню анальгетиків
D Пудендальному знеболенню
E Застосуванню інгаляції закису азоту

35 В пологовий будинок поступила вагітна в терміні вагітності 40 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в попереку і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання пологів може застосувати акушерка?
A *Застосувати методи дії на рефлексогенні зони
B Застосувати спазмолітики
C Застосувати інгаляцію закису азоту
D Застосувати анальгетики
E Застосувати гіпотензивні засоби

36 У породіллі, що знаходиться у індивідуальній пологовій залі через 2 години після пологів стан задовільний, матка щільна, лохії кров'янисті, помірні. Тактика акушерки:
A *Транспортувати в післяпологове відділення
B Залишити породіллю в пологовій залі з послідуючим спостереженням
C Виписати породіллю зі стаціонару
D Транспортувати породіллю в гінекологічний стаціонар
E Ввести породіллі утеротонічні засоби

37 Породілля знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки на рівні пупка, лохії кров'янисті, помірні. Яка зараз доба післяпологового періоду?
A *1-3
B 7-8
C 10
D 4
E 5-6
38 Закінчився другий період пологів народженням дитини. Почався третій період пологів, скарг немає. За чим повинна спостерігати акушерка?
A *За ознакою Шредера
B За ознакою Снегірьова
C За ознакою Піскачека
D За ознакою Абуладзе
E За ознакою Гентера

39 До пологового будинку поступила роділля з терміном вагітності 34 тижня, зі скаргами на біль у поперековій ділянці і регулярними переймами по 20-25 секунд

через 7-8 хвилин. Перейми з'явилися 3 години тому. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?
A *З початком передчасних пологів
B З прелімінарним періодом
C З початком фізіологічних пологів
D Зі слабкістю пологової діяльності
E З надмірною пологовою діяльністю

40 До пологового будинку поступає роділля 28-ми років на другі термінові пологи з доношеною вагітністю. При огляді виявлено поперечне положення плоду. Який принцип ведення пологів Ви передбачаєте у даному випадку?
A *Кесарський розтин
B Звичайне ведення пологів
C Накладання акушерських щипців
D Стимулювання пологів
E Плодоруйнівна операція

41 До пологового будинку поступила роділля на другі пологи з терміном вагітності 38 тижнів. Скаржиться на дуже болісні перейми, поведінка - збуджена. При огляді: нижній сегмент матки пере розтягнений, контракційне кільце на рівні пупка. Положення плоду поперечне, голівка збоку матки, зліва. Серцебиття плоду глухе, 120/хв. Яке ускладнення виникло у породіллі?
A *Загрожуючий розрив матки
B Надмірна пологова діяльність
C Дискоординована пологова діяльність
D Передлежання плаценти
E Передчасне відшарування, нормально розташованої плаценти

42 У роділлі, при піхвовому обстеженні, шийка матки згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці плоду. Вкажіть період пологів:
A *І-й період пологів
B ІІ-й період пологів
C ІІІ-й період пологів
D Провісники пологів
E Післяпологовий період

43 При обстеженні вагітної акушерка встановила, що спинка плоду розташована з лівого боку матки, над входом до малого тазу пальпується м'яка, "не чітких" контурів, не балотуюча частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плоду:
A *Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання
B Повздожне положення, друга позиція, головне передлежання
C Повздожне положення, друга позиція, тазове передлежання
D Повздожне положення, перша позиція, головне передлежання
E Поперечне положення плоду, друга позиція

44 До пологового будинку госпіталізують жінку з вагітністю 38 тижнів, у зв'язку з

пізнім гестозом. У приймальному відділенні, під час огляду вагітної на кушетці в неї з'явилися судоми. Які дії акушерки?
A *Викликати лікаря, стежити, щоб вагітна не впала з кушетки
B Викликати лікаря, ввести протисудомні препарати
C Дати наркоз, викликати лікаря
D Ввести гіпотензивні препарати, викликати лікаря
E Розпочати інфузійну терапію

45 У відділення патології вагітних поступила жінка з терміном вагітності 42-43 тижня. Скарг немає. Строк пологів - 3 тижні тому. Який найймовірніший метод обстеження повинна запланувати акушерка?
A *УЗД
B Кардіотокографія
C Кардоцентез
D Абдоменоцентез
E Амніоскопія

46 До пологового будинку госпіталізовано жінку зі строком вагітності 38 тижнів. ВСДМ- 40 см. Над входом до малого тазу визначається велика частина плоду, що балотує. Вислуховується серцебиття плоду зліва нижче пупка - 136/хв., та справа вище пупка - 156/хв. Встановіть діагноз:
A *Багатоплідна вагітність
B Великій плід
C Гідроцефалія плоду
D Тазове передлежання
E Розгинальне передлежання плоду

47 У роділлі через 15 хвилин після народження дитини з'явилися інтенсивні кров'янисті виділення із статевих шляхів. Ознаки відокремлення плаценти- негативні. Які першочергові дії в даному випадку?
A *Ручне відділення та видалення плаценти
B Підготування жінки до ампутації матки
C Підготування жінки до негайної лапаротомії
D Ввести утеротонічні засоби
E Ввести кровоспинні засоби

48 Роділля знаходиться у 1 періоді пологів. Передбачуванна маса плода - 4500 г, перейми різко болючі, роділля занепокоєна, матка у вигляді "піщаного годинника". Яку патологію можна запідозрити?
A *Загроза розриву матки
B Розрив матки,що відбувся
C Розрив шийки матки
D Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
E Передлежання плаценти

49 Що являється межею між великим і малим тазом?
A *Безіменна лінія, мис

B Клубова кістка
C Безіменна лінія
D Гребінь лобкової кістки
E Передня нижня ость

50 Про що говорить відношення спинки плода до передньої чи задньої стінки матки?
A *Вид позиції
B Членорозміщення
C Передлежання
D Позиція
E Вставлення

51 Яке з'єднання кісткового тазу являється рухомим?
A *Крижово-куприкове зчленування
B Лобкове з'єднання
C Куприково-повздошній суглоб
D Куприкові кістки
E Стегновий суглоб

52 Що визначає відношення осі плода до осі матки?
A *Положення плода
B Членорозміщення плода
C Передлежання плода
D Позиція плода
E Вид позиції

53 Скільки площин визначають в жіночому тазу?
A *Чотири
B Три
C Два
D П'ять
E Одну

54 Вагітна 32-х років, поступила в пологове відділення в зв'язку з загрозою передчасних пологів в терміні 32 тижні. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики респіраторного дистрес синдрому?
A *Дексаметазон, бетаметазон
B Преднізолон
C Антибіотики
D Спазмолітики
E Препарати заліза

55 В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першонароджуючої?
A *Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка
B Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка

C Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки
D Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка
E Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім

56 Скільки періодів пологів розрізняють?
A *Три
B Чотири
C П'ять
D Два
E Один

57 Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання:
A *Розгинання голівки
B Згинання голівки
C Додаткове згинання
D Внутрішній поворот голівки потилицею до лона
E Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів

58 При передньому виді потиличного передлежання голівка прорізується:
A *Малим косим розміром
B Великим косим розміром
C Середнім косим розріром
D Прямим косим розрізом
E Вертикальним косим розрізом

59 Що являється провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання?
A *Мале тім'ячко
B Велике тім'ячко
C Середина сагітального шва
D Середина лобного шва
E Підборіддя

60 Який фізіологічний об'єм крововтрати в третьому періоді пологів?
A Не більше 0,5% від маси тіла
B Не більше 1% від маси тіла
C Не більше 3% від маси тіла
D Не більше 2% від маси тіла
E Не більше 5% від маси тіла

61 У повторнонароджуючої через 6 год. активної пологової діяльності відійшли навколоплодові води. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 8 см, плодовий міхур відсутній, в піхві визначаються ніжки плода. Який характер передлежання?
A *Повне ножне передлежання
B Невповне ножне передлежання

C Тазове передлежання
D Неповне тазове передлежання
E Колінне передлежання

62 Ручну допомогу при Цов'янову I починають надавати:
A *З моменту прорізування сідниць
B Після прорізування сідниць
C Після народження плода до нижніх кутів лопаток
D Після народження тулуба
E Після народження до пупка

63 В сучасному акушерстві операції вибору при ніжному передлежанні є:
A *Кесарів розтин
B Ручна допомога по Цов'янову I
C Ручна допомога по Цов'янову II
D Екстракція плода за тазовий кінець
E Екстракція плода за ніжку

64 Яким розміром прорізується голівка при лицевому передлежанні?
A *Вертикальним
B Малим косим
C Прямим
D Середнім косим
E Великим косим

65 Що являється особливістю першого моменту біомеханізму пологів при розгинальних передлежаннях?
A *Розгинання голівки
B Згинання голівки
C Додаткове згинання голівки
D Низьке поперечне стояння стріловидного шва
E Високе пряме стояння голівки

66 Що являється найбільш частою причиною макросомії?
A *Цукровий діабет I тип
B Переношування вагітності
C Ожиріння
D Підлітковий вік першонароджуючої
E Спадкові хворобі

67 Як змінюється ШОЕ під час вагітності?
A *Збільшується
B Зменшується
C Не змінюється
D Незначно збільшується
E Незначно зменшується

68 Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров?

A *У вені пуповини
B У черевному відділі аорти
C У легенях плода
D У печінковій вені
E У стегновій артерії

69 У породіллі на 3-ю добу післяпологового періоду з'явились скарги на підвищення температури до 38,2°*C*, біль унизу живота, гнійні виділення з піхви, слабкість. Об'єктивно: пульс - 98/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., шкіра бліда, живіт м'який, неболючий. Дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Матка м'якувата при пальпації, болюча. При піхвовому дослідженні - відкриття шийки матки до 3 см, виділення гнійні, в помірній кількості. Матка збільшена до 17-ти тижнів вагітності. Вкажіть попередній діагноз:
A *Післяпологовий гострий ендометрит
B Післяпологовий сальпінгоофорит
C Післяпологовий тромбофлебіт
D Післяпологовий параметрит
E Післяпологовий пельвіоперитоніт

70 Через 10 хв. після народження посліду почалась значна кровотеча зі згустками крові із статевих шляхів. Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м'яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:
A *Гіпотонія матки
B Розрив матки
C ДВЗ синдром
D Емболія навколо плодовими водами
E Коагулопатична кровотеча

71 У вагітної раптово почалась кровотеча із статевих шляхів до 200 мл. Вагітність 37 тижнів, положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. При піхвовому дослідженні: канал шийки матки пропускає поперечній палець, у внутрішньому вічкі і навколо нього через склепіння пальпується губчата тканина. Назвіть причину кровотечі:
A *Передлежання плаценти
B Загроза передчасних пологів
C Передчасне відшарування плаценти
D Ерозія шийки матки
E Низьке прикріплення плаценти

72 Вагітна в терміні 35 тижнів скаржиться на головний біль. АТ- 160/100 мм рт.ст. Аналіз сечі в нормі. Набряків немає. З 16-ти років визначає підвищення АТ. Визначте діагноз:
A *Гіпертонічна хвороба
B Прееклампсія легкого ступеня
C Прееклампсія середнього ступеня
D Астеноневротичний синдром
E Епілепсія

73 В ЖК звернулась вагітна 37 тижнів з генералізованими набряками. АТ-170/120 мм рт.ст. Протеінурія - 4 г/л. Гіпотрофія плода. Яка патологія сприяла такому стану?
A *Прееклампсія тяжкого ступеню
B Гіпертонічна хвороба
C Прееклампсія середнього ступеня
D Еклампсія
E Хронічний пієлонефрит

74 Вагітна 40 тижнів. Об'єктивно: АТ- 180/120 мм рт.ст., пологова діяльність відсутня. Набряки нижніх кінцівок, стінки живота та обличчя. Головний біль, порушення зору. Під час госпіталізації - напад судом. Назвіть послідуючу тактику введення вагітної:
A *Протисудомна терапія, кесарів розтин
B Розпочати седативну терапію
C Кесарів розтин
D Провести стимуляцію пологової діяльності
E Нагляд в умовах інтенсивної терапії

75 У вагітної 40 тижнів при огляді зліва від пупка пальпується голівка плоду, прослуховується серцебиття до 150/хв. Вкажіть положення плода:
A *Поперечне положення, I позиція
B Косе положення, I позиція
C Поперечне положення, II позиція
D Тазове положення
E Колінне положення

76 Поступила роділля, термін вагітності 40 тижнів, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри тазу: 27-28-31-17 см. Індекс Соловойова - 14 см, діагональна кон'югата - 9,5 см. Яка форма кісткового тазу?
A *Плоскорахітичний таз
B Поперечнозвужений
C Простий плоский
D Таз нормальних розмірів
E Загальнорівномірнозвужений

77 Першонароджуюча скаржиться на постійну локальну біль в ділянці дна матки, що виникла з початком пологової діяльності, кров'янисті виділення зі статевим шляхів. Серцебиття плода приглушене - 140/хв. За даними УЗД плацента розміщена в попередній стінці з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жінки?
A *Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
B Загроза розриву матки
C Разрив матки, що розпочався
D Дискоординована пологова діяльність
E Емболія навколоплодовими водами

78 У повторновагітної жінки 25-ти років з тяжкою формою інсулінозалежного

діабету настало передчасне повне відшарування плаценти. При кесаревому розтині визначається наявність по лівому ребру матки, передній і задній стінки зліва масивні крововиливи. Матка має мармуровий вид синюшно-багрового кольору. В черевній порожнині до 200 мл геморагічної рідини. Назвіть ускладнення, що виникло:
A *Матка Кувелера
B Гіпотонія матки
C Геморагічний шок
D Емболія навколо плодовими водами
E ДВЗ синдром

79 До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 місяців. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тижнів, м'яка, особливо в області перешийка, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові. Вкажіть ймовірний діагноз:
A *Вагітність 8 тижнів
B Фіброміома матки
C Позаматкова вагітність
D Гастрит
E Дисфункція яєчників

80 Вагітна 25-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на біль внизу живота, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка м'яка, збільшена до 9 тижнів вагітності, цервікальний канал пропускає 1 поперечний палець. У зовнішньому вічку пальпується частини ембріональної тканини. Яке лікування необхідно провести?
A *Інструментальна ревізія порожнини матки
B Нагляд за хворою
C Призначення гормонів
D Гемостатична терапія
E Призначення пролонгуючих вагітність препаратів

81 У роділлі під час пологів з активною пологовою діяльністю. Положення плода поздовжнє, І позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 150/хв. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежить голівка, визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позаду - передній кут великого тім'ячка. Вкажіть передлежання плода:
A *Лобне передлежання
B Лицьове передлежання
C Передньоголовне передлежання
D Тазове передлежання
E Колінне передлежання

82 Вагітна 40 тижнів І пологи, ІІ-й період. Народився хлопчик масою - 2400 г, зріст - 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення ІІ-го плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику послідуючого ведення пологів:

A *Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку
B Кесарів розтин
C Амніотомія, консервативний метод ведення пологів
D Амніотомія, стимуляція пологової діяльності
E Вичікувальна тактика

83 Вагітна в терміні 8-9 тижнів скаржиться на блювання до 15-17 разів на добу, значну слинотечу. За 2 тижні зменшила вагу на 10 кг. АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., шкіра суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. Вкажіть ймовірний діагноз:
A *Тяжка форма блювання
B Рвота вагітної середньої тяжкості
C Хвороба Боткіна
D Харчова токсикоінфекція
E Рвота вагітної легкого ступеню

84 Вагітна звернулась в ЖК 37 тиж. вагітності. Об'єктивно: вагітна низького росту, є невелике викривлення гомілок, виражений поперековий лордоз. Розміри тазу: 26-26-31-17. Індекс Соловйова - 16. Ромб Михаеліса - вертикальний розмір - 8 см, горизонтальний - 9 см. Мис досяжний. Діагональна кон'югата - 10 см. Вкажіть форму вузького тазу:
A *Плоскорахітичний таз
B Простий плоский таз
C Поперечнозвужений таз
D Загальнорівномірнозвужений таз
E Косозміщений таз

85 Вагітна 35-ти років, стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору., миготіння "мушок" перед очима. Об'єктивно: генералізований набряк, АТ- 180/120 мм рт.ст. Зненацька з'явились фібрілярні посмикування м'язів обличчя. Тонічні судоми. Дихання зупинилось. Через 1 хв. дихання відновилось, з рота - значна кількість піни. Амнезія. В аналізі сечі: білок - 7 г/л. Вкажіть ймовірний діагноз:
A *Еклампсія
B Гіпертонічний криз
C Епілепсія
D Черепно-мозкова травма
E Пре еклампсія тяжкого ступеня

86 При огляді плаценти, що народилась, встановлено наявність дефекту 2х3 см. Кровотечі немає. Визначте тактику ведення породіллі:
A *Ручна ревізія порожнини матки
B Нагляд за породіллею
C Призначення утеротоніків
D Інструментальна ревізія порожнини матки
E Зовнішній масаж матки

87 До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об'єктивно: матка збільшена до 8-ми тижнів

вагітності. Цервікальний канал закритий, виділення незначні, кровянисті. Попередній діагноз:
A *Загрозливий викидень.
B Аборт в ходу
C Фіброміома матки
D Дисфункція яєчників
E Міхуровий занесок

88 Повторнонароджуюча 26-ти років, перейми почалися 10 год. тому. Через 2 год. відійшли навколоплодові води. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, обвід живота - 96 см, ВСДМ- 38 см. Перейми через кожні 4-5 хв., по 15 с. шийка матки згладжена, відкриття вічка - 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло?
A *Первинна слабкість пологової діяльності
B Вторинна слабкість пологової діяльності
C Клінічно вузький таз
D Дискоординована пологова діяльність
E Передчасне відходження навколо плодових вод

89 У роділлі 40-а років з доношеною вагітністю, відійшли навколоплодові води 8 год. тому. При вагінальному дослідженні: виявлено фіброматозний вузол, який виходить з передньої стінки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голівка плода знаходиться високо. В анамнезі: І нормальні пологи та І штучний аборт, що ускладнився субінволюцією матки. Проведено родорозрішення методом кесаревого розтину з послідуючою екстирпацією матки без придатків. Назвіть причину вибору тактики ведення:
A *Локалізація пухлини та її величина
B Вік роділлі
C Ускладнений акушерський анамнез
D Тривалий безводний період
E Високе стояння голівки

90 Першороділля 28-ми років з прееклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу: 25-28-31-21 см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плода не вислуховується.Напад еклампсії. Вагінально: відкриття шийки матки повне, голівка у вузькій частині малого тазу. Тактика ведення пологів:
A *Протисудомна терапія, плодоруйнівна операція
B Кесарів розтин
C Вакуум-екстракція плода
D Стимуляція пологової діяльності
E Полоки через природі пологіві шляхи

91 Жінка народила дитину масою 4200 г. Перінеотомія ускладнилась розривом промежини ІІ-го ступеня. Що при цьому залишилось неушкодженим?
A *Сфінктер прямої кишки
B М’язи тазового дна
C Шкіра промежини
D Слизова оболонка піхви

E Задня спайка

92 У породіллі масивна кровотеча після народження двійні. Дитяче місце та пологові шляхи цілі. Дно матки вище пупка, матка при пальпації м'яка, не реагує на введення скорочуючих матку засобів. Вкажіть найбільш вірогідну причину кровотечі:
A *Атонія матки
B Гіпотонія матки
C Розрив матки
D Розрив шийки матки
E Затримка додаткової дольки плаценти

93 ІІ-й період І-х пологів: при бімануальному дослідженні шийка матки розкрита повністю, навколоплодовий міхур відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює крижову западину, сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Визначте знаходження голівки:
A *В площині виходу малого тазу
B Малим сегментом площині входу
C Великим сегментом площині входу
D В площині широкої частини малого тазу
E В площині вузької частини малого тазу

94 Першовагітна звернулась в жіночу консультацію з приводу вагітності 10 тижнів зі скаргами на задишку, серцебиття, незначний акроціаноз, швидку втомлюваність. На диспансерному обліку у кардіолога з діагнозом: "Ревматизм, активна фаза, ревмокардит. Комбінована митральна вада серця з перевагою стенозу. Порушення кровообігу в ІІІ-й стадії". Який план ведення пацієнтки?
A *Переривання вагітності за медичними показаннями
B Амбулаторне лікування
C Штучне переривання вагітності
D Госпіталізація в терміні до 12 тижнів, 26-28, 36-37 тижнів
E Переривання вагітності в пізньому терміні

95 В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ- 100 см, ВСДМ- 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лєбєдєва:
A *3500 г
B 2800 г
C 4500 г
D 2500 г
E 4000 г

96 Пацієнтка 20-ти років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем встановлено вагітність 7-8 тижнів. Який документ оформляється при взятті на облік по вагітності?
A *Індивідуальна карта вагітної і породіллі

B Обмінна карта
C Амбулаторна карта
D Історія пологів
E Контрольна карта диспансерного спостереження

97 Акушерка жіночої консультації пояснює першовагітній, як часто необхідно з'являтись на прийом. Кількість відвідувань жіночої консультації при фізіологічному перебігу вагітності складає:
A *10-12 відвідувань
B 28-30 відвідувань
C 18-20 відвідувань
D 15 відвідувань
E 13-14 відвідувань

98 Молода жінка планує народити дитину. Вона цікавиться у акушерки, коли вагітна жінка повинна стати на облік у жіночій консультації. Що має відповісти акушерка пацієнтці?
A *До 12 тижнів вагітності
B У будь-якому терміні вагітності
C До 30 тижнів вагітності
D До 20 тижнів вагітності
E Після 12 тижнів вагітності

99 Вагітна 25-ти років звернулась в жіночу консультацію для взяття на облік. Акушерка виміряла зовнішні розміри тазу і з'ясувала, що вони нормальні. Які розміри тазу у жінки?
A *25-29-30-20
B 25-27-27-18
C 24-26-29-18
D 23-26-27-16
E 26-28-30-18

100 При огляді шийки матки у дзеркалах акушерка побачила, що шийка конічної форми, рожевого кольору, зовнішнє вічко має круглу форму. Це свідчить про те, що жінка:
A *Не народжувала
B Літнього віку
C Народжувала
D Вагітна
E Має захворювання шийки матки

101 Жінка 19-ти років звернулась до ФАПу. Акушерка з'ясувала, що у жінки затримка менструації 3 тижні. При огляді: ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки, матка збільшена, розм'якшена в ділянці перешийка, асиметрична. Ці зміни акушерка розцінила як:
A *Ймовірні ознаки вагітності
B Сумнівні ознаки вагітності
C Вірогідні ознаки вагітності
D Порушення менструального циклу

E Пухлину матки

102 Під час огляду вагітної акушерка встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна “балотуюча” частина. Визначте положення, позицію та передлежання плода:
A *Поздовжнє положення, І позиція, головне передлежання
B Поздовжнє положення, ІІ позиція, тазове передлежання
C Поперечне положення, ІІ позиція, головне передлежання
D Поздовжнє положення, І позиція, тазове передлежання
E Поздовжнє положення, ІІ позиція, головне передлежання

103 Вагітна 24 роки, з’явилась на черговий прийом у жіночу консультацію. Акушерка виміряла ВСДМ, ОЖ, провела аускультацію. Серцебиття плода - 130/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:
A *І позиція, передній вид, головне
B І позиція, передній вид, тазове
C ІІ позиція, передній вид, головне
D І позиція, задній вид, тазове
E ІІ позиція, задній вид, головне
104 Вагітній 31 рік, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання: ОЖ дорівнює 90 см, ВСДМ дорівнює 30 см. Яка передбачувана маса плода?
A *2700 г
B 3100 г
C 3000 г
D 2900 г
E 2500 г

105 У першовагітної в терміні вагітності 38-ми тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?
A *Перший період
B Другий період
C Передвісники пологів
D Третій період
E Загроза передчасних пологів

106 Акушерка спостерігає за роділлею у пологовій залі. Як часто треба вислуховувати серцебиття плода у активній фазі ІІ періоду пологів?
A *Після кожної потуги
B Кожні 5 хвилин
C Після двох потуг
D Після трьох потуг
E Кожні 30 хвилин

107 Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом акушерки. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?
A *2 години

B 3 години
C 6 годин
D 24 години
E 48 годин

108 В післяпологовому відділенні оглянуто породіллю. При об'єктивному встановлено, що дно матки розміщено на рівні пупка, лохії кров'янисті. Вкажіть, для якої доби післяпологового періоду характерні такі дані?
A *Першої
B Другої
C Третьої
D Четвертої
E П'ятої

109 У першонароджуючої, 20-ти років, народився хлопчик вагою - 3200 г. Через 10 хв. при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака відокремлення плаценти була використана?
A *Кюстнера-Чукалова
B Альфельда
C Довженко
D Шредера
E Клейна

110 У породіллі 29-ти років, вагою - 70 кг, ранній післяпологовий період. Акушерка стежить за об'ємом крововтрати. Який об'єм крововтрати під час пологів є фізіологічним у даному випадку?
A *350 мл
B 400 мл
C 450 мл
D 500 мл
E 550 мл

111 Породілля 21 рік, народила живого доношеного хлопчика вагою - 3500 г. Стан породіллі задовільний, температура - 36,7°*C*, лохії, кров'янисті в помірній кількості, матка скорочується. Дитина здорова. Жінка цікавиться, коли її випишуть з пологового будинку?
A *На 3 добу
B Через 2 тижні
C Через тиждень
D На 10 добу
E На 7 добу

112 На прийомі у жіночій консультації жінка повідомила, що остання менструація у неї була 03.07.2011 р. Вирахуйте передбачуваний термін пологів:
A *10.04.2012 р.
B 03.04.2012 р.
C 03.07.2012 р.
D 15.12.2011 р.
E 25.10.2012 р

113 Доакушерки ФАПу звернулась вагітна в терміні 6 тижнів вагітност ізі скаргами на блювання 5-6 разів надень, нудоту, відразу до деяких продуктів, порушення сну, підвищену втомлюваність. Який діагноз має поставити акушерка?
A *Раннійгестозвагітних
B Отруєння
C Порушення засвоєння їжі
D Порушення режиму сна
E Виразкова хвороба

114 Дільнична акушерка жіночої консультації проводить бесіду з вагітною з приводу особливостей її харчування. Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної за тиждень у другій половині вагітності?
A *300-350 г
B 700-800 г
C 600-700 г
D 500-600 г
E 400-450 г

115 У вагітної 35 тижнів, набряки ніг, рук, передньої черевної стінки. АТ- 160/100 та 170/105 мм рт.ст., головний біль. В сечі білок - 3 г/л. Якою повинна бути тактика акушерки ФАПу після огляду вагітної?
A *Терміново госпіталізувати до пологового будинку
B Призначити гіпотензивні препарати
C Рекомендувати відвідати лікаря
D Обмежити вживання рідини та солі
E Призначити сечогінні препарати

116 У відділенні патології вагітних знаходиться вагітна з пізнім гестозом. Раптово в неї розвинувся напад судом. Що з перерахованого є першочерговим при наданні долікарської допомоги?
A *Звільнення прохідності дихальних шляхів
B Подача кисню
C Інгаляційний наркоз
D Вимірювання артеріального тиску
E Введення протисудомних засобів

117 На диспансерному обліку в жіночій консультації в групі підвищеного ризику знаходяться вагітні з різними ускладненнями. Для якої з них можна прогнозувати фізіологічні пологи через природні пологові шляхи?
A *Прееклампсія легкого ступеня
B Вади серця з явищами декомпенсації
C Повне передлежання плаценти
D Анатомічно вузький таз III-го ступеня
E Міопія високого ступеня

118 На прийомі у акушерки ФАПу вагітна 29 тижнів поскаржилась на періодичні, раптово виникаючі кров'янисті виділення зі статевих шляхів, що не супроводжуються болем. На момент звернення виділень немає. Яку тактику

повинна вибрати акушерка?
A *Викликати “Швидку допомогу”, госпіталізувати до пологового будинку
B Призначити ліжковий режим
C Рекомендувати відвідати лікаря
D Відвідати жінку наступного дня
E Викликати на консультацію хірурга

119 У роділлі 24-х років 30 хв. тому народилася дитина вагою 4200 г. Ознаки відділення плаценти відсутні. Крововтрата досягла 250 мл. Яку допомогу має надати акушерка?
A *Провести ручне відшарування та виділення посліду
B Видалити послід по Креде-Лазаревичу
C Видалити послід по Абуладзе
D Ввести скорочуючі засоби
E Ввести кровоспинні засоби

120 Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і дольками. Розривів м’яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, із статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?
A *Зовнішній масаж матки
B Ручна ревізія порожнини матки
C Міхур з льодом на низ живота
D Введення кровоспинних препаратів
E Введення кровозамінників

121 Акушерка післяпологового відділення виявила у породіллі на 3 добу почервоніння в ділянці швів на промежині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в цьому випадку?
A *Зняти шви
B Провести оброблення швів
C Призначити антибіотики
D Провести туалет породіллі
E Покласти холод на ділянку швів

122 На ФАП звернулась першороділля 20-ти років зі скаргами на болючі перейми, які тривають протягом 3-х годин. При пальпації живота: нижній сегмент матки перерозтягнутий, болючий, голівка плода високо над входом в таз. Контракційне кільце розміщене косо. Розміри таза: 22-25-27-16. Яку невідкладну допомогу повинна надати акушерка?
A *Припинити пологову діяльність (токолітики, анальгетики)
B Викликати акушерську бригаду
C Транспортувати роділлю до найближчої лікарні
D Визначити групу крові, викликати донорів
E Розпочати інфузію кровозамінників

123 Старша акушерка жіночої консультації знайомить дільничних акушерок з їх посадовими інструкціями. Що **НЕ ВХОДИТЬ** до обов’язків акушерки жіночої консультації?

A *Призначати лікування хворим
B Готувати інструментарій до проведення прийому
C Брати мазки на різні види досліджень
D Зважувати вагітних, вимірювати АТ
E Вести медичну облікову документацію

124 У вагітної діагностовано загальнорівномірнозвужений таз ІІ-го ступеню. Яку тактику повинна обрати акушерка для профілактики ускладнень під час пологів?
A *Госпіталізувати вагітну до пологового будинку у 37-38 тижнів
B Призначити коригувальну гімнастику
C Госпіталізувати вагітну у разі злиття навколоплідних вод
D Госпіталізувати у 35-36 тижнів
E Призначити відвідування жіночої консультації щотижня

125 Роділля 25-ти років щойно народила живого доношеного хлопчика вагою 3600 г. Який лікарський засіб введе акушерка роділлі у ІІІ-у періоді пологів для профілактики гіпотонічної кровотечі?
A *Окситоцин
B Вікасол
C Дицинон
D Но-шпу
E Кальцію хлорид

126 Породілля 22-х років, народила доношену дитину. Послід народився самостійно. При огляді плаценти акушерка помітила відсутність її частки. Крововтрата - 250 мл і триває. Яку допомогу повинна надати акушерка?
A *Ручна ревізія порожнини матки і масаж на кулаці
B Зовнішній масаж матки
C Ввести окситоцин
D Ввести дицинон
E Налагодити інфузію 0,9% розчину натрію хлорида

127 На диспансерному обліку на ФАПі знаходиться жінка, у якої в анамнезі в попередніх пологах виникла прееклампсія. Якими препаратами акушерка буде проводити профілактику гестозу під час наступної вагітності?
A *Аспірин
B Спазмолітики
C Білкові препарати
D Антикоагулянти
E Дезінтоксикаційна терапія

128 Акушерка проводить бесіду з породіллею. Який метод профілактики післяпологового маститу вона може порадити?
A *Гігієна молочних залоз
B Раціональне харчування
C Оброблення сосків антисептичними розчинами
D Туалет статевих органів
E Годування дитини кожні 3 години

129 До пологового будинку поступила вагітна 27-ми років, вагітність 40 тижнів, головне передлежання прееклампсія II-го ступеня. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження акушерка запідозріла розгинальне (лобне) передлежання. Що вказує на лобне передлежання?
A *Кут між спинкою та потиличною частиною голівки плода
B Голівка плода розташована на входом в малий таз
C Набряки нижніх кінцівок та передньої стінки живота
D Серцебиття плода вислуховується вище пупка
E Спинка плода обернена до лівого боку матки

130 До гінекологічного відділення доставлена жінка 28-ми років, з кровотечею, якій був поставлен діагноз "міхуровий занесок". Визначте першочергові дії невідкладної допомоги:
A *Видалення міхурового залишку із матки
B Призначення кровоспинних препаратів
C Призначення кровозамінників
D Призначення антибіотиків
E Оперативне лікування

131 До акушерки ФАПу з'явилася вагітна 21-го року, для взяття на облік по вагітності. В якому терміні вагітності буде їй призначене УЗД обстеження:
A *11-12 тижнів; 20-21 тижнів
B 16-18 тижнів; 25-26 тижнів
C 12-13 тижнів; 27-28 тижнів
D 30-32 тижня
E Тільки при взятті на облік по вагітності

132 Пологи завершилися народженням живого хлопчика масою 4500 г, зріст - 52 см.Через 10 хв. почалась маткова кровотеча. Плацента відокремлена рукою, проведений масаж матки на кулаці, внутрішньовенно введено розчин окситоцину. Через 10 хв. кровотеча повторилась. Консервативні методи підвищення скоротливої діяльності матки не дали ефекту. Крововтрата за 40 хв. боротьби з кровотечею складає понад 1200 мл. Яка тактика подальшого ведення пологів?
A *Хірургічна зупинка кровотечі
B Повторне введення розчину окситоцину
C Вишкрібання матки
D Зовнішній масаж матки
E Накладання швів на шийку матки

133 Породілля 28-ми років, пологи I, термінові. На другу добу з'явились скарги на біль в ділянці симфізу, що підсилюються під час рухів. При пальпації лонного зчленування виявляється біль та щілина між лонними кістками завширшки 0,8 см. Показники крові та сечі без патологічних змін. Яке найбільш ефективне лікування?
A *Іммобілізація у гамаку, знеболюючі засоби
B Металоостоесинтез
C Лікування у травматологічному відділенні
D Корсет на 6 місяців
E Гіпсова пов'язка на ділянку таза

134 Роділля знаходиться в перед пологовій палаті. В анамнезі: перфорація матки під час аборту. Пологова діяльність дуже сильна, перейми різко болючі, не продуктивні, матка пере розтягнута, болюча при пальпації. Контракційне кільце розташоване високо і косо. Голівка знаходиться над входом в малий таз, жінка збуджена. Ваша тактика при загрозі розриву матки?
A *Припинити пологову діяльність
B Стимулювати пологову діяльність
C Вичікувальна тактика
D Заспокоїти роділлю
E Ввести знеболюючі засоби

135 Роділля у ІІІ-го періоді пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одномоментно виділилося 400 мл крові, кровотеча продовжується. Під час огляду встановлено відсутність однієї дольки. Яка тактика при затриманні часток плаценти в матці?
A *Ручне обстеження порожнини матки
B Випускання катетером сечі
C В/в введення кровоспинних
D В/в введення утеротонічних засобів
E Зовнішній масаж матки

136 У породіллі 30-ти років, на 4 добу післяпологового періоду з'явився озноб, болючість у надлобковій ділянці, підвищення температури до 38,8°*С*, лохії стають мутними, з неприємним запахом. Якому захворюванню відповідає клінічна картина?
A *Післяпологовий ендометрит
B Пельвіоперитоніт
C Післяпологовий мастит
D Сальпіногоофорит
E Післяпологова виразка

137 Роділля 28-ми років, яка знаходиться у І-у періоді пологів, скаржиться на сильні перейми. Жінка збуджена, неспокійна, нижній сегмент матки перерозтягнутий, різко болючий при пальпації, матка між переймами не розслабляється. В сечі домішки крові. Серцебиття плода приглушене, 100/хв. Вкажіть для якого ускладнення характерні дані симптоми:
A *Загроза розриву матки
B Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
C Передлежання плаценти
D Розрив промежини
E Розрив шийки матки

138 У першовагітної при вимірюванні зовншніх розмірів тазу ґудзики тазоміра були притиснуті до зовнішніх країв передньоверхніх остей клубових кісток. Який розмір таза було виміряно у вагітної?
A **D. spinarum*
B *D. cristarum*
C *D. trochanterica*

D *Con. externa*
E *Con. diagonalis*

139 При зовнішньому акушерському дослідженні повторновагітної визначено: чітке “балотування” голівки плода над входому таз. Який з імовірних методів дослідження було використано?
A *III-й прийом
B I-й прийом
C II-й прийом
D IV-й прийом
E Аускультація

140 У породіллі в післяпологовому періоду на 4-у добу матка тверда, безболісна, дно її розташовано вище лобкового симфізу на 12 см. Визначити характер лохії:
A *Кров’янисто-серозні
B Кров’янисті
C Серозно-кров’янисті
D Серозні
E Слизові

141 При зовнішньому акушерському дослідженні вагітної проведено вислуховування серцебиття плода: ритмічне, 130/хв., вислуховується праворуч вище пупка. Визначте розташування плода в порожнині матки:
A *Положення поздовжнє, II позиція, передлежання сідничне
B Положення поперечне, II позиція
C Положення поздовжнє, I позиція передлежання головне
D Положення поздовжнє, II позиція, передлежання головне
E Положення поздовжнє, I позиція, передлежання сідничне

142 Роділля у III-у періоді пологів. Ознак відшарування плаценти немає. Раптово почалась значна кровотеча із статевих шляхів. Крововтрата - 500 мл. Що з переліченого потрібно зробити у першу чергу?
A *Зовнішний масаж матки, ручне відокремлення та видалення плаценти
B Зовнішні прийоми виділення плаценти
C Зовнішний масаж матки
D Масаж матки на кулаці
E Тампонаду матки

143 Роділля з головним передлежанням плода у I-у періоді пологів. Почалась кровотеча із пологових шляхів. Шийка матки відкрита на 3 пальця, внутрішній зів повністю закритий губчастою тканиною. Який метод розродження потрібно обрати?
A *Провести кесарів розтин
B Очікувальну тактику
C Накласти шкірно-головні щипці
D Провести амніотомію
E Провести вакуум-естракцію плоду

144 Роділля в терміні 38 тижнів. Хворіє на ревматичний ендокардит. В II-у періоді

з'явилась задишка, серцебиття. Голівка плода в порожнині таза. Серцебиття плода - 160/хв., приглушене. Яка подальша тактика пологів?
A *Вакуум-естракція
B Консервативне
C Кесарів розтин
D Епізіотомія
E Краніотомія

145 Породілля на другу добу після пологів. На промежині раньова поверхня вкрита сірим нальотом, який важко знімається. Навколо рани тканини набряклі, гіперемійовані. До якої з перелічених груп відноситься це захворювання?
A *І етап післяпологової інфекції
B Неінфекційні післяпологові захворювання
C ІІ етап післяпологової інфекції
D ІІІ етап післяпологової інфекції
E IV етап післяпологової інфекції

146 У першороділлі в І періоді пологів перейми стали часті та дуже болючі. Контраційне кільце розташовано косо на рівні пупка. Нижній сегмент матки пере розтягнутий, болісний при пальпації. Симптом Вастена позитивний. Серцебиття плода - 140/хв. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Загроза розриву матки
B Розрив промежини
C Розрив шийки матки
D Розрив матки, що почався.
E Розрив матки який стався

147 Роділля у ІІ-у періоді пологів. При піхвовому дослідженні визначено лицьове передлежання плода. Яким розміром прорізується голівка?
A *Вертикальним
B Малим косим
C Середнім косим
D Великим косим
E Прямим

148 Після прийому нормальних пологів, при оформленні історії пологів, акушеркою була зафіксована фізіологічна крововтрата. Який відсоток крововтрати відносно маси тіла породіллі враховувався?
A *0,5%
B 0,1%
C 1,0%
D 1,5%
E 2,0%

149 У породіллі після народження посліду почалась незначна кровотеча. Матка щільна, її дно на 2 пальця над пупком. При огляді на оболонках знайдені обірвані сосуди. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Додаткова долька плаценти
B Часткове прирощення плаценти

C Повне прирощення плаценти
D Гіпотонія матки
E Гіпофібріногенемія

150 Роділля у ІІІ-у періоді пологів. Через 15 хвилин після народження дитини почалась незначна кровотеча. Ознаки відокремлення плаценти позитивні. Крововтрата - 200 мл. Що з переліченого потрібно зробити першу чергу?
A *Виділити плаценту зовнішнім прийомом
B Запропонувати роділля потужитись
C Зовнішній масаж матки
D Ввести окситонцин
E Ручне відокремлення і виділення плаценти

151 Першовагітна 20-ти років з інтенсивною родовою діяльністю. Скарги на головний біль, порушення зору, заторможеність. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плоду в порожнині малого тазу. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 180/хв. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?
A *Накладання акушерських щипців
B Кесарів розтин
C Плодоруйнівна операція
D Стимуляціяпологової діяльності
E Консервативне ведення пологів з епізіотомією

152 Роділля, 35-ти років, з батоплідною вагітністю у терміні 38-ми тижнів поступила у пологове відділення з регулярними переймами, що почались 6 годин тому. Через 2 години народилася жива дівчинка масою - 2700 г. Що необхідно зробити в першу чергу згідно плану ведення пологів?
A *Амніотомія
B Піхвове дослідження
C Пальпація живота
D Аускультація серцебиття
E Вимірювання АТ

153 У пологове відділення доставили вагітну в терміні пологів. Виникла різка невідповідність між тазом матері та головою плоду. Шийка матки відкрита повністю. Голівка плода фіксована у вході в таз. Серцебиття плода не вислуховується. Яку з перелічених операцій краще застосувати?
A *Краніотомію
B Декапітацію
C Евентрацію
D Спонділотомію
E Клейдотомію

154 Жінка, 27-ми років, звернулась до жіночої консультації для взяття на обік з приводу вагітності. Які обов’язкові вимірювання зовнішніх розмірів таза необхідно провести?
A *3 поперечних і 1 прямий
B 1 поперечний і 3 прямих
C 2 поперечних і 2 прямих

D 1 поперечний і 3 косих
E 2 поперечних і 2 косих

155 Жінка, 29-ти років, звернулась до жіночої консультації з приводу взяття на облік по вагітності. Підчас піхвового дослідження проведено вимірювання діагональної кон'югати, яка дорівнює 12,5 см. Яке вимірювання необхідне для більш точного визначення акушерської кон'югати?
A *Індексу Соловйова
B Кон'югати Цангемейстера
C Ромбу Міхаеліса
D Кон'югати Кернера
E Кон'югати Белодока

156 Роділля з активною пологовою діяльністю. Відійшли прозорі навколоплідні води. Серцебиття плода стало приглушеним, 100/хв., аритмічне. Розкриття шийки матки на 4 см, плідного міхура немає. Передлежить голівка над входом в малий таз, попереду голівки визначається пульсуюча петля пуповини. Яка подальша тактика пологів?
A *Кесарів розтин
B Акушерські щипці
C Кожно головні щипці Уілл-Іванову
D Родостимуляція
E Плодоруйнувальна операція

157 Жінка в терміні вагітності 8-9 тижнів скаржиться на нудоту, блювання більше 20 разів на добу, слабкість, зниження маси тіла. Шкіра бліда, суха, температура субфебрильна, АТ - знижений, олігурія, живіт втягнутий. Відмічається затримка стільця. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Блювота важкого ступеня
B Блювання вагітної середнього ступеня
C Блювання вагітної легкого ступеня
D Гострий апендицит
E Харчова токсикоінфекція

158 Після огляду посліду акушерка визначила, що у часточках плаценти багато петрифікатов і некротизованих ділянок. Маса посліду на 200 г. більше ніж нормальна. Про що це свідчить?
A *Переношену вагітність
B Недоношену вагітність
C Екстрагенітальну патологію
D Нормальну вагітність
E Багатоплідну вагітність

159 Породілля 35-ти років, на 12-у добу після пологів. Пологи ускладнились безводним проміжком у 17 годин. Скаржиться на біль унизу живота, здуття живота, підвищення температури тіла до 39,5°*С*. При бімануальному дослідження матку та придатки пальпувати не вдається через болючість. Симптом Щьоткіна-Блюмберга позитивний, зниження перистальтики. В крові - лейкоцитоз із різким зсувом формули вліво та збільшення ШОЕ. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Перитоніт

B Сальпінгоофоріт
C Метроендометрит
D Параметрит
E Метротромбофлебіт

160 Вагітній в терміні 39 тижнів проведено зовнішнє акушерське дослідження :в дні матки промацується щільна округла частина з виразними контурами, легко балотує. Ліворуч, на боковій поверхні матки, промацується частина плода у вигляді рівномірної площини, праворуч - невеликі виступи. Над входом у таз визначається велика, м'яка, округлої форми передлегла частина, не балотує. Визначити розташування плода:
A *Положення поздовжнє, I позиція, передлежання тазове
B Положення поздовжнє, II позиція, передлежання головне
C Положення поздовжнє, I позиція, передлежання головне
D Положення поздовжнє, II позиція, передлежання тазове
E Положення косе, II позиція, передлежання головне

161 Вагітній в терміні вагітності 36 тижнів проведено зовнішнє акушерське дослідження: у дна матки промацується велика м'якувата частина, ліворуч, на боковій поверхні матки, промацується частина плода у вигляді рівномірної площини, праворуч - невеликі виступи. Над входом у таз визначається щільна округла частина з виразними контурами, легко балотує. Визначити розташування плода:
A *Положення поздовжнє, I позиція, передлежання головне
B Положення поздовжнє, I позиція, передлежання тазове
C Положення поздовжнє, II позиція, передлежання головне
D Положення поздовжнє, II позиція, передлежання тазове
E Положення косе, II позиція, передлежання головне

162 У юної першовагітної, яка не була обстежена, передбачений строк пологів визначений за способом Негеле. Які дані при цьому були використані?
A *Дата 1-го дня менструації
B Дата одноразового статевого акту
C Дата овуляції
D Дата першого відчуття рухів плода
E Дані ультразвукового дослідження

163 При піхвовому дослідженні виявлено: матка дещо збільшена, визначається пом'якшення перешийка та посилений перегин матки наперед. За якою ознакою можливо передбачити вагітність?
A *Гентера
B Горвіца-Гегара
C Губарева
D Піскачева
E Снєгірьова

164 При первинній явці у жіночу консультацію буди проведені дослідження, які підтвердили вагітність. Які з досліджень є вірогідними?
A *Пальпація частин плода

B Припинення менструації
C Збільшення матки
D Ціаноз слизової оболонки піхви
E Поява молозива з молочних ходів

165 Упершородяща 34 роки, поступила в акушерський стаціонар із регулярною пологовою діяльністю. Розміри таза: 22-25-27-17 см. Ромб Міхаеліса витягнутий в довжину (верхній і нижній кути гострі, а бічні тугі). Яка форма таза має місце у даної роділлі?
A *Загальнорівномірнозвужений
B Простий плоский
C Нормальний таз
D Плоскорахітичний
E Загальнозвужений плоский

166 Роділля 40-а років, доставлена у важкому стані в акушерський стаціонар. Жінка в'яла, апатична. Шкіра і слизові оболонки бліді, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Під передньою черевною стінкою палькується плід. Серцебиття плода не вислуховується, ворушіння плода відсутні. Пологова діяльність припинилась. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Розрив матки, що стався
B Центральне передлежання плаценти
C Передчасне відшарування плаценти
D Загрожуючий розрив матки
E Розрив матки, що розпочався

167 Роділля 29-ти років, доставлена в пологове відділення із частими, сильними і болючими переймами. Роділля збуджена. Контракційне кільце досягає рівня пупка і розташоване косо. Сечовипускання утруднене. Яка невідкладна допомога в даному випадку?
A *Зупинити пологову діяльність
B Ввести знеболюючі засоби
C Ввести утеротонічні засоби
D Покласти холод на низ живота
E Ввести кровоспинні засоби

168 Роділля 36-ти років, доставлена у пологове відділення із пологовою діяльністю. Через 15 хвилин народилася жива, доношена дівчинка масою 3950 г. Із статевих органів роділлі з'явились кров'янисті виділення. При натисканні ребром долоні над симфізом пуповина втягується у піхву. Кров'янисті виділення посилилися, крововтрата - 400 мл, триває. Яка акушерська тактика?
A *Ручне відокремлення та виділення посліду
B Зовнішній масаж матки
C Введення засобів, що скорочують матку
D Виділення посліду зовнішнім прийомами
E Надпіхвова ампутація матки

169 Вагітна в терміні 36-37 тижнів, яка знаходиться на "Д" обліку в ж/к з приводу прееклампсії, скаржиться на запаморочення, біль у животі, загальну слабкість.

Об'єктивно: загальний стан середнього ступеню важкості, пульс - 100/хв., АТ- 130/90 мм рт.ст. Матка дуже болюча, напружена і асиметрична при пальпації. Серцебиття - 180/хв., приглушене. Який імовірний діагноз?
A *Передчасне відшарування плаценти
B Загроза розриву матки
C Передчасні пологи
D Передлежання плаценти
E Провісники пологів

170 Породілля, 35-ти років, народила хлопчика масою - 4300 г. Послід відокремився і виділився самостійно, при огляді - його дефектів не знайдено. Крововтрата - 330 мл, продовжується. При зовнішньому масажі матки, вона дещо скорочується і знову розслабляється. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Гіпотонія матки
B Розрив матки
C Атонія матки
D Розрив промежини
E Тетанія матки

171 Повторновагітна у терміні 34-35 тижнів скаржиться на сильний головний біль у ділянці потилиці, біль в епігастрії, набряки на ногах. АТ- 190/130 мм рт.ст. В сечі виявлено білок. Яке ускладнення перебігу вагітності має місце?
A *Прееклампсія важкого ступеню
B Прееклампсія легкого ступеню
C Прееклампсія середнього ступеню
D Гіпертонічна хвороба
E Пієлонефрит вагітних

172 Роділля 37-ми років, доставлена в акушерський стаціонар із переймами, що почалися 10 годин тому. Перейми слабкі, нетривалі, кожні 15-17 хвилин. Серцебиття плода - 160/хв., ясне, ритмічне. P.V.: шийка матки згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яка аномалія пологової діяльності у роділлі?
A *Первинна слабкість пологової діяльності
B Вторинна слабкість пологової діяльності
C Патологічний прелімінарний період
D Дискоординована пологова діяльність
E Надмірно сильна пологова діяльність

173 Вагітна 27-ми років, у терміні вагітності 33 тижнів, звернулась до ж/к зі скаргами на спрагу і швидку втомлюваність. Вага жінки за тиждень збільшилась на 600 г. При проведенні проби Мак-Клюра-Олдріча папула розсмокталась за 30 хв. Про що свідчать виявлені зміни в організмі вагітної?
A *Підвищену гідрофільність тканин
B Гіповолемію
C Збільшення осмолярності плазми
D Гіперволемію
E Знижену гідрофільність тканин

174 Пацієнтка 31-го року, звернулась до ж/к зі скаргами на затримку менструації. Під час піхвового дослідження встановлено, що матка збільшена до розмірів голівки зрілого новонародженого, безболісна. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Вагітність 12 тижнів
B Вагітність 8 тижнів
C Вагітність 16 тижнів
D Вагітність 20 тижнів
E Вагітність 24 тижня

175 Вагітна 30-ти років, має розміри таза : 26-28-30-20 см. Діагональна кон'югата дорівнює 12,5 см. Обвід променево-зап'ясткового суглоба - 15 см. Визначте справжню (акушерську) кон'югату?
A *11 см
B 12 см
C 25 см
D 13 см
E 28 см

176 Роділля 32-х років, через 10 годин від початку пологової діяльності народила доношену дівчинку масою 3400 г. Через 7 хв. після народження дитини крововтрата становить 150 мл і продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукалова та Шредера позитивні. В чому полягає подальша акушерська тактика?
A *Контрольована тракція за пуповину
B Спостереження за роділлею
C Ручне відокремлення і видалення посліду
D Огляд пологових шляхів у дзеркалах
E Зовнішній масаж матки

177 Для чистоти піхви І-го ступеня характерна:
A *Велика кількість паличок Дедерляйна
B Велика кількість лейкоцитів
C Відсутність паличок Дедерляйна
D Наявність лужного середовища
E Велика кількість коків

178 До лікаря звернулася жінка зі скаргами на затримку менструацій до 7 місяців. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?
A *Аменорею
B Олігоменорею
C Оксоменорею
D Дисменорею
E Альгоменорею

179 У породіллі друга доба післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?
A *АТ- 120/75 мм рт.ст., Ps- 64/хв., *t*° - 36,7°*C*, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисті
B Ps- 80/хв., *t*° - 37,8°*C*, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові

C АТ- 110/60 мм рт.ст., Ps- 70/хв., *t*° - 36,6°*C*, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисті
D АТ- 125/85 мм рт.ст., Ps- 70/хв., *t*° - 36,6°*C*, дно матки нижче пупка, лохії слизові
E АТ- 125/85 мм рт.ст., Ps-64/хв., *t*° - 36,6°*C*, дно матки за лоном, лохії кров'янисті

180 Ви акушерка жіночої консультації у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період і необхідність спостереження за жінкою?
A *6 тижнів
B 5 тижнів
C 3 тижні
D 1 місяць
E 1 рік

181 Визначте період пологів: повне відкриття маткового вічка, поява потуг:
A *Період зганяння плода
B Послідовий
C Прелемінарний
D Період розкриття маткового вічка
E Післяпологовий

182 Чим закінчується третій період пологів?
A *Зганянням посліду
B Вилиттям навколоплідних вод
C Повним розкриттям шийки матки
D Відшаруванням плаценти від стінок матки
E Зганянням плода

183 У вагітної вислуховується серцебиття плода нижче пупка справа. Визначити положення, позицію, передлежання плода:
A *Положення плода повздовжнє, друга позиція, головне передлежання
B Положення плода косе, друга позиція, головне передлежання
C Положення плода повздовжнє, перша позиція, головне передлежання
D Положення плода повздовжнє, перша позиція, тазове передлежання
E Положення плода поперечне, перша позиція, передлежача частина відсутня

184 Для визначення дати пологів за формулою Негеле потрібно від дати першого дня останньої менструації:
A *Відняти 3 місяці і додати 7 днів
B Відняти 4 місяці і додати 7-10 днів
C Відняти 3 місяці
D Відняти 2 місяці
E Відняти 4 місяці

185 Роділля 25-ти років поступила в акушерську клініку з активною пологовою діяльністю. Який із перерахованих методів інструментального дослідження застосовується під час вагітності та в пологах?
A *Огляд шийки матки за допомогою дзеркал
B Зондування матки

C Біопсія
D Гістерографія
E Проба з кульковими щипцями

186 У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виявлено кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів - 250 мл; розривів немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється; кров, що витікає з матки згортується. Діагноз:
A *Гіпотонічна маткова кровотеча
B ДВЗ-синдром
C Атонічна кровотеча
D Розрив матки
E Емболія навколоплідними водами

187 Малий косий розмір голівки доношеного плода становить:
A *9,5
B 11
C 12
D 13,5
E 14

188 Вагітна 30-ти років. Під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см, і ВСДМ- 30 см. Яка передбачувана маса плода?
A *2700
B 3100
C 2900
D 2500
E 3000

189 У відділенні патології вагітних акушерка оглядає вагітну з двійнею. Який найімовірніший метод обстеження необхідно провести вагітній жінці?
A *УЗД
B Пальпація
C Кардіомоніторінг
D Аускультація
E Рентгенологічне дослідження

190 Які ознаки вагітності відносяться до вірогідних ознак вагітності?
A *Пальпація частин плода
B Зміна смаку, нудота, блювання вранці
C Затримка менструації
D Пігментація сосків та білої лінії живота
E Зміна величини і консистенції матки

191 Занурення зародка в слизову оболонку матки називається:
A *Імплантація
B Овуляція
C Запліднення

D Десквамація
E Регенерація

192 Вкажіть де в нормі відбувається запліднення?
A *Ампулярній частині маткової труби
B Яєчнику
C Матці
D Піхві
E Шийці матки

193 При вимірюванні розмірів таза установлено, що розміри таза 26-29-31-21 см. Визначити справжню кон'югату:
A *12 см
B 10,5 см
C 9 см
D 10 см
E 13 см

194 Вагітна поступила в пологовий будинок. Акушерка вимірюючи розміри таза встановила наступні дані: 22-25-28-18 см. Назвіть форму таза:
A *Загальнорівномірнозвужений таз
B Поперечнозвужений таз
C Косозміщений таз
D Плоский таз
E Остеомалятичний таз

195 Вагітна 24 роки звернулась в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів таза отримані дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?
A *Нормальний таз
B Простий плоский таз
C Плоскорахітичний таз
D Загальнозвужуючий таз
E Поперечнозвужуючий таз

196 У жінки регулярний 28-денний менструальний цикл. На який день менструального циклу відбувається овуляція?
A *14 день
B 16 день
C 21 день
D 28 день
E 2 день

197 Під час обстеження вагітної в терміні 35 тижнів, акушерка з'ясувала, що повздовжня вісь плода утворює з повздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?
A *Поперечне
B Косе
C Повздовжнє
D Лобне

E тазове

198 В пологовий будинок поступила роділля 24 роки з доношеною вагітністю та поперечним положенням плода. Який принцип ведення пологів Ви передбачаєте в даному випадку?
A *Кесеревий розтин
B Плодоруйнівна операція
C Накладання акушерських щипців
D Стимуляція пологів
E Звичайне ведення пологів

199 У ранньому післяпологовому періоді у породіллі виникла кровотеча. Розриви родового каналу не виявлені. Послід цілий. Виявлено зниження тонусу матки. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Якій патології характерна симптоматика?
A *Гіпотонічна кровотеча в ранньому післяпологовому періоді
B Атонічна кровотеча
C Розрив матки
D ДВЗ-синдром
E Емболія навколоплідними водами

200 Вагітна 40-ка років, вагітність 4-та, 34 тижня, скаржиться на головний біль, мерехтіння мушок перед очима. АТ- 160/110 мм рт.ст., набряки поширені на низ живота, білок в сечі - 5 г/л. Поставити діагноз:
A *Прееклампсія важкого ступеня
B Гіпертонічна хвороба
C Набряки вагітних
D Захворювання нирок
E Прееклампсія середньої тяжкості

201 Вагітна 25-ти років, поступила у відділення патології вагітних з вагітністю 30 тижнів зі скаргами на загальну слабкість, головокружіння, головний біль, сонливість, втомлюваність. Хворіє хронічним гастритом і гепатохолециститом. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, Ps- 86/хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ- 110/70 мм рт.ст., систолічний шум над верхівкою серця. Ан.крові: Нв- 90 г/л. Що характеризує ступінь залізодефіцитної анемії?
A *Гемоглобін крові
B Наявність захворювань шлунково-кишкового тракту
C Колір шкіри і слизових оболонок
D Головокружіння
E Загальна слабкість

202 Роділля 25-ти років, поступила в пологовий будинок з вагітністю 37 тижнів. На початку І-го періоду пологів із скаргами на головний біль, нежить, сухий кашель, кон'юктивіт, озноб, підвищення температури тіла. Проживає в 1-но кімнатній квартирі з чоловіком і матір'ю, у яких впродовж тижня спостерігалось: нежить, кашель, чихання, підвищення температури, але вони ходили на роботу. Які клінічні дані свідчать, що у вагітної грип?
A *Наявність епідеміологічного вогнища

B Головний біль
C Сухий кашель
D Підвищення температури тіла
E Нежить

203 У пологовий будинок поступила роділля 28-ми років, з надмірно сильною пологовою діяльністю. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: нижній сегмент матки перерозтягнутий, болючий при пальпації, контракційне кільце на рівні пупка, матка форми “піщаного годинника”. Розміри таза: 23-26-29-17 см, ОЖ- 100 см, ВДМ- 39 см. Тактика акушерки пологового відділення:
A *Викликати лікаря
B Ввести спазмолітика
C Заспокоїти пацієнтку
D Підключити крапельницю з кровозамінниками
E Ввести утеротоніки

204 Під час обстеження акушеркою ФАПу вагітної в 36 тижнів вагітності ваявлено: матка великих розмірів, більше двох великих частин плода, на передній стінці матки пальпується повздовжня борозна, серцебиття вислуховується чітко в різних місцях, різної частоти. Поставити діагноз:
A *Багатоплідна вагітність
B Тазове передлежання
C Гігантський плід
D Гідроцефалія плода
E Розгинальне передлежання.

205 Вагітна, 7 тижнів вагітності, скаржиться на нудоту, блювання до 5 разів на добу, схуднення. Який діагноз повинна поставити акушерка ФАПу?
A *Блювання вагітної
B Отруєння І ступеня
C Відраза до їжі
D Блювання ІІ-го ступення
E Захворювання шлунково-кишкового тракту

206 В гінекологічне відділення поступила вагітна, 10 тижнів вагітності, скарги на переймоподібні болі внизу живота, з іррадіацією в крижі, поперек, значну кровотечу. При вагінальному дослідженні в ділянці зовнішнього вічка визначається нижній полюс плодового яйця. Поставити діагноз:
A *Аборт ходу
B Аборт, що розпочався
C Загрозливий аборт
D Неповний аборт
E Шийкова вагітність

207 В санпропускник пологового будинку поступила роділля в 40 тижнів вагітності. Із статевої щілини звисає ручка плода, ціанотична, набрякла. Виявлені симптоми загрози розриву матки. Що акушерка в першу чергу повинна зробити?
A *Викликати лікаря
B Заправити ручку у піхву

C Ввести спазмолітики
D Вислухати серцебиття плода
E Ввести утеротоніки

208 Через 10 хвилин після народження плода народилася плацента з усіма дольками та оболонками. При огляді в дзеркалах виявлено глибокий розрив промежини до зовнішнього сфінктера заднього проходу, задньої стінки піхви. Поставити діагноз:
A *Розрив промежини II ст.
B Розрив шийки матки
C Розрив промежини I ст.
D Розрив стінки піхви
E Розрив промежини III ст.

209 Термінові пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. Було 3 аборти. Останній із септичним ускладненням. Жінка довго лікувалася. Третій період пологів триває 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти негативні. Кровянисті виділення відсутні. Яка можлива патологія III періоду пологів?
A *Справжнє прирощення плаценти
B Слабкість послідових перейм
C Кровотеча
D Несправжнє прирощення плаценти
E Повне прирощення плаценти

210 Роділля, 33 роки, ріст - 150 см. Розміри таза: 26-26-31-17 см, ОЖ- 96 см, ВДМ- 36 см. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз. Пологи тривають 36 год. Води відійшли 20 год. назад. Від кесаревого розтину жінка відмовилась. Потуги почалися 3 год. назад. Ознака Вастена - врівень. Серцебиття, рухи плода відсутні. Яку операцію краще всього провести роділлі?
A *Краніотомію
B Кесарів розтин
C Декапітацію
D Зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку
E Клейдотомію

211 У роділлі 30-ти років, термінові пологи почалися 12 год. тому. Хворіла скарлатиною. Передбачувана маса плода - 2880 г. Останні 2 год. перейми болючі, але сильні, регулярні, по 40 с, через 3-4 хв. Шийка матки згладжена, краї її товсті, щільні, не податливі, відкриття на 2 п/пальці. Голівка плода великим сегментом у вході в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I періоду пологів?
A *Ригідність шийки матки
B Вік 30 років
C Перенесені інфекційні захворювання
D Маса плода
E Стояння голівки плода

212 У пологовий будинок поступила вагітна, 38-ми років, вагітність I, 39 тижнів. Впродовж 1,5 тижня скаржиться на головний біль, порушення зору. Під час обстеження жінки виникли судоми. Які дії акушерки в санпропускнику?

A *Покликати лікаря, запобігти падіння з кушетки
B Виміряти АТ, покликати лікаря.
C Ввести протисудомні засоби.
D Ввести гіпотензивні препарати.
E Підключити крапельницю

213 У породіллі 32-х років на 7 добу після пологів підвищилась температура до 39,6°*С*, з'явилися болі внизу живота, які віддають в поперек. Акушерка ФАПу при вагінальному дослідженні виявила з обох боків від матки різко болючі інфільтрати. Поставити діагноз:
A *Післяпологовий параметрит
B Післяпологовий пельвіоперитоніт
C Післяпологовий сальпінгоофорит
D Післяпологовий периметрит
E Післяпологовий тромбофлебит вен таза

214 Вагітність шоста, 36 тижнів, перші пологи, три аборти, один мимовільний аборт на 16-му тижні, після чого двічі вишкрібали порожнину матки. 20 днів лежить у ВПВ з повторною раптовою кровотечею серед ночі. Пологова діяльність відсутня. Тонус матки не підвищений. Передлежить таз високо над входом в малий таз. При розгорнутій операційній обережно лікарем проведено вагінальне дослідження. Виявлено: в піхві згустки крові, розкриття шийки матки на 2 п/пальці, перешийок повністю прикритий губчатою тканиною. Посилилась кровотеча. Діагноз:
A *Центральне передлежання плаценти
B Низьке прикріплення плаценти
C Бокове передлежання плаценти
D Крайове передлежання плаценти
E Передчасне відшаровування нармально прикріпленої плаценти
215 Термінові пологи. Правильна тілобудова. Ріст - 145 см, маса тіла - 52 кг. ОЖ- 98 см, ВДМ- 80 см. Розміри таза: 22-25-27-17 см. Ознака Вастена - негативна. Плідний міхур цілий. Шийка матки згладжена, розкрита на 3 п/пальці. Що особливо свідчить про можливість пологів природнім шляхом?
A *Ознака Вастена негативна
B Першородяча, 22-х років
C Розміри таза 22-25-27-17 см
D Цілий плідний міхур
E Передбачувана маса плода

216 Чомустановить*Distantia spinarum*?
A *25-26 см
B 23-24 см
C 11 см
D 28-29 см
E 30-31 см

217 Друга фаза менструального циклу називається:
A *Лютеїнова
B Овуляція

C Фолікулінова
D Естрогенна
E Фаза проліферації

218 Кількість навколоплідних вод досягає при 36-38 тижнях:
A *1,0-1,5 літрів
B 0,5 літра
C 250 мл
D 2,0 літри
E 3,0 літри

219 Визначте розташування дна матки в 24 тижня вагітності:
A *На рівні пупка
B Під мечоподібним відростком
C Посередині між мечоподібним відростком і пупком
D Посередині між пупком і лобком
E На рівні лобка

220 Передлежання плода - це:
A *Розташування крупної частини плода щодо площини входу в таз
B Розташування спини плода щодо правого боку матки
C Відношення осі плода до вертикальної осі матки
D Співвідношення окремих частин плода
E Спинка плода обернена до лівого боку матки

221 Перший період пологів називається:
A *Період розкриття
B Період згинання
C Послідовий період
D Прелімінарний період
E Ранній період

222 Як називають жінку яка народжує?
A *Роділля
B Хвора
C Вагітна.
D Породілля
E Мати

223 Визначте тривалість третього періоду пологів:
A *30 хвилин
B 1 година
C 5-10 хвилин
D 2 години
E 1,5 годин

224 При поступленні вагітної до пологового будинку було встановлено головне передлежання плода, стріловий шов у правому косому розрізі, мале тім’ячко - зліва і до переду. Визначте позицію і вид плода:

A *Перша позиція, передній вид
B Друга позиція, передній вид
C Перша позиція, задній вид
D Друга позиція, задній вид
E Поперечне положення плоду

225Пологи - другі. Вилиття навколоплідних вод - дві години потому, відкриття шийки матки 7-8 см. Визначте період пологів:
A *Період розкриття шийки матки
B Період зганяння
C Післяродовий період
D Латентний період
E Ранній період

226Ранній післяпологовий період продовжується:
A *Перші 2 години після народження посліду
B 4 години після народження дитини
C 6 тижнів після народження дитини
D 2 тижні після народження дитини
E 2 години після народження дитини

227Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей після фізіологічних пологів?
A *Одразу після пологів
B У перші 2 години після пологів
C Через 12 годин після пологів
D У першу добу після пологів
E Одразу після початку лактації

228У вагітної 25-ти років, у жіночій консультації, встановлено поперечне положення плода. Термін вагітності 30-32 тижня. Визначте тактику ведення вагітності:
A *Призначають коригувальну гімнастику за відсутністю протипоказань
B Виконати зовнішнім поворотом плода на головку
C Терміново кесарів розтин
D Призначити явку через 2 тижні
E Призначити розвантажувальний день

229Фетопатія - це?
A *Внутрішньоутробне ураження сформованих органів і систем плода
B Захворювання, що виникає у перші 3 місяці вагітності
C Спонтанні мутації статевих клітин
D Дія хімічних речовин
E Водянка голови

230Надмірно довгою вважають пуповину довжиною:
A *Понад 60 см
B 40-50 см

C 30-40 см
D Понад 80 см
E 50-60 см

231 Коли у нормі виливаються навколоплідні води?
A *При повному розкритті шийки матки
B До пологів
C У І періоді пологів
D У ІІІ періоді пологів
E У ІІ періоді пологів

232 У вагітної 24-х років, об'єм живота - 100 см, висота стояння дна матки - 40 см. Визначте передбачувану масу тіла плода:
A *4,000 г
B 3,400 г
C 3,500 г
D 4,500 г
E 2,600 г

233 У пологовий будинок госпіталізовано вагітну. Що свідчить про початок у неї пологів?
A *Регулярні перейми
B Вилиття навколоплідних вод
C Опущення дна матки
D Відходження слизової пробки
E Головний біль
234Класична ручна допомога при тазовому передлежанніі виконують для:
A *Виведення ручок та голівки плода
B Виведення голівки плода
C Народження ніжок плода
D Народження сідниць плода
E Виведення передньої ручки

235Вагітна 25-ти років, 35 тижнів вагітності, госпіталізована в пологовий будинок. Об'єктивно: непритомний стан, АТ- 190/120 мм рт.ст., генералізовані набряки. Встановіть діагноз:
A *Еклампсія
B Діабетична кома
C Печінкова кома
D Гостра ниркова недостатність
E Епілепсія

236Вагітна 23-х років, 38 тижнів вагітності, пологи перші і двійня, обидва плода в поперечному положенні. Відійшли навколоплідні води. Визначте тактику ведення пологів:
A *Кесарів розтин
B Стимуляція пологів
C Вичікування
D Поворот першого плода на ніжку

E Зовнішній поворот першого плода

237Роділля, 28-ми років, пологи перші, в строк. Після енергійної пологової діяльності перейми слабшають, не дають ефекту. Піхвове дослідження: розкриття шийки матки - 9 см, голівка плоду великим сегментом вставлена у площину входу в малий таз. Встановіть діагноз:
A *Пологи перші, І-й період пологів. Вторинна слабкість пологової діяльності
B Пологи перші, ІІ-й період пологів. Вторинна слабкість пологової діяльності
C Пологи перші, ІІ-й період пологів. Дискоординована пологова діяльності
D Пологи перші, ІІ-й період пологів. Первинна слабкість пологової діяльності
E Пологи перші, ІІІ-й період пологів. Вторинна слабкість пологової діяльності

238Яка кровотеча вважається масивною?
A *Понад 1,5% маси тіла
B До 0,5% маси тіла
C Понад 1% маси тіла
D 0,5%-1,0% маси тіла
E 1,0%-1,5% маси тіла

239Назвіть препарат, розчин якого протипоказаний до застосування при лікуванні геморагічного шоку (ГШ):
A *Глюкоза
B Стабізол
C Свіжозаморожена плазма
D Рефортан
E Розчин 0,9% *NaCl*

240 Минуло 30 хвилин після народження плода. Ознаки відділення плаценти позитивні. Плацента не виділяється. Почалася кровотеча. Назвіть причину кровотечі:
A *Затримка посліду в матці
B Затримка дольки посліду в матці
C Травми пологових шляхів
D ДВС-синдром
E Розрив матки

241 Які прийоми слід застосувати при кровотечі в пологах, якщо плацента відокремилася, а послід не виділяється?
A *Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
B Ввести утеротонічні засоби
C Накласти шов за Лосицькою
D Зовнішній масаж матки
E Ручне дослідження порожнини матки

242 Вагітність 34-х тижні. Передчасне відшарування плаценти. Жінка перебуває в коматозному стані. Крововтрата біля 2-х літрів. Визначте тактику:
A *Кесарів розтин, інфузійно-трансфузійна терапія
B Плодоруйнівна операція

C Інфузійно-трансфузійна терапія
D Визвати пологову діяльність
E Кесарів розтин

243 Після народження плаценти в породіллі кровотеча. Матка скорочується погано, м'яка на дотик. Кровянисті видління зі згортками крові. Який передбачуваний діагноз?
A *Гіпотонія матки
B Затримка посліду в матці
C ДВЗ-синдром
D Підозра на розрив матки
E Атонія матки

244Породілля, в ранній післяпологовий період, у зв'язку з гіпотонією матки, втратила 1,5 літра крові (1,8%) від маси тіла. Матка періодично розслабляється, кров, що виділяється з пологових шляхів, не згортається. Встановіть попередній діагноз:
A *Гіпотонічна крововтрата. ГШ II-го ступені. ДВЗ-синдром
B ДВЗ-синдром
C Гіпотонічна крововтрата
D Геморагічний шок
E Емболія навколоплідними водами

245Доношена дитина народилася із дворазовим обвиттям шиї пуповиною. У немовляти виражена блідість шкірних покривів, відсутні дихання і рефлекси, серцебиття - 60/хв. Поставте діагноз:
A *Асфіксія тяжкого ступеня
B Асфіксія середнього ступеня
C Асфіксія легкого ступеня
D Травма голови
E Вроджений порок серця

246Діагноз асфіксії новонароджених середнього ступеня може бути встановленим, якщо оцінка новонародженого за шкалою Апгар становить:
A *5-6 балів
B 9-10 балів
C 0 балів
D 1-2 бали
E 2-3 бали

247Назвіть післяпологове захворювання другого етапу поширення інфекційного процесу:
A *Пельвіоперитоніт
B Післяпологова виразка
C Мастит
D Перитоніт
E Сепсис

248Яку операцію виконують при виявленому дефекті часточки посліду відразу після пологів?
A *Ручну ревізію порожнини матки
B Амніотомію
C Ручне відокремлення послід
D Масаж матки на кулаку
E Інструментальну ревізію порожнини матки

249Який симптом є діагностично значущим при клінічно вузькому тазі?
A *Генкеля-Вастена
B Шредера
C Гентера
D Абуладзе
E Кюстнера-Чукалова

250Яку форму вузького таза відносять до поширених?
A *Загальнорівномірнозвужений
B Кіфотичний
C Спонділоартричний
D Остеомалятичний
E Коксалгічний таз

251Повторновагітна. Другий період пологів триває понад одну годину. Передбачувана маса плода - 4,200 г. Розміри таза: 25-27-30-19. Голівка притиснута до входу в малий таз. Мису не досягнуто. Визначте тактику:
A *Кесарів розтин
B Поворот плода на ніжку
C Плодоруйнівна операція
D Накладання акушерських щипців
E Вакуум-екстракція

252Найпоширенішою причиною мимовільного аборту в ранні терміни є:
A *Гіпофункція жовтого тіла
B Травма
C Захворювання органів системи травлення
D Несумісність на резус-фактор
E Вади серця

253При встановлені діагнозу загрозливого розриву матки необхідно:
A *Зупинити пологову діяльність
B Посилити пологову діяльність
C Залишити пологову діяльність на попередньому рівні
D Дати подихати кисню
E Вводити препарати крові

254Вагітна 22-х років, Термін 24-25 тижнів. Виникла біль у попереку, озноб, підвищення температури тіла до 39°*C*. У крові: лейкоцити - $15,5 \cdot 10^9$/л. У сечі: білок - 0,06 г/л, лейкоцити 2-4 в полі зору, бактеріурія:

A *Гострий пієлонефрит
B Цистіт
C Прееклампсія
D Бактеріурія
E Цукровий діабет

255Вагітність протипоказана при:
A *Ваді серця в стадії декомпенсації
B Пієлонефриті
C Гіпотонії
D Ревматизмі
E Цукровий діабеті

256Пологи вважаються передчасними, якщо вони виникають в строки:
A *23-37 тижнів
B 20-30 тижнів
C До 12 тижнів
D 38-41 тиждень
E 41-42 тижні

257Роділля поступає в пологовий стаціонар. Який документ повинна оформити акушерка в приймальному відділенні?
A *Історія пологів
B Обмінна карта вагітної
C Індивідуальна карта вагітної
D Карта диспансерного спостереження
E Медична карта стаціонарного хворого

258Як документально відображає акушерка перебіг та ведення пологів?
A *Графічно на партограмі
B Графічно на гравідограмі
C У вигляді стовпчиків на температурному листі
D Письмово в історії пологів
E Письмово в тестах рухів плода

259В жіночу консультацію прийшла вагітна, яка знаходиться на обліку з приводу даної вагітності. Вагітність протікає без ускладнень, стан плоду задовільний, термін вагітності 28 тижнів. Яке рутинне обстеження запропонує акушерка вагітній для моніторингу стану плода?
A *Тест рухів плода
B УЗД плода
C Кардіотокографія
D Доплерографія судин пуповини
E Екскреція естрадіолу

260В якому терміні гестації надають відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами?
A *З 30 тижнів
B З 32 тижні
C З 25 тижні

D З 22 тижні
E З 38 тижні

261Акушерка вимірює вагітній розміри тазу. Зовнішня конюгата становить 20 см. Вирахуйте розмір акушерської кон'югати:
A *11 см
B 13 см
C 19 см
D 21 см
E 23 см

262Роділля 29-ти років, народила живого доношеного хлопчика масою 3800 г. Пройшло 15 хв. послідового періоду. Ознак відокремлення посліду немає. Вкажіть максимальну тривалість послідового періоду:
A *30 хвилин
B 15 хвилин
C 10 хвилин
D 40 хвилин
E 60 хвилин

263Назвіть документ, який одержує вагітна в жіночій консультації, що забезпечує зв'язок між консультацією та пологовим будинком:
A *Обмінна карта
B Медична карта амбулаторного хворого
C Індивідуальна карта вагітної та породіллі
D Журнал обліку вагітної
E Контрольна карта диспансерного обстеження

264Акушерка веде спостереження за жінкою в послідовому періоді пологів. Вкажіть ознаку, яка свідчитиме про відшарування плаценти в Ш-у періоді пологів:
A *Подовження зовнішнього відрізка пуповини на 10-12 см
B Головний біль
C Набряк зовнішніх статевих органів
D Незмінена форма матки
E Біль у поперековій ділянці.

265Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності:
A *16 тижнів
B 12 тижнів
C 20 тижнів
D 30 тижнів
E 36 тижнів

266Акушерка ЖК проводить заняття з безпечного материнства та батьківства та інформує слухачів про періоди пологів. Перечисліть їх назви:
A *Розкриття, зганяння, послідовий
B Прелімінарний, розкриття, послідовий

C Прелімінарний, зганяння, послідовий
D Провісники, розкриття, зганяння
E Розкриття, зганяння, післяпологовий

267Акушерка проводить огляд вагітної. Який метод обстеження дасть інформацію про стан внутрішньоутробного плода?
A *Аускультація серцебиття плода
B Опитування пацієнтки
C Пальпація частин плода
D Вимірювання тазу
E Вимірювання обводу живота

268Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився І-й період пологів. Назвіть ознаки, що вказують на його завершення:
A *Повне відкриття шийки матки
B Народження посліду
C Відкриття шийки матки на 3 см
D Постійний ниючий біль в низу живота
E Народження плода

269Акушерка вимірює вагітній розміри таза. Назвіть прямий розмір входу в малий таз:
A *Справжня кон'югата
B Правий косий
C Поперечний розмір входу в малий таз
D Діагональна кон'югата
E Прямий розмір виходу із тазу

270Серцебиття плода прослуховується вище пупка ліворуч. Визначте передлежання плода:
A *Тазове
B Потиличне
C Головне
D Перше
E Друге

271Акушерка проводить спеціальні методи обстеження плода. Назвіть метод, яким вона визначить діагональну кон'югату:
A *Вагінальний огляд
B Зовнішнє обстеження
C Цитологічне обстеження
D Кольпоскопічне обстеження
E Огляд в дзеркалах

272У вагітної пізній гестоз. Назвіть найхарактерніший симптом еклампсії:
A *Судоми
B Блювання
C Протеїнурія
D Головний біль

E Слинотеча

273У жінки затримка місячних 4 тижні. Назвіть, до якої групи відноситься дана ознака:
A *Ймовірні
B Безперечні
C Передбачувані
D Загальні
E Окремі

274Назвіть прийом Леопольда, яким визначають позицію плода:
A *II-й прийом
B I-й прийом
C III-й прийом
D IV-й прийомом
E V-й прийом

275Акушерка при огляді вагітної виявила набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст. Добова протеїнурія - 1 г/на добу. Для якого ускладнення вагітності характерні дані ознаки:
A *Прееклампсія середньої тяжкості
B Набряки вагітних
C Легка прееклампсія
D Тяжка прееклампсія
E Еклампсія

276Назвіть прийом Леопольда, яким визначають передлежання плода:
A *Третій прийом
B Другий прийом
C Перший прийом
D Четвертий прийом
E П’ятий прийом

277У пацієнтки на 6-му тижні вагітності, з’явилися ознаки раннього гестозу. Назвіть симптоми, характерні для даного ускладнення:
A *Блювання, слинотеча
B Набряки, альбумінурія
C Гіпертензія, набряки
D Головний біль
E Збільшення маси тіла

278У вагітної 36 тижнів раптово виник напад еклампсії. Що є першочерговим у наданні допомоги при приступі еклампсії?
A *Ввести роторозширювач і зафіксувати язик
B Дати інгаляційний наркоз
C Ввести седативні засоби
D Ввести гіпотензивні засоби
E Ввести протисудомні засоби

279На ФАП звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструації. При проведенні бімануального дослідження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якій патології відповідає дана клінічна картина?
A *Порушена позаматкова вагітність
B Апоплексія яєчника
C Прогресуюча позаматкова вагітність
D Перекрути ніжки кисти яєчника
E Розрив піосальпінкса

280Вагітна 31-32 тижні вагітності, звернулась зі скаргами на появу безболісної кровотечі з статевих шляхів, яскраво червоного кольору. Об'єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 86/хв. Якій патології відповідає дана клінічна картина?
A *Передлежання плаценти
B Самовільний аботр
C Загроза передчасних пологів
D Відшарування плаценти
E Розрив матки

281Акушерка проводить огляд вагітної в терміні 30 тижнів вагітності. Вкажіть дії акушерки для діагностики прихованих набряків:
A *Зважити вагітну
B Визначити зріст вагітної
C Виміряти АТ
D Взяти мазок на ступінь чистоти піхви
E Виписати направлення на загальний аналіз сечі

282Акушерка обстежує вагітну та встановлює термін вагітності. Назвіть вірогідну ознаку вагітності:
A *Вислуховування серцевих тонів плода
B Ціаноз слизової оболонки піхви
C Збільшення молочних залоз
D Відсутність менструації
E Пігментація шкіри обличчя

283Акушерка обстежує вагітну: обвід живота - 100 см, висота дна матки - 36 см. Визначте очікувану масу плода:
A *3600 г
B 2700 г
C 3000 г
D 3200 г
E 2500 г

284До якого віку дівчини гінекологічне обстеження обов'язково проводять у присутності матері:
A *До 15 років
B До 3 років

C До 7 років
D До 18 років
E Доки не настане менархе

285Акушерка при обстеженні вагітної вислуховує серцебиття плода на рівні пупка. Визначте положення плода:
A *Поперечне
B Повздовжнє
C Косе
D Пряме
E Перше

286Оцініть стан доношеного новонародженого за шкалою Апгар, якщо серцебиття - 120/хв., ясне, ритмічне, крик голосний, рухи активні, шкірні покриви рожеві, при введенні катетера в глотку кашляє:
A *10 балів
B 9 балів
C 8 балів
D 6 балів
E 7 балів

287Де прослуховується серцебиття плода при другій позиції тазового передлежання?
A *Справа вище пупка
B Справа нижче пупка
C На рівні пупка
D Зліва нижче пупка
E Зліва вище пупка

288Назвіть симптом, який вважають найнебезпечнішим при пізньому гестозі:
A *Порушення зору
B Набряк геніталій
C Головний біль
D Гіпертензія
E Протеїнурія

289Першовагітна у терміні вагітності 9 тижнів скаржиться на блювання до 20 разів на добу, огиду до їжі, млявість, сонливість. Яку патологію можна запідозрити?
A *Нестримне блювання вагітних
B Помірне блювання вагітних
C Прееклампсія вагітних
D Гастродуоденіт
E Гепатит

290Назвіть ознаку прегестозу:
A *Патологічна прибавка маси тіла
B Гіпертензія
C Протеїнурія
D Набряки

E Блювання

291Яке ускладнення у пологах має такі клінічні прояви: “кинжальний” біль у животі, припинення пологової діяльності, шок, частини плода пальпуються під черевною стінкою?
A *Розрив матки
B Передчасне відшарування плаценти
C Передлежання плаценти
D Розрив шийки матки
E Розрив лобкового симфізу

292Який із гестозів належить до рідкісних форм?
A *Остеомаляція
B Блювання
C Птіалізм
D Прееклампсія
E Еклампсія

293Як змінюється рівень гемоглобіну крові при важкій формі раннього гестозу?
A *Підвищується
B Не змінюється
C Суттєво не змінюється
D Знижується
E -

294Яку тактику обирають для розродження вагітної із прееклампсією легкого ступеня?
A *Вичікувальну
B Активну
C Кесарів розтин
D Вакуум-екстракція
E Акушерські щипці

295У вагітної з діагнозом - передлежання плаценти, раптово почалася кровотеча. Що повинна зробити акушерка в першу чергу?
A *Негайно викликати лікаря
B Визначити групу крові
C Ввести кровоспинні препарати
D Холод на низ живота
E Ввести скоротливі засоби

296Що є основною причиною виникнення анемії під час вагітності?
A *Збільшення ОЦК
B Шлунково-кишкова кровотеча
C Надмірне руйнування еритроцитів
D Нестача в організмі вітаміну B_{12}
E Порушення всмоктування заліза

297У породіллі в ранньому післяпологовому періоді почалась кровотеча. Тонус матки знижений. Яку долікарську допомогу повинна надати акушерка?
A *Зовнішній масаж матки
B Масаж матки на кулаці
C Введення уретонічних засобів в/в, масаж матки на кулаці
D Накладання клемів за методом Бакшеєва, зовнішній масаж матки
E Ручне обстеження порожнини матки, масаж матки на кулаці

298Вкажіть тактику ведення вагітної при аборті в ходу в ранні терміни:
A *Вишкрібання порожнини матки
B Призначення спазмолітиків
C Накладання шва на шийку матки
D Призначення гормонотерапії
E Призначення седативної терапії

299Ваша тактика при затримці частки плаценти у матці за умови самостійного ведення пологів:
A *Виконати ручну ревізію матки, масаж
B Оглянути родові шляхи
C Виконати зовнішній масаж матки
D Ввести ліки, що скорочують м’язи матки
E Виміряти АТ

300Яка тактика при кровотечі в послідовому періоді при не відшарованій плаценті?
A *Ручне відокремлення та видалення посліду
B В/м окситоцин
C Масаж матки через передню черевну стінку
D Кюретаж стінок порожнини матки
E Притиснення черевної аорти

301Яким шляхом проводять родорозрішення при центральному передлежанні плаценти?
A *Кесарів розтин
B Шкірно-головні щипці
C Консервативно, після зупинки кровотечі
D Накладання акушерських щипців
E Витягнення плоду за тазовий кінець

302Яку допомогу необхідно надати породіллі при виникненні лактостазу?
A *Зціджувати молоко у режимі годування дитини
B Ввести знеболюючі засоби
C Перебинтувати молочні залози
D Прикласти холод до молочних залоз
E Зробити зігріваючий компрес

303У роділлі з вузьким тазом виникла загроза розриву матки. Оберіть правильну тактику:
A *Зняти пологову діяльність

B Акушерські щипці
C Кесарів розтин
D Стимуляція пологової діяльності
E Епізіотомія

304Ви здійснюєте спеціальне гінекологічне дослідження. При огляді вульви визначаєте, що вивідні протоки бартолінових залоз розміщені з кожної сторони від ходу в піхву і відкриваються в нормі:
A *На 5 і 7 годинах умовного циферблату
B На 3 і 9 годинах умовного циферблату
C На 4 і 8 годинах умовного циферблату
D На 6 і 12 годинах умовного циферблату
E На 1 і 11 годинах умовного циферблату

305Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, балотуючи частина плода, третім прийомом над входом в таз визначається частина плода м'якуватої консистенції, нездатна до балотування. Яке положення діагностовано?
A *Поздовжнє
B Тазове
C Поперечне
D Головне
E Косе

306При дослідженні роділлі четвертим прийомом Леопольда встановлено, що пальці можна підвести під голівку і кінчики пальців сходяться. Ваш висновок:
A *Голівка над входом в малий таз
B Голівка притиснута до входу в малий таз
C Голівка в порожнині малого тазу
D Голівка малим сегментом у вході в малий таз
E Голівка великим сегментом у вході в малий таз

307Вагітна 26-ти років з'явилась на черговий прийом в жіночу консультацію. Дана вагітність І. Сьогодні зранку вперше відчула рухи плода. При обстеженні дно матки на два поперечника пальця нижче пупка, ВСДМ- 16 см. Визначіть термін вагітності за висотою стояння дна матки:
A *20 тижнів
B 24 тижнів
C 16 тижнів
D 28 тижнів
E 30 тижнів

308При зовнішньому акушерському обстеженні роділлі визначено, що голівка розміщена на ширину 4 поперечників пальців над симфізом. Ваш висновок:
A *Голівка притиснута до входу в малий таз
B Голівка малим сегментом у вході в малий таз
C Голівка великим сегментом у вході в таз
D Голівка в порожнині малого тазу
E Голівка над вхлдлм в таз

309Вимірювання додаткових розмірів тазу здійснюється всім вагітним якщо:
A *Основні розміри тазу не відповідають нормі
B Всім вагітним при взятті на облік
C Всім вагітним в ІІІ-му триместрі вагітності
D Всім вагітним з обстеженим акушерським анамнезом
E По бажанню вагітної жінки

310Жінка 19-ти років звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на ранкову блювоту, запаморочення. Остання менструація 1 місяць тому. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка збільшена до розмірів курячого яйця. Ваш попередній діагноз:
A *Вагітність 5-6 тижнів
B Вагітність 7-8 тижнів
C Вагітність 9-10 тижнів
D Вагітність 11-12 тижнів
E Пухлина матки

311ри зовнішньому акушерському обстеженні першовагітної жінки встановлено: дно матки розміщено посередені між пупком і мечеподібним відростком, ВСДМ- 28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмічне - 140/хв., справа нижче пупка. Ваш діагноз:
A *Вагітність І, 32 тижні
B Вагітність І, 28 тижнів
C Вагітність І, 30 тижнів
D Вагітність І, 24тижня
E Вагітність ІІ, 26 тижнів

312Вагітна жінка 17-ти років стверджує, що остання менструація відбулась 14-го липня. Обчисліть дату очікуваних пологів:
A *21 квітня
B 27 квітня
C 21 травня
D 21 березня
E 14 березня

313Вагітна 26-ти років звернулась до акушерки пологового будинку зі скаргами на ниючі болі в ділянці крижів, нерегулярні, короткочасні скорочення матки. Вагітність перша 37-38 тижнів. Дані піхвового дослідження: шийка матки до 2 см відхилена до заду, зовнішнє вічко закрите. Ваш попередній діагноз:
A *Вагітність І, 37-38 тижнів, провісники пологів
B Вагітність І, 37-38 тижнів, пологи І, І період, латентна фаза
C Вагітність І, 37-38 тижнів, пологи І, І період, активна фаза
D Вагітність І, 37-38 тижнів, пологи І, ІІ період пологів
E Вагітність І, 37-38 тижнів

314Повторновагітна 30-ти років з доношеною вагітністю жаліється на відходження навколоплідних вод. Пологової діяльності немає. Голова плода притиснута до входу в малий таз. Серцеві тони ясні, ритмічні - 132/хв. Яке

дослідження слід виконати для складання плану ведення пологів?
A *Провести піхвове дослідження
B Виміряти висоту стояння дна матки
C Виміряти окружність живота
D Провести зовнішнє акушерське дослідження
E Виміряти обвід променево-зап'ясткового суглоба

315Першовагітна 21-го року госпіталізована в пологовий будинок з активною родовою діяльністю, що почалась 4 години тому. Перейми по 30-35 секунд через 5-7 хвилин, середньої сили. Піхвове дослідження: шийка матки згладжена, вкорочена до 1 см, розкриття до 5 см. Ваш попередній діагноз:
A *Вагітність I, пологи I, I період, активна фаза
B Вагітність I, пологи I, I період, латентна фаза
C Вагітність I, провісники пологів
D Вагітність I, 37-38 тижнів, пологи I, I період пологів
E Вагітність I, 37-38 тижнів

316Повторнородяча перший період пологів триває 6 годин. Через 15 хвилин після піхвового дослідження злились прозорі навколоплідні води у помірній кількості. Ваші першочергові дії:
A *Провести піхвове дослідження
B Провести пальпацію живота роділлі 3 та 4 прийомами
C Провести пальпацію живота 1 та 2 прийомами
D Провести аускультацію серцебиття плода
E Провести профілактику дистресу плода

317Роділля в другому періоді родів. Зовнішніми прийомами голівка не визначається. Акушерка використала прийом Піскачека, вказівний палець наштовхнувся на голівку. Ваш висновок:
A *Голівка плода у вузький частині малого тазу
B Голівка плода над входом у малий таз
C Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз
D Голівка плода великим сегментом у вході в малий таз
E Голівка плода в широкій частині порожнини малого тазу

318Другий період пологів в головному передлежанні. Народилась потилиця. Першочергові дії акушерки:
A *Припинити потуги, звільнити тім'яні горби, захопити рукою голівку
B Припинити потугу, здійснювати запозичення тканин
C Запропонувати роділлі дихати відкритим ротом
D Запропонувати роділлі потужитися
E Запобігати передчасному розгинанню голівки

319Третій період родів. Дно матки відхилилось вправо і піднялось вище пупка. Лігатура накладена на пуповину у статевої щілини опустилась на 8-10 см від вульварного кільця. Для того щоб переконатись що плацента відшарувалась акушерка повинна:
A *Визначити ознаку Кюстнера-Чукалова
B Визначити ознаку Шредера

C Визначити ознаку Альфельда
D Виміряти артеріальний тиск
E Провести контрольну тракцію на пуповину

320Третій період пологів. Роділля дала проінформовану письмову згоду відносно активної тактики ведення третього періоду пологів. З першої хвилини після народження плода акушерка діє наступним чином:
A *Вводить внутрішньом'язево 10 од. окситоцину
B Проводить масаж дна матки через передню черевну стінку
C Перетискає та перерізає пуповину
D Проводить тракцію за пуповину
E Здійснює катетеризацію сечового міхура

321Третій період пологів. Ознаки Кюстнера-Чукалова, Клейна, Альфельса позитивні. Після поту жування плацента не народжується. Акушерська тактика:
A *Використовувати зовнішні прийоми виділення посліду
B Використовувати ручне відокремлення плаценти і виділення посліду
C Очікувати 30 хвилин до завершення III періоду пологів
D Надати наркоз
E Запропонувати роділлі потужитися

322Послід народився. Огляд посліду розпочинають з:
A *Материнської поверхні плаценти
B Плодової поверхні плаценти
C Огляду оболонок
D Виявлення обірваних судин, які відходять від краю плаценти
E Вимірювання і зважування плаценти

323Породілля 20-ти років. Пологі перші, неускладнені. Третя доба післяпологового періоду. Стан задовільний, температура - 36,7°*C*, Ps- 76/хв., АТ- 115/60 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Дно матки на три пальці нижче пупка. Молочні залози помірно нагрублі, соски чисті. Який характер лохій слід очікувати у даної породіллі?
A **Lochia rubra*
B *Lochia flava*
C *Lochia alba*
D *Lochia serosa*
E *Lochiaometra*

324До акушерки ФАПу звернулась вагітна 36-ти років. Дана вагітність п'ята, 30 тижнів. При огляді живіт кулястої форми. При зовнішньому акушерському дослідженні виявлено: дно матки розміщено на два пальці вище пупка, справа від пупка палькується щільна округла частина, зліва - м'якувата, неправильної форми. Передлегла частина над входом в малий таз не визначається. Серцебиття плода вислуховується справа від пупка - 136/хв., ясне, ритмічне. Ваш попередній діагноз:
A *Поперечне положення плода, II позиція
B Косе положення плода, II позиція
C Поперечне положення плода, I позиція

D Косе положення плода, І позиція
E Поздовжнє положення плода, ІІ позиція

325Повторновагітна у терміні 36 тижнів скаржиться на неприємні відчуття у животі та попереку задишку, серцебиття. Ці симптоми з'явилися 3-4 дні тому і поступово посилюються. При об'єктивному обстеженні дно матки під мечеподібним відростком, ОЖ- 120 см, матка при пальпації напружена, тугоеластичної консистенції, визначається флюктуація. Положення плода нестійке, серцебиття прослухати важко, приглушене. Ваш попередній діагноз:
A *Гостре багатоводдя
B Хронічне багатоводдя
C Міхурцевий занесок
D Хоріонепітеліома
E Багатоплідна вагітність

326Вагітна 17-ти років з'явилась у черговий прийом до акушерки ФАПу. Дана вагітність І, 34-35 тижнів. За тиждень прибавила у вазі 600 г. АТправ.- 135/70 мм рт.ст., АТлів.- 120/60 мм рт.ст. На момент огляду самопочуття добре, скарг не пред'являє. Головного болю немає. Рухи плоду чує добре, набряків немає. Ваш попередній діагноз:
A *Вагітність І, 34-35 тижнів. Прегестоз
B Вагітність І, 34-35 тижнів. Артеріальна гіпертензія
C Вагітність І, 34-35 тижнів. Набряки під час вагітності
D Вагітність І, 34-35 тижнів. Передеклампсія легкого ступеня
E Вагітність І, 34-35 тижнів

327Вагітна 17-ти років з'явилась у черговий прийом до акушерки ФАПу. Дана вагітність І, 34-35 тижнів. За тиждень прибавила у вазі 600 г. АТправ.- 135/70 мм рт.ст., АТлів.- 120/60 мм рт.ст. На момент огляду самопочуття добре, скарг не пред'являє. Головного болю немає, Рухи плоду чує добре, набряків немає. Тактика акушерки:
A *Провести функціональні проби
B Рекомендувати щоденні зважування вдома
C Направити на консультацію до акушера-гінеколога
D Направити на консультацію до терапевта
E Рекомендувати раціональне і збалансоване харчування

328Першовагітна 34-х років у терміні вагітності 36-37 тижнів. Скаржиться на головний біль у потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носу та утруднення носового дихання. Зранку з'явились болісні відчуття в ділянці шлунку, нудота. АТ- 170/100, 180/110 мм рт.ст., набряки гомілок. Ваш попередній діагноз:
A *Вагітність І, 36-37 тижнів. Прееклампсія важкого ступеню
B Вагітність І, 36-37 тижнів. Прееклампсія середнього ступеня важкості
C Вагітність І, 36-37 тижнів. Прееклампсія легкого ступеню
D Вагітність І, 36-37 тижнів. Еклампсія
E Вагітність І, 36-37 тижнів. Артеріальна гіпертензія

329Першовагітна 34-х років у терміні вагітності 36-37 тижнів. Скаржиться на головний біль у потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носу та

утруднення носового дихання. Зранку з'явились болісні відчуття в ділянці шлунку, нудота. АТ-170/100, 180/110 мм рт.ст., набряки гомілок. Яку першу невідкладну допомогу слід надати вагітній?
A *Введення розчину сульфату магнію 25% - 16 мл
B Введення розчину лаз іксу 40 мг
C Введення розчину но-шпи 2% - 2 мл
D Введення розчину димедролу 1% - 1 мл
E Введення розчину анальгіну 50% - 2 мл

330Першовагітна 19-ти років жаліється на нудоту, повторну блювоту 3-4 разів на добу, зниження апетиту, слинотечу, що розвинулись на протязі останніх двох тижнів. Обстежено загальний стан, задовільний, *t°* - 36,7°*C*. Пульс - 84/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. Спеціальне гінекологічне дослідження: виявило синюшність слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена до розмірів гусячого яйця. Ваш попередній діагноз:
A *Блювота вагітних, легка форма, слинотеча
B Блювота вагітних, середньо-важка форма, слинотеча
C Блювота вагітних, важка форма, слинотеча
D Харчова токсикоінфекція
E Птиалізм

331Акушерка ФАПу викликана до вагітної додому. Зі слів родичів вагітна впала, втратила свідомість, був напад судом. На момент огляду: вагітна поступово приходить до свідомості, Скарги на головний біль, загальну слабість, погіршення зору. Про напад нічого не пам'ятає. Вагітність I, 37-38 тижнів, АТ- 170/110 мм рт.ст., Ps- 90/хв., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці. Ваш попередній аналіз:
A *Еклампсія
B Прееклампсія важкого ступеня
C Прееклампсія середньої тяжкості
D Прееклампсія легкого ступеня
E Епілепсія

332Акушерка ФАПу викликана до вагітної додому. Зі слів родичів вагітна впала, втратила свідомість, був напад судом. На момент огляду: вагітна поступово приходить до свідомості, жаліється на головний біль, загальну слабість, погіршення зору. Про напад нічого не пам'ятає. Вагітність I, 37-38 тижнів, АТ-170/110 мм рт.ст., Ps- 90/хв., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці. Ваші першочергові дії (тактика):
A *Ввести розчин сульфату магнію 25% - 16, викликати спеціалізовану бригаду швидкої допомоги
B Ввести розчин сульфату магнію 25% - 16. Залишити під наглядом родичів
C Ввести розчин анальгіну 50% - 2, викликати бригаду швидкої допомоги
D Ввести розчин дібазолу 1% - 3, госпіталізувати попутним транспортом
E Рекомендувати здати аналіз сечі на білок, з'явитись на прийом до лікаря жіночої консультації

333Першовагітна 23-х років у терміні вагітності 38 тижнів, доставлена у пологовий будинок бригадою швидкої допомоги зі скаргами на сильний головний біль, переважно в потиличній ділянці, сильні болі в животі. Живіт збільшений за рахунок

вагітної матки, болючий при пальпації, матка напружена, болюча, серцебиття плода - 170/хв., тони глухі. АТ- 180/110 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Виражені набряки нижніх кінцівок, передньої черевної стінки. Виділення з піхви кров'янисті, помірні. Яку тактику ведення слід обрати?
A *Негайне оперативне родорозрішення шляхом операції кесарського розтину.
B Здійснити лікування дистресу
C Розпочати комплексну інтенсивну терапію пізнього гестозу
D Амніотомія, вести пологичерез природі пологві шляхи
E -

334Роділля 29-ти років доставлена у пологове відділення з активною пологовою діяльністю. Дана вагітність 1, доношена. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки повне плодового міхура немає пальпуються сіднички плода у вузькій частині порожнини тазу. Яка допомога найбільш доцільна у даному клінічному випадку?
A *Ручна допомога за методом Цов'янова при чисто сідничному передлежанні
B Ручна допомога за методом Цов'янова при ніжному передлежанні
C Ручна допомога при змішаному сідничному передлежанні
D Класична ручна допомога
E Екстракція плода за тазовий кінець

335Пологи в тазовому передлежанні, II період пологів. Плід народився до пупка, вивести плечовий пояс та голівку за методом Цов'янова не вдається. Подальша тактика:
A *Використати прийоми класичної ручної допомоги
B Використати ручну допомогу за методом Цов'янова при ніжному передлежанні
C Використати операцію витягування плода за ніжку
D Використати операцію витягування плода за обидві ніжки
E Використати операцію витягування плода за паховий згин

336Повторновагітна 38-ми років, дана вагітність 5, на обліку не перебувала,звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на задишку, набряки на гомілках. Об'єктивно: дно матки розміщено високо, під мечеподібним відростком, ОЖ- 118 см. Над входом в малий таз палькується голівка невеликих розмірів, в дні матки пальпуються округла правильної форми балотуюча частина, та частина плода м'якуватої консистенції неправильної форми. Праворуч та ліворуч в різних відділах живота промацується дрібні частини плода. Серцебиття виразно вислуховується справа і зліва від пупка. Ваш попередній діагноз:
A *Багатоплідна вагітність. Двійня
B Вагітність п'ята. Багатоводдя
C Міхуровий занесок
D Багатоплідна вагітність. Трійня
E Багатоплідна вагітність. Тазове передлежання першого плода

337До акушерки ФАПу звернулась першовагітна 18-ти років у терміні 8 тижнів. Ріст - 178 см, вага - 60 кг, розміри тазу: 22-25-27-22 см. Яка форма тазу у даної жінки?
A *Поперечно звужений таз
B Нормальний таз
C Простий плоский таз

D Плоско рахітичний таз
E Загальнорівномірнозвужений таз

338На 3-ю добу після родів породілля 32-х років жаліється на болі внизу живота, озноб, головний біль, підвищення температури тіла до 39°*С*. В родах в зв'язку з частковим щільним прикріпленням плаценти проведено ручне відшарування плаценти і видалення посліду. В анамнезі одні роди, два мед аборти, хронічний пієлонефрит. Молочні залози помірно нагрубші. Який діагноз найбільш вірогідний?
A *Ендометрит
B Гостре респіраторне захворювання
C Мастит
D Загострення хронічного пієлонефриту
E Лохіометра

339На 3-ю добу після родів породілля 32-х років жаліється на болі внизу живота, озноб, головний біль, підвищення температури тіла до 39°*С*. В родах в зв'язку з частковим щільним прикріпленням плаценти проведено ручне відшарування плаценти і видалення посліду. В анамнезі одні роди, два мед аборти, хронічний пієлонефрит. Молочні залози помірно нагрубші. Який метод лікування?
A *Антибактеріальна терапія
B Інструментальна ревізія порожнини матки
C Призначити уросептики
D Призначити діуретини
E Вітамінотерапія

340В родах відбувся розрив промежини з пошкодженням *m. sphincter ani* стінка прямої кишки ціла. Ваш діагноз:
A *Розрив промежини III ступеня неповний
B Розрив промежини I ступеня
C Розрив промежини II ступеня
D Розрив промежини III ступеня повний
E Розрив промежини самовільний

341У гінекологічне відділення госпіталізована вагітна 24-х років у терміні 18-19 тижнів у зв'язку з діагностованою під час УЗД істміко-цервікальною недостатністю. P.V.: шийка матки вкорочена до 0,5 см, церві кальний канал пропускає палець. Плодовий міхур цілий. Матка відповідає терміну вагітності, в нормо тонусі. Яка подальша практика?
A *Накладання швів на шийку матки
B Проведення профілактики дистрес-синдрому
C Токолітична терапія
D Переривання вагітності
E Седативна терапія

342До акушерки ФАПу звернулась вагітна зі скаргами на відчуття важкості і тиснення внизу живота і на пряму кишку. Термін вагітності 16-17 тижнів. В анамнезі: одні роди і 3 штучних аборти. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 2,5 см, зовнішній зів привідкритий, канал шийки закритий. Матка відповідає терміну вагітності. Виділення з статевих шляхів слизисті, помірні. Ваш попередній діагноз:

A *Загрозливий мимовільний викидень
B Аборт в ходу
C Викідень, що не відбувся
D Повний викидень
E -

343До акушерки ФАПу звернулась вагітна зі скаргами на відчуття важкості і тиснення внизу живота і на пряму кишку. Термін вагітності 16-17 тижнів. В анамнезі:одні роди і 3 штучних аборти. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 2,5 см, зовнішній зів привідкритий, канал шийки закритий. Матка відповідає терміну вагітності. Виділення з статевих шляхів слизисті, помірні. Ваша тактика:
A *Госпіталізація в гінекологічне відділення
B Госпіталізація у відділення патології вагітності
C Призначити ліжковий режим на дому
D Направити в жіночу консультацію
E Забезпечити активний патронаж на дому

344Вагітна в терміні 11-12 тижнів доставлена до гінекологічного стаціонару з матковою кровотечею та переймоподібними болями внизу живота. Піхвове дослідження: піхва заповнена згустками крові, шийка матки розкрита на 2 см. В каналі визначається напружений плідний міхур. Матка збільшена до розмірів 11-12 тижнів вагітності, напружена. Виділення кров'янисті, дуже рясні. Яка подальша тактика?
A *Вишкрібання порожнини матки
B Проведення гемо трансфузії
C Консервативне спостереження
D Проведення токолітичної терапії
E Призначення прогестерону

345Хвора 22-х роки поступила у гінекологічне відділення за направленням жіночої консультації, де встановлена невідповідність розмірів матки строку вагітності. Остання менструація 4 місяці тому. Вагінальне дослідження: шийка матки довжиною до 2,5 см, щільна, зовнішнє вічко закрите. Тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Аборт, що не відбувся
B Загроза аборту
C Аборт, що розпочався
D Аборт у ходу
E Неповний аборт

346Вагітна у терміні 28 тижнів жаліється на підвищення температури до 37,6°*C*, точкові висипання на обличчі та шиї, які зливаються і поступово поширюються на все тіло. Попередній діагноз: краснуха. Яка подальша тактика?
A *Госпіталізувати в інфекційне відділення
B Госпіталізувати в пологовий будинок
C Залишити дома під наглядом родини
D Направити в жіночу консультацію

E Направити на переривання вагітності

347Повторні пологи у жінки 30-ти років тривають 18 годин. Дві години тому почались потуги. Піхвове дослідження: відкриття маткового зіву повне. Сагітальний шов в прямому розміру площини виходу з тазу, мале тім'ячко біля лона. На момент огляду потуги ослабли, ЧСС плоду - 100/хв., аритмія. Визначіть подальшу тактику:
A *Накладання вихідних акушерських щипців
B Посилення пологової діяльності
C Кесарів розтин
D Накладання порожнинних акушерських щипців
E Очікувальна тактика

348Першородяча 27-ми років. З нормальним тазом і доношеною вагітністю. Голівка малим сегментом у входів малий таз. Серцебиття плоду ритмічне, ясне, 130/хв. Піхвове дослідження: розкриття маткового зіву на 1,5 пальця. Плодовий міхур цілий. Пологи тривають 24 год. Перейми через 5-6 хв., короткочасні, малоефективні. Ваш діагноз:
A *Первинна слабість пологової діяльності
B Вторинна слабість пологової діяльності
C Дискординова пологова діяльність
D Надмірно сильна пологова діяльність
E Нормальний розвиток пологової діяльності

349При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: відсутність характерної опуклості спинки в бокових відділах матки, наявність заглибини між розігнутою голівкою і тулубом плода. Серцебиття вислуховується зі сторони грудної його поверхні. Враховуючи дані обстеження слід подумати про:
A *Лицеве передлежання
B Передньоголовне передлежання
C Тазове передлежання
D Потиличне передлежання
E Повне ніжне передлежання

350До акушерки ФАПу звернулась вагітна жінка, 25-ти років, із скаргами на *t*° - 39°*C*, головний біль, нудоту, підвищену чутливість до подразників. При обстеженні: у вагітної виявлені позитивний симптом Керніга, ригідність м'язів потилиці. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Менінгіт
B Мігрень
C Розсіяний склероз
D Мієліт
E Енцефаліт

351Жінка на третьому місяці вагітності звернулася до акушерки ФАПу. Під час бесіди жінка втратила свідомість і впала на підлогу.При огляді: шкіра обличчя бліда з цианотичним відтінком, судоми у всьому тілі, піна з рота забарвлена кров'ю, мимовільне сечовипускання. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Епілептичний напад

B Гіпоглікемічна кома
C Ішемічний інсульт
D Алкогольний делірій
E Істерія

352Після проведення коригуючої гімнастики у вагітної із поперечним положенням плода не відбулося повороту в поздовжнє положення. Жінку направили в стаціонар для проведення зовнішнього повороту плода на голівку, протипоказань не має. При якій умові не доцільно застосувати поворот?
A *Термін вагітності 26-27 тижнів
B Термін вагітності 32-36 тижнів
C Задовільний стан матері та плода, нормальний тонус матки
D Податливість і нормальна товщина передньої черевної стінки
E Нормальна кількість навколо плодових вод, яка забезпечує достатню рухомість плода

353о акушерки ФАПу звернулася першовагітна, термін вагітності 29-30 тижнів. Діагностовано сідничне передлежання плоду. Екстрогенітальних захворювань та захворювань пов'язаних з вагітністю не встановлено. В якому терміні вагітності найдоцільніше призначити коригувальну гімнастику?
A *З 28-30 тижнів
B З 12-20 тижнів
C З 20-24 тижнів
D З 34-36 тижнів
E З 24-25 тижнів

354В пологовій залі народжує жінка, в якої повне розкриття шийки матки, плоский плодовий міхур. Яку акушерську маніпуляцію найдоцільніше провести в даній ситуації?
A *Амніотомію
B Ввести окситоцин
C Ввести магнезію
D Провести оксигенотерапію
E Випустити сечу катетером

355У відділенні патології вагітності на лікування поступила вагітна жінка із діагнозом прееклампсія середньої тяжкості. Який гіпотензивний препарат найдоцільніше ввести за призначенням лікаря для лікування даної патології?
A *Метилдофа 0,25 3-4 рази на добу
B Но-шпа 2 мл в/м 2 рази в день
C Нітрогліцерин 0,005 під язик
D Окситоцин 1 мл (5 ОД) 3 рази на день
E Розчин кальцію глюконату 10% 1 раз на день

356Після пологів у породіллі у якої під час вагітності і пологів була прееклампсія середньої тяжкості, яка перейшла в тяжку прееклампсію. Яка найбільш доцільна акушерська тактика в даному випадку?
A *Перевести породіллю в палату інтенсивної терапії із цілодобовим спостереженням

B Перевести породіллю в терапевтичне відділення.
C Залишити породіллю в післяпологовому відділенні
D Поставити очисну клізму
E Провести УЗД

357В пологовій залі народжує повторновагітна 38-39 тижнів вагітності. Акушерка надає ручну допомогу за Цовяновим І. При якому виді тазового передлежання найбільш доцільно надати таку допомогу?
A *Чисто сідничне передлежання
B Ніжне передлежання
C Колінне передлежання
D Змішане сідничне передлежання
E Головне передлежання

358В пологовій залі народжує жінка в тазовому передлежанні. З якою метою проводять класичну ручну допомогу?
A *Звільнення ручок і голівки плода, в змішаному сідничному передлежанні
B Для звільнення тільки голівки плода
C Для звільнення тільки ручок плода
D Для звільнення сідничок плода
E Ля виведення плечового пояса плода

359Вагітній з істмікоцервікальною недостатністю було проведено операцію за методом Макдональда.В якому, терміні найбільш доцільно зняти шов накладений на внутрішнє вічко шийки матки?
A *38-39 тижнів
B 30-32 тижнів
C 40-41 тижнів
D 35-36 тижнів
E 12-16 тижнів

360В пологовий будинок поступила вагітна, 32-33 тижні вагітності зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. При піхвовому обстеженні: шийка матки розкрита на 2 см. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?
A *Токолітична терапія на строк 48 год., глюкокортикоїди
B Перервати вагітність
C Провести стимуляцію пологів
D Вичікувальна тактика
E Призначити очисну клізму

361Вагітна, 41-42 тижні вагітності, була направлена у пологовий зі скаргами на послаблення рухів плода. Яка найбільш доцільна тактика розродження пацієнтки?
A *Кесарів розтин
B Збудження пологової діяльності окситоцином
C Очікування початку самостійної пологової діяльності
D Проведення окситоцинового тесту
E Збудження пологової діяльності

362У роділлі, яка поступила в стаціонар із нормальною пологовою діяльністю в

кінці першого періоду пологів перейми уповільнились, тривають по 25-30 с через 4-5 хв. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Вторинна слабкість пологової діяльності
B Дискоординована пологова діяльність
C Первинна слабкість пологової діяльності
D Бурхлива пологова діяльність
E Дистоція шийки матки

363У пологовій будинок доставлено роділлю із переймами, які виникли раптово, відбуваються через короткий проміжок часу. Надалі виникли судомні перейми. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика при даному захворюванні?
A *Ослабити пологову діяльність
B Стимуляція пологової діяльності
C Покласти роділлю на бік, який відповідає позиції плода
D Ввести серцеві глікозиди
E Призначити сечогінні препарати

364У повторно родячої, якій було призначено медикаментозний відпочинок, а потім проведено стимуляцію пологової діяльності виникла бурхлива пологова діяльність, загроза розриву матки. Яка найбільш доцільна акушерська тактика у даному випадку?
A *Припинити пологову діяльність і завершити пологи шляхом операції кесарського розтину
B Стимулювати пологову діяльність
C Припинити пологову діяльність
D Провести плодоруйнівну операцію
E Провести операцію зовнішньо-внутрішній поворот плода за ніжку

365У повторнородячої при внутрішньому акушерському обстеженні виявили, що стріловидний шов стоїть у попереч-ному розмірі над входом в малий таз і відхилений до лона, палькується більша частина задньої тім'яної кістки. Пологи вирішили вести шляхом кесарського розтину. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Задній асинклітизм Літцмана
B Передньоголовне передлежання
C Передній асинклітизм Негеле
D Лицеве передлежання
E Лобне передлежання

366У жінки, вагітної вперше, збільшення маси тіла протягом 32-го тижня вагітності склало 600 г. Який доступний приріст маси тіла у вагітних в нормі за тиждень?
A *200-300 г на тиждень
B 1000 г на тиждень
C 800 г на тиждень
D 100 г на тиждень
E 600 г на тиждень

367Жінка яка поступила на пологи стався напад еклампсії. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?
A *Протисудомна терапія, кесарів розтин

B Магнезіальна терапія до терміну пологів, потім-кесарів розтин
C Вибір залежить від стану плода
D Одразу розродження через природні пологові шляхи з накладанням щипців
E Інтенсивна терапія протягом доби, після чого розродження через природні пологові шляхи

368При вимірюванні таза встановлено, що діагональна кон'югата дорівнює 12 см. Обвід променево-зап'ястного суглоба 14 см. Чому дорівнює істинна кон'югата?
A *10,5 см
B 10 см
C 11 см
D 9,5 см
E 8,5 см

369На передлеглій голівці палькується сполучнотканинна пластинка трикутної форми, де сходиться три шва. Яке тім'ячко палькується?
A *Мале тім'ячко
B Бокове переднє тім'ячко
C Велике тім'ячко
D Бокове заднє тім'ячко
E Мале переднє тім'ячко

370У вагітних спостерігається зниження рівня гемоглобіну, гематокриту. Чим пояснюється зниження рівня цих показників?
A *Збільшення об'єму плазми
B Зменшення об'єму плазми
C Збільшення кількості тромбоцитів
D Зменшення кількості тромбоцитів
E -

371Вагітна 35-ти років, термін вагітності 12 тижнів. Для оцінки ступеня зростання маси, їй рекомендовано перевіряти вагу один раз на тиждень. Яке зростання маси за тиждень можна вважати у даної вагітної нормою?
A *300 г
B 600 г
C 800 г
D 900 г
E 100 г

372При обстеженні матки у пацієнтки з вагітністю раннього строку встановлена асиметрія матки, лівий кут матки виступає значно більше ніж правий. Яка ознака раннього строку вагітності визначається?
A *Піскачека
B Гентера
C Гегара-Горвіца
D Снігірева
E Довженко

373Пацієнтка 24-х років звернулася до лікаря з приводу затримки менструації на

2 тижні. Лікар підозрює вагітність раннього строку. Яке дослідження дозволить встановити діагноз вірогідно?
A *Трансвагінальне УЗД
B Бімануальне дослідження
C Пальпація молочних залоз
D Імунологічний тест на чіткість
E Дзеркальне дослідження

374При обстеженні вагітної встановлено, що плід має повздовжнє положення, голівка притиснута до входу в малий таз, спинка палькується зліва, повернута наперед, серцебиття вислуховується зліва нижче пупка. Яке передлежання, позиції, вид плода?
A *Головне передлежання, перша позиція, передній вид
B Тазове передлежання, перша позиція, передній вид
C Головне передлежання, друга позиція, задній вид
D Тазове передлежання, друга позиція, передній вид
E Поперечне положення

375Вагітність 38-39 тижнів. Головне передлежання, перша позиція, передній вид. Проведено дослідження біофізичного профілю плода, встановлено за 30 хв. спостереження дихальних рухів - 2, рухів плода - 4, кінцівки зігнуті, розгинання 2 рази, не стресовий тест 5 акселерацій, вертикальний розмір вільної ділянки вод - 1. Яка оцінка БПП?
A *9 балів
B 7 балів
C 5 балів
D 3 бали
E 2 бали

376Жінка 28-ми років госпіталізована з регулярною пологовою діяльністю. Вагітність перша. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка 6 см, стрілоподібний шов в лівому косому розмірі, мале вічко зліва і позаду. Голівка малим сегментом у входів малий таз. Яке передлежання, позиція, вид?
A *Потиличне передлежання, перша позиція, задній вид
B Потиличне передлежання, перша позиція, передній вид
C Потиличне передлежання, друга позиція, задній вид
D Потиличне передлежання друга позиція
E Сідничне передлежання, передній вид

377Вагітна 20-ти років. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки повне, предлегла частина, голівка знаходиться в площині виходу з малого тазу. Стрілоподібний шов в прямому розмірі таза, мале тім’ячко під симфізом. Який момент біомеханізму голівки?
A *Розгинання голівки
B Внутрішній поворот
C Згинання голівки
D Внутрішній поворот плечиків
E Опускання голівки

378Через 5 хв після народження плоду у роділлі матка відхилилася вправо і дно її визначається на 3 см над пупком. Із вагіни помірні кров'яні виділення. Яка ознака відокремлення плаценти спостерігається?
A *Шредера
B Кюснера-Чукалова
C Альфельда
D Довженко
E Абуладзе

379При внутрішньому акушерському дослідженні встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні інтерспінальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки?
A *Великим сегментом у входа в малий таз
B Малим сегментом у входа в малий таз
C В порожнині таза
D Голівка в площині виходу
E Голівка в вузькій частині

380При внутрішньому дослідженні встановлено, що предлегла голівка спереду, ближче до лона палькується мале тім'ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь конфігурації голівки?
A *II
B III
C I
D Нульова
E IV

381Через 10 годин після своєчасних нормальних пологів у породіллі спостерігається температура - 37,7°*C*. Скарги на слабкість, переймоподібні болі внизу живота, який посилюється при годуванні новонародженого. При обстеженні помірне нагрубання молочних залоз, соски без патології. Матка тверда, чутлива при дослідженні, дно на рівні пупка. Лохії з домішкою крові у помірній кількості. Який попередній діагноз?
A *Пізній післяпологовий період, перша доба
B Лактостаз
C Сумінволюція матки
D Залишки частин посліду у порожнині матки
E Ранній післяпологовий період

382У породіллі 27-ми років, на 3-ю добу післяпологового періоду має місце розвиток значного нагрубання молочних залоз. У зв'язку з цим їй необхідно рекомендувати:
A *Продовжити годування груддю за потребою
B Скасування грудного годування, зціджування молочних залоз
C Зігріваючий компрес
D Скасувати користування бюстгальтером
E Холод

383У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із перерахованого є першочерговим при наданні медичної допомоги?
A *Забезпечити прохідність дихальних шляхів
B Масковий наркоз
C Подача кисню
D Виміряти АТ
E Зігріти хвору

384У вагітної на профліжку з діагнозом передлежання плаценти раптово почалась кровотеча. Що із перерахованого є першочерговим в діях акушерки?
A *Негайно викликати лікаря
B Визначити групу крові
C Холод на низ живота
D Ввести скоротливі
E Ввести спазмолітики

385Акушерку викликали до роділлі у якої підвищилась температура до 39°*C*, біль в молочній залозі. Акушерка без перевірки на чутливість увела в/м пеніцилін, у жінки виник шум у вухах, холодний піт, шкірний свербіж, ціаноз. Що треба зробити передусім?
A *Місце введення обробити адреналіном 0,1%
B Ввести серцеві препарати
C Гемодез
D ШВЛ
E Непрямий масаж серця

386Акушерку викликано додому до вагітної, у якої виникла біль у животі. Вагітність 36 тижнів. Гіпертонічна хвороба. Матка болюча, напружена. Який попередній діагноз?
A *Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти
B Бокове передлежання
C Розрив матки
D Крайове передлежання
E -

387У пологовий будинок доставлено роділлю з повторною вагітністю терміном 40 тижнів. Дві години тому почалася значна кровотеча. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття 1 см, зів закритий густою тканиною, значна кровотеча. Який попередній діагноз?
A *Центральне передлежання плаценти
B Крайове передлежання
C Передчасне відшарування
D Гіпотонічна кровотеча
E Залишки частин посліду

388У вагітної 36 тижнів після прийому їжі спостерігається головний біль, блювання, біль в епігастральній ділянці. Дії акушерки:
A *Виміряти АТ

B Ввести спазмолітики
C Промити шлунок
D Ввести проти блювотні засоби
E Поставити клізму

389Роділля знаходиться в першому періоді пологів. Виникла загроза розриву матки. Вказати першочергові заходи невідкладної допомоги:
A *Викликати лікаря, зняти пологову діяльність
B Викликати лікаря, ввести спазмолітини
C Викликати лікаря, стимулювати пологову діяльність
D Викликати лікаря, провести піхвове дослідження
E Викликати лікаря, ввійти в вену

390Нормальне положення матки:
A *Антефлексіо
B Ретрофлексіо
C Латерофлексіо
D Декстрофлексіо
E Інтерфлексіо

391Головна кровопостачальна судина матки:
A *Маткова артерія
B Аорта
C Яєчникова
D Подчревна
E Стегнова

392Нормальні розміри великого таза:
A *25-28-31-20
B 25-25-31-17
C 25-28-31-11
D 25-28-31-13
E 25-28-31-14

393Допомога при гіпотонічній кровотечі:
A *Скоротливі засоби, ручне обстеження, масаж на кулаці
B Зовнішній масаж матки
C Кровоспинні препарати
D Скоротливі засоби
E Холод на низ живота

394У разі центрального передлежання плаценти розродження проводять методом:
A *Кесаревого розтину
B Витягання за тазовий кінець
C Витягування за голівку
D Накладання щипців
E Консервативним

395У випадку справжнього прирощення плаценти потрібно:
A *Над піхвова ампутація матки
B Ручне відокремлення плаценти
C Виділення посліду зовнішніми способами
D Введення метилергометрину
E Введення спазмолітинів

396Дії акушерки в разі загрози розриву матки:
A *Зупинити пологову діяльність
B Ввести окситоцин
C Провести перінеотомію
D Ввести сигетин
E Ввести серцеві препарати
397Дії акушерки у випадку підозри на передлежання плаценти:
A *Викликати лікаря, розгорнути операційну, мобілізувати вену
B Ввести серцеві препарати
C Терміново провести піхвове дослідження
D Розгорнути операційну
E Дати наркоз

398У новонародженого зовнішній масаж серця проводять:
A *Двома пальцями
B Однією рукою
C Тільки масажером
D Немає значення
E Двома руками

399Вірогідні ознаки вагітності:
A *Вислуховування серцебиття
B Смакові уподобання
C Промацування частин плода
D Припинення менструації
E Виділення кристелеровської пробки

400Положення плода:
A *Розміщення осі плода щодо осі матки
B Розміщення спинки плода щодо перед або задньої стінок матки
C Розміщення плода щодо стінки матки
D Членорозташування плода
E Розміщення голівки щодо стінок матки

401Запліднення яйцеклітини відбувається в:
A *Матковій трубі
B Брюшній порожнині
C Каналі шийки матки
D Порожнині матки
E Піхві

402Провідна вісь таза - це:

A *Середина усіх прямих розмірів площин таза
B Прямий розмір площини таза
C Косий розмір площини таза
D Середина справжньої кон'югати
E Середина бокової кон'югати

403Препарат для профілактики гонобленореї:
A *Мазь тетрациклінова
B Розчин фурациліну
C 30% розчин натрію сульфату
D 0,5% розчин перманганату калія
E Розчин срібла

404В якому випадку найбільш ймовірний розвиток гемолітичної хвороби у новонародженого:
A *Мати Rh(-) плід Rh(+)
B Мати Rh(+) чоловіка Rh(+)
C Мати Rh(+) плід Rh(+)
D Мати Rh(+) плід Rh(-)
E Мати Rh(-) чоловіка Rh(-)

405Які судини проходять у пуповині?
A *2 арт. 1 вена
B 2 арт. 2 вени
C 2 вени 1 арт.
D 3 вени 1 арт.
E 1 арт. 4 вени

406Вкажіть розмір справжньої кон'югати:
A *11 см
B 14 см
C 15 см
D 12 см
E 13 см

407Який гормон виробляє плацента?
A *Хоріонічний гонадотропін
B Пітуітрін
C Преднізолон
D Інсулін
E Адреналін

408Вкажіть як оцінюється стан новонароджених:
A *За шкалою Апгар
B За шкалою Вітлінгера
C Перебігом пологів
D Шляхом антропометрії
E Шляхом зважування

409Вагітна поступила у відділення в 36 тижнів вагітності зі скаргами на головну біль, набряки, підвищення АТ- 160/100 мм рт.ст. В сечі білок. Про розвиток якого захворювання свідчить дана клінічна картина:
A *Прееклампсія
B Еклампсія
C Гіпертонія
D Набряки
E Прееклапсія легкого стану

410Породіллі в ранньому післяпологовому періоді з геморагічним шоком перед усім треба:
A *Наладити інфузію розчин у дві вени
B Ввести преднізолон
C Ввести знеболюючі
D Ввести кальцію хлорид
E Ввести кордіамін

411При веденні пологів при чисто сідничному предлежанні за методом Цовянова відбулося випадіння ніжок плода. Який метод необхідно викорстати для швидкого народження плода?
A *Екстракція плода за ніжки
B Кесарів розтин
C Застосувати класичну ручну допомогу
D Екстракція плода за паховий згин
E Зовнішній поворот по Архангельскому

412В родильном отделение поступила роженица для родоразрешения с доношенной беременностью. Схватки через 3-4 минуты по 45-50 секунд. При осмотре положения плода продольное. Предлежит тазовый конец. Серцибиение плода - 140/мин. ритмичное. P.V.: влагалище рожавшей женщины. Открытие шейки матки полное. Плодного пузиря нет. Предлежат ягодицы в правом косом раз мере в широкой части малого таза. Как вести роды?
A *Метод Цовьянов 1
B Кесарево сечение
C Метод Цовьянов 2
D Наружный поворот по Архангельскому
E Классическое ручное пособие

413У беременной 27-ми лет при тазометрии оказалось, что наружные размеры таза: 26-29-31-20. Определите истинную коньюгату:
A *11 см
B 9 см
C 12 см
D 13 см
E 10 см

414После рождения последа, кровотечение из влагалища не прекратилось. Разрывов шейки матки и влагалища не выявлено, промежность и клитор целые.

При осмотре последа на материнской поверхности плаценты обнаружен участок размером 4х5 см, лишенный плацентарной ткани. Оболочки последа целые. Что надо предпринять акушерке?
A *Ручное обследование полости матки
B Ввести окситоцин
C Дать наркоз
D Ввести спазмолитики
E Холод на низ живота

415Целость родившегося последа не вызывает сомнений. Родовые пути целы. Кровопотеря в послеродовом периоде составила 250 мл, кровотечение не прекращается. Матка мягкая, дряблая, плохо контурируется, дно ее стоит на 3 поперечных пальца выше пупка. После проведения ряда мероприятий(опорожнение мочевого пузыря, на низ живота пузырь со льдом, в/вено 1,0 окситоцин, массаж матки через переднюю брюшную стенку) кровотечение остановилось, однако через 1-2 мин. матки вновь расслабилась, кровотечение возобновилось, выделился большой сгусток крови. Какую помощь должна оказать акушерка?
A *Ручная ревизия стенок полости матки
B Холод на низ живота
C Ведение спазмолитиков
D Введение окситоцина
E Наркоз

416 В послеродовом периоде началось гипотоническое маточное кровотечение, в связи с чем произведено ручное отделение плаценты и выделение последа, массаж матки на кулаке. Родовые пути целы. Однако, кровотечение продолжалось и через 10 минут достигло 1500 мл. Несмотря на внутривенное введение одногрупной крови состояние родильницы резко ухудшилось, АД снизилось до 90/40 мм рт.ст., пульс нитевидный, кожные покровы и слизистые оболочки бледны, возбуждена, покрыта холодным потом, шоковый индекс - 1,5; ЦВД менее 50 мм вод.ст. Какую неотложную помощь надо оказать?
A *Лечение геморрагического шока 2 степени
B Ручное обследование полости матки
C Введение спазмолитиков
D Лечение эмболии околоплодными водами
E Холод на низ живота

417 Осмотр родовых путей показал: шейка матки и влагалище целые. В области промежности определяется глубокий разрыв кожи почти до заднего прохода, задней стенки влагалища, мышц, кроме наружного сфинкера заднего прохода. Оцените степень разрыва промежности и окажите помощь:
A *Ушить 2 степень разрыва промежности
B Ушить 1 степень разрыва промежности
C Ушить 3 степень разрыва промежности
D Ушить 4 степень разрыва промежности
E Наложить давящую повязку

418На протяжении 30 минут после рождения плода состояние роженицы

хорошее: матка плотная, шаровидная, дно её на уровне пупка, кровотечения нет. Лигатура, наложенная на отрезок пуповины, находится на прежнем уровне, при глубоком входе пуповины втягивается во влагалище, при надавливании ребром ладони над симфизом пуповины втягивается во влагалище. Кровянистых выделений из половых органов нет. Какую неотложную помощь должна провести акушерка?
A *Ручное отделение плаценты, выделение последа
B Выпустить мочу
C Ввести окситоцин
D Ввести спазмолитики
E Дать наркоз

419 При влагалищном исследование на предлежащей головке, расположенной в области малого таза, пальпируется нос, рот и подбородок плода, обращенный к крестцу. Как вести роды?
A *Путем кесарева сечения
B Через естественные родовые пути
C Наложить акушерские щипцы
D Подготовить пациентку к лапаротомии
E Подготовить инструменты к краниотомии

420У беременной в женской консультации произведена пельвеометрия: 26-27-30-17 см. Дайте характеристику размерам таза:
A *Плоскорахитичный
B Простой плоский
C Общеравномерносуженный
D Общесуженный плоский
E Поперечносуженный

421После рождения последа началось обильное кровотечение. На плаценте имеется дефект до 5 см. Родовые пути осмотрены - целы. Что необходимо провести акушерки?
A *Ручное обследование полости матки и массаж на кулаке
B УЗИ
C Холод на низ живота
D Выпустить мочу катетером
E Ввести окситоцин

422Регулярная родовая деятельность. Схватки по 40-45 с через 3 минуты, Появились умеренные кровяные выделения из половы путей. Головное предлежание. Во влагалище находятся сгустки крови. Стенки влагалища и шейки матки без патологических изменений. Раскрытие маточного зева на 4 см внутренний зев на 1/3 выполнен губчатой тканью с шероховатой поверхностью, рядом с ней определяются плотные оболочки. После влагалищного исследования кровотечение усилилось, кровопотеря достигла 200 мл. Как вести роды?
A *Вскрыть плодный пузырь
B Ввести окситоцин
C Ввести спазмолитики
D Поставить очистительную клизму

E Выпустить мочу

423У роженицы, с повторным кровотечением, что необходимо предпринять для диагностики данной патологии?
A *УЗИ
B Кольпоскапию
C Пельвеометрию
D Применить приемы Леопольда
E Измерить высоту стояния дна матки

424 Молодая супружеская пара, которая планирует рождения ребенка, обратилась к акушерки ФАП. Она интересуется, на каком сроке беременности необходимо встать на учет. Дайте правильную рекомендацию:
A *До 12 недель
B Сразу после последней менструации
C После ощущения первого шевеления плода
D В 16 недель
E В 20 недель

425У роженицы во время родов плодом массой 4500 г появилась резкая боль внизу живота, больше справа. АД- 60/40 мм рт.ст. Послед выделился самостоятельно. Матка плотная. Шейка матки, стенки влагалища и промежность целы, кровотечение продолжается. Какую неотложную помощь должна оказать акушерка?
A *Вызвать врача и готовить операционную
B Выпустить мочу катетером
C Подготовить больную к УЗИ
D Ввести окситоцин
E Дать наркоз

426У родильницы на вторые сутки после нормальных родов появились жалобы на резкие боли внизу живота, слабость, плохой сон, отсутствие аппетита. Наблюдалось повышение температуры тела до 39°*C*, учащение пульса до 110/мин. Во время осмотра определяется болезненная и увеличенная матка. Лохии мутно-кровянистые. Что должна акушерка предпринять?
A *Вызвать врача
B Измерить АД
C Выпустить мочу катетером
D Ввести антибиотики
E Ввести спазмолитики

427 В приемное отделение родильного дома скорой помощью доставлена беременная с жалобами на боль в пояснице, иррадиирующую в левую паховую область, озноб. Температура тела - 39,9°*C*, признаки интоксикации. Предварительный диагноз: гестационный пиелонефрит. Какой наиболее вероятный результат лабораторного обследования, подтверждающий указанный диагноз?
A *Пиурия
B Альбуминурия

C Ацетонурия
D Глюкозурия
E Гипопротеинемия

428 У беременных в позднем сроке беременности во время длительного пребывания в горизонтальном положении могут появиться признаки “синдрома нижней полой вены”. Что необходимо порекомендовать беременной?
A *Повернуться на бок
B Лечь на живот
C Присесть
D Пройтись
E Выполнить гимнастику для беременных
429Больная 20-ти лет через 7 месяцев после нормальных родов призведено диагностическое выскабливание слизистой полости матки в святи с кровянистыми выделениями, повторяющимися дважды, не похожими на менструации. Удалена ткань пузырного заноса. Через 15 дней после выскабливания во влагалище обнаружен узел синюшно-багрового цвета. Шейка матки чистая, цианотична, тело матки увеличено соответственно 7 недель беременности, придатки не определяются. Какой дополнительный метод диагностики надо произвести?
A *Биопсия узла
B УЗИ
C Кольпоскопия
D Мазок на степень чистоты влагалища
E Общий анализ мочи

430Роды первые. Таз: 24-27-30-17. Диагональная конъюгата - 10 см. Головка плода прижата к входу в таз. Открытие - 7 см. Плодного пузыря нет. Признак Вастена положительный. Сердце биение плода не прослушивается. Действия акушерки:
A *Вызвать врача
B Ввести окситоцин
C Подготовить инструменты к наложению акушерских щипцов
D Подготовится к вакуум-экстракции плода
E Выпустить мочу катетером

431В послеродовом периоде постовая акушерка:
A *Заходит в палату для проведения бесед, контроля за состоянием и выполнения назначений
B Заходит в палату только для выполнения назначений врача
C Заходит в палату, не спрашивая разрешения родильницы
D Заходит в палату только по требованию родильницы
E Заходит в палату только по требованию родственников родильницы

432 Родильница остается для наблюдения после нормальных родов в родильном отделении:
A *2 часа
B 1 час
C 6 часов
D Сутки

E 2 суток

433После гемотрансфузии обязательным анализом является:
A *Общий анализ мочи
B Анализ крови на сахар
C Анализ мочи на ацетон
D Посев крови
E Посев мочи

434При подготовке к проведению родостимуляции акушерка должна развести в 500 мл физиологического раствора:
A *1 мл (5 ЕД) окситоцина
B 5 мл (1 ЕД) окситоцина
C 10 мл окситоцина
D 15 мл окситоцина
E 1 мл метилэргометрина

435 При подготовке к плановой операции кесарево сечение акушерка должна вечером перед сном:
A *Выполнить назначенную анестезиологом премедикацию и способствовать эмоциональному покою и охране сна
B Накормить женщину ужином
C Подробно рассказать обо всех этапах операции
D Дать женщине слабительное
E Выпустить мочу катетером

436Для профилактики послеродового параметрита необходимо:
A *Проводить профилактику родового травматизма
B Проводить раннюю выписку после кесарева сечения на 3-4 сутки
C Проводить выписку после не осложненных родов на 1 сутки
D Увеличить продолжительность пребывания женщин после нормальных родов до 10 дней
E Проводить лечебную гимнастику на 1 сутки после родов

437Можно использовать чистые нестерильные перчатки:
A *Для обработки инструментов
B Для осмотра шейки матки в зеркалах
C Для акушерского пособия в родах
D Для влагалищного осмотра
E -

438Принципы медицинского ухода за здоровым новорожденным ребенком в родильном доме изложены в приказе:
A *№152
B №234
C №430
D №700
E №120

439Продолжительность нормальных месячных:
A *3-5 дней
B 7-8 дней
C 6-10 дней
D 1-2 дня
E 14 дней

440 Анализ мочи для обследования беременной в женской консультации назначается:
A *К каждой явке
B Трижды за беременность
C Только при наличии дизурических явлений
D Раз в 1-2 месяца
E Каждую неделю в течении беременности

441Влагалищное исследование у здоровой беременной в женской консультации производится:
A *Однократно при постановке на учет
B При каждой явке в ЖК
C 1 раз за триместр
D Раз в месяц для оценки динамики изменений
E Каждую неделю в течении беременности

442Осмотр в зеркалах и взятие мазков на исследование влагалищной флоры у здоровой беременной проводят в женской консультации:
A *Однократно при постановке на учет
B Трижды за беременность
C При каждой явке в ЖК
D Только при наличии жалоб
E Каждую неделю в течении беременности

443 Каждая беременная должна дважды посетить:
A *Терапевта
B Дерматовенеролога
C Юриста
D Психолога
E Травматолога

444Дно матки скрывается за лобком у здоровой родильницы:
A *На 11 сутки
B На 4 сутки
C На 7 сутки
D Через месяц
E На 3 сутки

445Ярко-кровянистые лохии после родов в норме бывают:
A *2-3 дня

B 10 дней
C 2 недели
D До конца декретного отпуска
E 3 недели

446Третий прием Леопольда-Левицкого позволяет выявить:
A *Предлежание плода
B Положение плода
C Позицию плода
D Вид позиции
E Членорасположение плода

447Флюорография легких у беременных:
A *Не показана при желанной беременности
B Назначается однократно при постановке на учет
C Проводится в 1 и 2 половине беременности
D Назначается трижды за беременность
E Назначается перед родами

448 Пройти осмотр окулиста во время беременности:
A *Необходимо для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна
B Должны только женщины с плохим зрением
C Должны все беременные 2 раза
D Осмотр у окулиста не обязателен
E Должны все беременные 5 раз

449Минимальная масса доношенного плода:
A *2700 г
B 2300 г
C 2400 г
D 2800 г
E 3000 г

450Для первой степени чистоты влагалища характерно:
A *Обилие палочек Додерлейна
B Обилие лейкоцитов
C Отсутствие палочек Додерлейна
D Наличие щелочной среды
E Обилие кокков

451Повторнобеременная 10 часов в родах. Схватки через 3-4 минуты, продолжительностью 30 секунд. Регулярные, болезненные. При влагалищном исследовании: шейка матки сглажена, открытие маточного зева на 4 см, головка прижата ко входу в малый таз. По данным гистерографии сокращения матки начинаються в нижнем сегменте. Сила их нерегулярная, сокращения нижнего сегмента матки сильне, чем тела. О какой патологи идет речь?
A *Дискоординированная родовая деятельность
B Ригидность шейки матки
C Первичная слабость родовой деятельности

D Вторичная слабость родовой деятельности
E Прелиминарный период

452Первым этапом оказания акушерско-гинекологической помощи жительнице сельской местности является:
A *ФАП
B Районная больница
C ЦРБ
D Областная больница
E Городская больница

453При проведении активного патронажа на дому при сроке 34 недели беременности виявлено повышение АД до 180/100 мм рт.ст., отеки нижних конечностей. Какой должна быть тактика акушерки?
A *Вызвать скорую помощь и госпитализировать беременную
B Рекомендовать посещение врача женской консультации в ближайшее время
C Назначить гипотензивные препараты
D Рекомендовать придерживаться диеты
E Поставить в известность врача женской консультации

454 Вы работаете в родильном зале. На практике - студенты. Они спросили: “Согласно какого приказа МЗ Украины осуществляется медицинский уход за здоровым новорождённым в родильном доме?”
A *№152
B №72
C №26
D №149
E №48

455Вы работаете в родильном зале. Родился ребёнок с умеренной асфиксией. Ведущими признаками асфиксии при оценке по шкале Апгар является:
A *Частота дыхательных движении
B Частота стула в сутки
C Частота мочеиспусканий в сутки
D Степень желтушности склер
E Степень желтушности кожи

456Акушерка госпитализирует беременную в отделение патологии, какую учетную документацию она должна оформить?
A *Форма №096у
B Форма №097у
C Форма №111у
D Форма №113у
E Форма №025у

457Акушерка ЖК выявила в мазке у беременной мало палочек Додерлейна, много лейкоцитов, эпителия, коковой флоры. Какая степень чистоты влагалища у беременной?
A *III степень

B I степень
C II степень
D IV степень
E Vстепень

458Акушерка ЖК определяет у беременной дату родов, последняя менструация была 5 мая. Предполагаемая дата родов?
A *12 февраля
B 12 августа
C 17 февраля
D 20 июня
E 25 августа

459Акушерка ФАПа определяет предполагаемую массу плода: окружность живота - 90 см, висота стояния дна матки - 30 см. Чему равна масса плода?
A *2700 г
B 3200 г
C 3400 г
D 4000 г
E 4200 г

460Акушерка ЖК проводит влагалищное исследование и определяет диагональную коньюгату. Это расстояние:
A *От нижнего края симфиза до мыса крестца
B От верхнего края симфиза до мыса крестца
C От середины симфиза до надкрестцовой ямки
D От верхнего края симфиза до ромба Михаэлиса
E От нижнего края симфиза до копчика

461Акушерка ФАП проводит наружное акушерское исследование, определите положение и позицию плода, если спинка плода пальпируется по левому ребру матки:
A *Продольное положение, 1 позиция
B Продольное положение, 2 позиция
C Поперечное положение, 1 позиция
D Поперечное положение, 2 позиция
E Косое положение, 1 позиция

462Акушерка ЖК проводит приемы Леопольда, что можно определить 3 приемом Леопольда?
A *Предлежание плода и отношение его к 1 плоскости
B Положение плода
C Членорасположение плода
D Вид позиции плода
E Вставление плода

463Акушерка родильного зала оценивает новорожденного после рождения. Какой из показателей не входит в шкалу Апгар?
A *Цвет слизистих оболочек

B Частота сердечных сокращений
C Частота дыхания
D Мышечный тонус
E Рефлексы

464Акушерка заполняет партограму в первом периоде родов. Какие основные компоненты партограмы?
A *Состояние плода, состояние женщины, течение родов
B Течение родов, сердцебиение плода
C Температура, пульс, АД роженицы
D Состояние роженицы, сердцебиение плода
E Сокращение матки, сердцебиение плода

465При аускультации плода, акушерка прослушала сердцебиение справа ниже пупка - 130/мин. и слева на уровне пупка - 146/мин. Предположительный диагноз:
A *Многоплодие
B Многоводие
C Тазовое предлежание
D Головное предлежание
E Поперечное положение

466На прием в ЖК обратилась беременная с жалобами на тошноту, слюнотечение, рвоту 5-6 раз в сутки. Какая степень тяжести гестоза?
A *Рвота легкой степени тяжести
B Рвота средней степени тяжести
C Рвота тяжелой степени
D Слюнотечение
E Тошнота

467К акушерке ФАП обратилась первобеременная, 32 недели беременности с жалобами на головную боль, боль в эпигастрии, правом подреберье, нарушение зрения “пелена перед глазами”, АД- 175/110 мм рт.ст. Предположительный диагноз:
A *Преэклампсия тяжолой степени
B Преэклампсия средней степени
C Преэклампсия легкой степени
D Эклампсия
E Гипертоническая болезнь

468У беременной с тяжелой преэклампсией развился приступ судорог. Какова неотложная доврачебная помощь?
A *Обеспечить проходимость дыхательных путей
B Дать масочный наркоз
C Ввести гипотензивные средства
D Ингаляция кислорода
E Измерить АД

469Акушерка ФАП проводит беседу среди беременных. Ей задали вопрос: “Что такое эклампсия?”
A *Судорожный припадок при тяжелом позднем гестозе

B Разновидность эпилепсии
C Состояние шока
D Это психоэмоциональное состояние
E Это моносимптомный гестоз

470Акушерка родильного отделения готовит инструменты и препараты для оказания неотложной помощи при тяжелых гестозах. Что необходимо приготовить?
A *Роторасширитель, языкодержатель, седативне, наркотики, гипотензивные
B Седативные, наркотики, гипотензивные
C Инструменты для приема родов, седативные
D Инструменты для операции кесарево сечение, наркотики
E Инструменты для выскабливания полости матки, гипотензивные

471Акушерка роддома оказывает помощь при приступе эклампсии. Какие периоды характерны для приступа эклампсии?
A *Предсудорожный, тонических, клонических судорог, кома
B Период разрешения тонических судорог, клонических судорог
C Кома, период раскрытия, тонических судорог
D Период клонических судорог, период разрешения
E Предсудорожный период, период разрешения, кома

472Акушерка роддома наблюдает за беременной с пороком сердца. Что является предвестниками острой сердечно-сосудистой недостаточночти во время беременности и в родах?
A *Пульс свыше 110/мин., дыхание свыше 24/мин.
B Пульс ниже 60/мин., дыхание свыше 30/мин.
C Уввеличение печени
D Снижение АД
E Повышение температуры

473Акушерка ЖК проводит лабораторное обследование беременной с целью выявления сахарного диабета. В каких случаях необходимо такое обследование беременной?
A *Крупный плод
B Поздний гестоз
C Анемия беременных
D Хронический кольпит
E Хронический пиелонефрит

474В отделении патологии роддома у беременной, лежащей на спине внезапно появилась бледность кожных покровов, липкий пот, снизилось АД, затруднилось дыхание. Какова причина этого состояния?
A *Синдром сдавления нижней полой вены
B Отслойка плаценты
C Разрыв матки
D Эмболия околоплодными водами
E Геморрагический шок

475Акушерка родзала при выделении последа обнаружила, что его масса более 600 г, отмечается отечность, а на коже новорожденного пузырьки с мутным содержимым. Предположительный диагноз:
A *Врожденный сифилис
B Врожденная пиодермия
C Отечная форма ГБН
D Экзема
E Переношенная беременность

476В гінекологічне відділення госпіталізована вагітна в терміні 11-12 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в нижніх відділах живота, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Під час огляду у дзеркалах: частини плодового яйця у цервікальному каналі, кров'янисті виділення у великій кількості. До якої маніпуляції слід підготувати пацієнтку?
A *Кюретаж стінок порожнини матки
B Роздільне діагностичне вишкрібання матки
C Зондування матки
D Накладання циркулярного шва на шийку матки
E Взяття мазків на "гормональне дзеркало"

477Ви акушерка пологового відділення, надаєте допомогу при пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата - 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?
A *Застосувати прийом Абуладзе
B Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревичу
C Застосувати зовнішній прийом по Гентеру
D Провести ручне виділення посліду
E Ввести в/в 1 мл окситоцину

478У 26-річної породіллі на 4-у добу після пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршується: температура тіла - 36,7°*C*, пульс - 94/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її на рівні пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м'яка тканина, згортки крові. При огляд кровотеча посилилась. Яка подальша тактика?
A *Інструментальна ревізія порожнини матки
B Введення препаратів, що скорочують матку
C Над піхвова ампутація матки
D Ручне обстеження порожнини матки та видалення часток плаценти, що затрималась
E Зовнішній масаж матки після спорожнення сечового міхура

479Породіллі на 11-у добу після пологів поскаржилась на різкі болі в лівій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39,0°*C*. Патології з боку внутрішніх та статевих органів не виявлено. Ліва молочна залоза гаряча на дотик, болюча. У верхньому квадранті шкіра гіперемійована, дещо ціанотична, набрякла. При пальпації визначається інфільтрат 6-8 см з флуктуацією посередині. Ваша

тактика:
A *Хірургічне лікування маститу
B Припинити лактацію
C Рекомендувати зціджування молока
D Призначити антибіотики
E Спостерігати за станом породіллі

480Доношена вагітність. Маса тіла вагітної - 62 кг. Поздовжнє положення плода, голівка плоду притиснута до входу в малий таз. Окружність живота - 100 см. Висота дна матки - 35 см. Яка орієнтовна маса плода?
A *3 кг 500 г
B 4 кг
C 2 кг 500 г
D 3 кг
E 4 кг 500 г

1 Цитологічне дослідження проводять з метою виявлення:
A *Онкологічних захворювань шийки матки
B Запальних процесів в матці
C Пухлин матки
D Запальних процесів в яєчниках
E Онкологічних захворювань яєчників

2 В яку фазу менструального циклу шийковий слиз при висушуванні має характерну картину у вигляді листка папороті (товсті стебла, від яких відходять чіткі листочки під кутом 90°С) у здорової жінки:
A *Середина циклу 14-15 день (період овуляції)
B В першу фазу до 12-13 днів
C В другу половину циклу 16-28 день
D На протязі всього циклу
E Зразу після менструації

3 Для ендокринної форми неплідності найчастіше характерними є:
A *Ановуляторні цикли
B Масивні маткові кровотечі
C Альгодисменорея
D Клімактеричні кровотечі
E Нормальна овуляція

4Причини виникнення фіброміом:
A *Підвищення вмісту естрогенів у крові
B Підвищення вмісту прогестерону
C Запальні процеси
D Безплідність
E Чисельні пологи

5 Клінічні симптоми фіброміом:
A *Маткова кровотеча
B Біль у надчеревній ділянці
C Підвищення температури тіла
D Аменорея
E Опущення матки

6Передракові захворювання шийки матки:
A *Дисплазія
B Справжня ерозія
C Лейкоплація
D Ектропіон
E Еритроплакія

7 Передракові захворювання шийки матки:
A *Діагностика дисплазії:
B Цитологічне та гістологічне дослідження
C Пункція через заднє склепіння піхви
D Кульдоскопія

E Лапароскопія

8 Клінічні симптоми раку тіла матки:
A *Ациклічні маткові кровотечі, біль, білі
B Аменорея
C Безпліддя
D Висока температура тіла
E Гіпоменструальний синдром

9 Яким буває пунктат при перерваній позаматковій вагітності?
A *Темна кров, що не зсідається
B Серозно-геморагічний
C Серозно-гнійний
D Яскраво-червона кров, яка зсідається
E Гнійний

10 При якому мінімальному перекруті ніжки пухлини відбувається порушення кровообігу та некроз капсули?
A *180°
B 90°
C 100°
D 360°
E 45°

11 Відсутність піхви називається:
A *Аплазія
B Інфантилізм
C Гіпоплазія
D Гінатрезія
E Гінекомастія

12 Ретропозиція - це:
A *Зміщення матки до заду
B Розміщення матки посередині тазу
C Зміщення матки до переду
D Зміщення матки вправо
E Зміщення матки вліво

13Лікування раку шийки матки І-ї стадії:
A *Комбіноване (оперативна та променева терапія)
B Антибіотики
C Біогенні стимулятори
D Тільки оперативне
E Хіміотерапія

14Самий високий ризик розвитку серйозних ускладнень при використанні КОК мають:
A *Жінки, які палять у віці старше 35 років
B Жінки в віці 25-35 років, які палять

C Сексуально-активні підлітки
D Жінки хворі на діабет без судинних ускладнень тривалістю менше 20 років
E Вірної відповіді не має

15ВМЗ не показаний жінкам:
A *З запальними захворюваннями органів малого тазу
B Які годують дитину
C Які мають 3 дітей
D Палять та старше 35 років
E Всі відповіді вірні

16У хворої жінки внутрішньоепітеліальний рак шийки матки. Метод лікування:
A *Електроконізація або проста екстирпація матки
B Гормонотерапія, оперативне лікування
C Розширена екстирпація матки
D Оперативне лікування, променева терапія
E Променева терапія

17За допомогою бімануального обстеження виявляють захворювання:
A *Матки та її придатків
B Піхви
C Сечового міхура
D Аппендикса
E Наднирників

18Яким інструментом беруть матеріал для онкоцитології?
A *Шпателем Ейра
B Ножицями
C Конхотомом
D Пінцетом
E Жолобкуватим зондом

19Нормальне розташування матки в тазу:
A *Антеверсіо антефлексіо
B Ретроверсіо ретрофлексіо
C Ретроверсіо антефлексіо
D Антеверсіо- ретрофлексіо
E Латеропозиція

20Ви запідозрили у хворої 38-ми років рак матки. В які терміни менструального циклу необхідно провести діагностичне вишкрібання матки для одержання найбільш інформативних даних гістологічного дослідження?
A *За 5-6 днів до менструації
B За 10-12 днів до менструації
C В 1-й день менструації
D За 1-2 дні до менструації
E Зразу після закінчення менструації

21До Вас звернулась пацієнтка 25-ти років, яка не має дітей протягом 4 років

перебування в шлюбі. Рекомендуючи вимірювання базальної температури, Ви пояснюєте, що воно основане:
A *На гіпертермічному ефекті прогестерону
B На гіпертермічному ефекті естрогенів
C На виділенні серотоніну шийковидним тілом
D На гіпертермічному ефекті альдостерону
E На гіпертермічному ефекті кортизону

22До Вас звернулась пацієнтка 26-ти років, у якої через 14 днів після пологів з'явились болі внизу живота, виділення з піхви і підвищення *t*° до 38°*C*. Ви запідозрили гострий ендометрит. Яка найчастіша його етіологія?
A *Асоціації мікроорганізмів
B Золотистий стафілокок
C Трихомонада
D Кишкова паличка
E Бета-гемолітичний стрептокок

23Пацієнтка 30-ти років хворіє туберкульозом легень і жіночих статевих органів. Найчастіше туберкульоз геніталій вражає:
A *Маткові труби
B Матку (ендометрій)
C Вагіну
D Вульву
E Яєчники

24Який найбільш постійний симптом Ви виявите у пацієнтки 23-х років з туберкульозом жіночих статевих органів?
A *Безпліддя
B Біль внизу живота
C Порушення менструального циклу
D Почуття дискомфорту з боку жіночих статевих органів
E Великі сироподібні виділення

25Дівчина 18-ти років, звернулась до Вас із скаргами на те, що менструації появляються надто рідко - через 6-8 тижнів. Якому терміну відповідає даний прояв?
A *Опсоменорея
B Гіпоменорея
C Олігоменорея
D Пройоменорея
E Поліменорея

26Пацієнтка 20-ти років, звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на ожиріння, рідкі менструації. На УЗД поставлено діагноз полікістоз яєчників. Що характерно для даного синдрому?
A *Безпліддя
B Велика кількість вагітностей в анамнезі
C Виникає після 45-ти років

D Відсутність менструального циклу
E Пізнє статеве дозрівання

27Жінка 45-ти років, звернулась із скаргами на свербіння, печію в ділянці вульви. На вульві білі плями з перламутровим блиском. Про яке передракове захворювання зовнішніх статевих органів це свідчить?
A *Лейкоплакія вульви
B Вульвіт
C Гідроаденома
D Фіброма вульви
E Бартолініт

28У пацієнтки 45-ти років, у якої в анамнезі 2 пологів, 4 аборти, з'явились нерегулярні кровотечі. Матка збільшена до 10-ти тижнів вагітності. Попередній діагноз - фіброміома матки. Де найчастіше вона виникає?
A *В тілі матки
B В круглій зв'язці
C В широкій зв'язці
D В шийці матки
E В піхві

29У пацієнтки 28-ми років, з 2 пологами в анамнезі останнім часом відмічаються контактні кровотечі і білі водянисті виділення із жіночих статевих органів. В жіночій консультації підозрюють рак шийки матки. Виберіть найбільш цінний метод для встановлення діагнозу раку шийки матки:
A *Біопсія
B Цитологічне дослідження мазків
C Огляд шийки матки в дзеркалах
D Кольпоскопія
E Ультразвукове дослідження

30Пацієнтка 40-ка років звернулась до Вас зі скаргами на похудання, відсутність апетиту, болі внизу живота. При обстеженні виявлено пухлину Крукенберга. Дайте визначення цього терміну:
A *Метастаз раку шлунково-кишкового тракту в яєчники
B Метастаз в шлунково-кишковий тракт раку яєчника
C Метастаз в шлунково-кишковий тракт раку тіла матки
D Метастаз раку шийки матки в шлунок
E Метастаз раку яєчника в сечовий міхур

31Пацієнтка 38-ми років, неодноразово лікувалась консервативно з приводу хронічного сальпінгоофориту. На протязі 2-х останніх місяців у хворої з'явився асцит. Наявність асциту найбільш характерно для:
A *Раку яєчників
B Раку тіла матки
C Раку шийки матки
D Саркоми матки
E Раку шлунка

32 жінки 32-х років, в товщі нижньої третини великої статевої губи визначається утворення діаметром 6 см тугоеластичної консистенції. Найбільш вірогідно це:
A *Кіста великої залози присінка піхви
B Гемангіома
C Парауретральна кіста
D Нейрофіброміома
E Бартолініт

33Ви консультуєте жінку 32-х років, з приводу використання ВМС. Який найбільш оптимальний час введення ВМС (внутрішньоматкової спіралі)?
A *На 3-4-й день менструального циклу
B Перед менструацією
C В будь-який день циклу
D Після пологів
E Після штучного аборту

34Вас запитала жінка 28-ми років, яка раніше не народжувала, щодо ускладнень при застосуванні внутрішньоматкових контрацептивів. Ви відповіли, що це:
A *Запальні захворювання внутрішніх статевих органів
B Ектопічна вагітність
C Тромбофлебіт тазу
D Істмико-цервікальна недостатність
E Невиношування вагітності

35Як зменшити вірогідність інфікування ВІЛ жінці 24-х років, яка веде хаотичне статеве життя?
A *Використовувати презерватив під час кожного статевого акту
B Використовувати презервативи тільки в випадках коли є підозра, що партнер інфікований на ВІЛ
C Змінювати партнерів не частіше ніж 1 раз на місяць
D Мати не більше ніж двох партнерів одночасно
E Уникати випадкових статевих зв'язків

36На прийомі у ФАПі Ви консультуєте молоду жінку, яка щойно вступила в шлюб, з приводу методів природного планування сім'ї. Ви повідомляєте, що цей метод можна рекомендувати:
A *Жінкам будь-якого віку
B Жінкам, які не народжували
C Жінкам із порушенням менструального циклу
D Жінкам, які мають двох статевих партнерів і більше
E Жінкам, які годують грудьми

37При проведенні бесіди з робітницями швейної фабрики Ви, зокрема, інформуєте їх, що самообстеження (пальпацію) грудних залоз потрібно проводити:
A *1 раз на місяць
B 1 раз на 3 місяці
C 1 раз на тиждень
D 1 раз на рік

E Кожного дня

38Жінка, 27-ми років, скарги на відсутність менструацій 7 місяців. До цього менструації були нерегулярні.Тест на вагітність негативний. 6 місяців тому перенесла гепатит у тяжкій формі. Встановлено, що матка та придатки без особливостей.Про яке порушення циклу йде мова?
A *Аменорея
B Поліменорея
C Дісменорея
D Олігоменорея
E Альгодісменорея

39Жінка, 27-ми років, звернулась до жіночої консультації. Скарги на безпліддя протягом останніх 4-х років. У 16 років штучний аборт. Цикл нерегулярний. Контрацептиви не використовує. Спермограма чоловіка без змін. До якого обстеження необхідно підготувати жінку?
A *Гістеросальпіногографії
B Кольпоскопії
C Біопсії
D Цитологічному скрінінгу
E Зондуванню матки

40Профогляд. Жінка,30-ти років. Акушерка повинна провести основні і додаткові методи дослідження. Скарг немає. Виявлено,що матка збільшена до 10-ти тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома. Шийка, придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли не змінені. До якого додаткового обстеження треба підготувати жінку?
A *Роздільне діагностичне вишкрябання матки
B Біопсія
C Кольпоскопія
D Зондування матки
E Пункція через заднє склепіння піхви

41До гінекологічного відділення поступила хвора зі скаргами на болі унизу живота, *t*° - 38°*C*, кров'янисто-гнійні виділення. Три дні тому зроблен штучний аборт. Матка збільшена, болісна, м'якої консистенції. Шийка, придатки без змін. Про яке захворювання йде мова?
A *Неспецифічний ендометрит
B Гонорея
C Хламідіоз
D Параметрит
E Аднексит

42Пацієнтка, 45-ти років,скаржиться на загальну слабкість, нездужання, неприємне відчуття в ділянці зовнішніх статевих органів. Виявлено: *t*° - 37,8°*C*, набряк, гіперемія, болючість правої великоі статевоі губи. Для якого захворювання характерна ця картина?
A *Бартолініт
B Вульвіт

C Кольпіт
D Крауроз вульви
E Рак вульви

43До консультації звернулась жінка, 35-ти років, зі скаргами на рясні та довгі менструації по 13-15 днів. Виявлено, що матка збільшена до 12-13 тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома, вузлувата поверхня. Шийка та придатки не змінені. Про яке захворювання можна подумати?
A *Лейоміома (фіброміома) матки
B Кістома яєчника
C Ендометрит
D Аднексит
E Параметрит

44До гінекологічного відділення поступила хвора, 60-ти років, з кровотечею зі статевих шляхів. Менопауза 10 років. Виявлено, що матка збільшена до 10-ти тижнів. Щільна, нерухома, безболісна. Виділення кров'янисті. Шийка матки та придатки незмінені. До якого обстеження треба підготувати інструменти?
A *Роздільне діагностичне вишкрябання матки
B Біопсія
C Пункція через заднє склепіння піхви
D Кольпоскопія
E Гістеросальпінгографія

45У гінекологічному відділенні знаходиться хвора, 50-ти років. Діагноз - рак шийки матки IV-ї стадія. Почалася профузна кровотеча зі статевих шляхів. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв. Лікар на операції. Яку невідкладну допомогу ви повинні надати?
A *Туга тампонада піхви
B Ввести кровозамінники
C Ввести окситоцін
D Покласти міхур з льодом
E Оксигенотерапія

46До кабінету онкопрофогляду звернулась жінка 35-ти років. Скарг немає. Виявлено, що шийка матки, матка, придатки незмінені. Молочні залози та лімфатичні вузли без патології. Зроблено цитологічний скрінінг. Які захворювання відносяться до передракових захворювань шийки матки?
A *Дисплазія
B Ендометрит
C Кольпіт
D Аднексит
E Бартолініт

47Ви працюєте у жіночій консультації та проводите бесіду з жінками про профілактику раку шийки матки. Головна причина - вірус папіломи людини. Фактори ризику - безладне статеве життя, паління. Що ви порекомендуєте для профілактики раку шийки матки?
A *Профогляди

B Мазок на гормональне дзеркало
C Бактеріологічне дослідження.
D Бактеріоскопіче дослідження
E Вимірювання базальноі температури

48Ви працюэте на ФАПі.У дівчинки 14-ти років при проведенні провогляду при пальпаціі живота справа від матки виявлено рухоме, неболюче утворення з чіткими контурами, діаметром біля 13 см. Скарг немає. Яку патологію ви запідозрите?
A *Кіста яєчника
B Аднексит
C Параметрит
D Ендометрит
E Апендиціт

49Хвора, 35-ти років, поступила до гінекологічного відділення з підозрою на прогресуючу позаматкову вагітність. Під час перебування у відділенні у хворої з'явився гострий біль у животі, знепритомніла, шкіра бліда, живіт при пальпації болючий, симптом Щьоткіна-Блюмберга - позитивний. АТ- 90/60мм рт.ст., Ps- 110/хв. Що повинна зробити акушерка у першу чергу?
A *Негайно повідомити чергового лікаря
B Ввести знеболюючі
C Спостерігати
D Міхур з льодом на низ живота
E Ввести кровоспинні

50Ви працюєте на ФАПі.У пацієнтки, 25-ти років, діагноз: кіста яєчника. Після бурхливої перистальтики кишківника хвора скаржиться на гострий біль внизу живота, блювання, знепритомніла, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Пріоритетною дією при наданні невідкладноі допомоги буде?
A *Негайна госпіталізація
B Ввести знеболюючі препарати
C Грілка на живіт
D Очисна клізма
E Спазмолітики

51До гінекологічного відділення звернулася жінка зі скаргами на нерегулярні скудні менструації. Заміжня 3 роки. Вагітностей не було. Виявлено гірсутізм, гіпоменорея, ановуляторний цикл. Яєчники з обох боків збільшені, щільні, бугристі, безболісні. У крові збільшений зміст андрогенів. Попередній діагноз: "Полікістоз яєчників". До якого додаткового дослідження ви повинні підготовити жінку?
A *УЗД
B Зондування матки
C Бактеріоскопічний метод
D Бактеріологічний метод
E Загальний аналіз крові

52Жінка скаржиться на болючі менструаціі, протягом 6-7 днів, крововтрата 50 мл. Матка нахилена і зігнута дозаду, кут між шийкою і тілом матки гострий, відкритий

дозаду. Матка нерухома. Придатки не змінені. Назвіть вид неправильного положення матки:
A *Перегин матки дозаду
B Опущення матки
C Інфантилізм
D Ендометрит
E Параметрит

53До жіночоі консультаціі звернулась жінка, 30-ти років, для рекомендаціі метода контрацепціі пролонгованоі дії. Пологів - 2, абортів - 1. Гормональні контрацептиви протипоказані. Гінекологічних захворювань немає. Порадьте метод контрацепціі:
A *ВМК
B Добровільна хірургічна стерилізація
C Депо-Провера
D Нова-Ринг
E Природна контрацепція

54Жінка, 30-ти років,звернулась до консультаціі за рекомендаціэю природнього метода контрацепції. Дана порада. При вимірюванні базальної температури на протязі 3-х місяців виявлено двофазний менструальний цикл. У які дні після першого збільшення температури жінка може завагітніти?
A *1-3 день
B 4-5
C 5-6
D 6-7
E 8-9

55Поступила до гінекологічного відділення хвора зі скаргами на невеликий, периодичний біль внизу живота та спині. Біль посилюэться після статевого акту. Гнійні виділення. Веде безладне статеве життя. Виявлено, що придатки з обох боків збільшені, щільні, безболісні. Для діагностики хламідіоза якій метод дослідження потрібний?
A *Мазки з уретри та цервікального каналу
B Мазок на ступінь чистоти піхви
C Мазок на гормональне дзеркало
D Цитологічний метод
E Кольпоскопія

56Жінці 28 років. Скарги на безпліддя. Перенесла у 18 років гонорею. Виявлено, що придатки збільшені з обох боків, щільні, безболісні,нерухомі. Які контрацептиви для пофілактики ЗПСШ?
A *Презерватив
B Гормональні пігулки
C Внутрішньоматкова спіраль
D Добровільна стерилізація
E Депо-Провера

57Кожна жінка повинна проходити профілактичний онкоогляд у акушера-гінеколога:

A *2 рази на рік
B 1 раз у 2 роки
C Щомісяця
D Щороку
E Щотижня

58У жінки 46-ти років спостерігаються ациклічні маткові кровотечі, не пов'язані з менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функції:
A *Метрорагія
B Поліменорея
C Опсоменорея
D Альгоменорея
E Менорагія

59Гормональні контрацептиви, які доцільно рекомендувати жінкам під час лактації, якщо після пологів пройшло більше ніж півроку:
A *Міні-пілі
B Комбіновані однофазні контрацептиви
C Комбіновані двофазні контрацептиви
D Комбіновані трифазні контрацептиви
E Посткоїтальні контрацептиви

60У жінки 29-ти років, лікар вперше виявив патологічні зміни на шийці матки і повідомив акушерку. Інструментарій для якого подальшого дослідження повинна підготувати акушерка?
A *Кольпоскопії
B Рентгеноскопії
C Гістероскопії
D Зондування
E Метросальпінгографії

61Жінка 27-ми років. Скарги на слабкість, запаморочення, біль внизу живота, що віддає у пряму кишку. Хвора бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв., затримка місячних на 3 тижні. Визначити, яке додаткове дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
A *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
B Діагностичне вишкрібання порожнини матки
C Біопсія шийки матки
D Зондування матки
E Метросальпінгографія

62Жінка, 68-ми років, скаржиться на маткову кровотечу, менопауза 15 років. Який додатковий метод дослідження необхідно виконати?
A *Роздільне діагностичне вишкрібання
B УЗД
C Кольпоскопія
D Пункція заднього склепіння
E Метросальпінгографія

63Які з інструментів повинні бути в наборі для біопсії?
A *Конхотом
B Розширювачі Гегара
C Пункційна голка
D Тазомір
E Абортцанг

64При обстеженні хворої акушерка запідозрила трихомоніаз. Який характер виділень в цьому випадку?
A *Пінисті, з неприємним запахом
B Типу “м’ясних помиїв”
C Сироподібні
D Гнійно-кров’янисті
E Серозно-кров’янисті

65Жінка 25-ти років страждає вторинним безпліддям. Для перевірки прохідності маткових труб вирішено провести метросальпінгографію. Який шприц повинна покласти медсестра в набір інструментів для даного дослідження?
A *Шприц Брауна
B Багаторазовий шприц “Рекорд”
C Шприц Жане
D Інсуліновий шприц
E Одноразовий шприц 20 мл

66Акушерка ФАПу проводить періодичне профілактичне обстеження жінок. Яким наказом вона користується щодо кількості проходження жінками профілактичних оглядів на рік?
A *№417
B №960
C №264
D №508
E №120

67На ФАП звернулася жінка для профілактичного огляду. За допомогою якого метода акушерка визначає тип конституції жінки?
A *Загального об’єктивного обстеження
B Анамнезу
C Огляду за допомогою дзеркал
D Піхвового обстеження
E УЗД

68Пацієнтка 52-х років, має захворювання - рак тіла матки. Який метод дослідження є найінформативнішим для визначення захворювання?
A *Роздільне діагностичне вишкрібання
B Аспіраційна біопсія
C УЗД
D Онкоцитологічне дослідження
E Зондування матки

69Пацієнтка 29-ти років, має захворювання шийки матки. За допомогою якого ендоскопічного методу дослідження можна визначити характер захворювання?
A *Кольпопія
B Цервікоскопія
C Біопсія шийки матки
D Огляд за допомогою дзеркал
E Бактеріоскопічне дослідження

70До акушерки ФАПу звернулася жінка 32-х років, зі скаргами на значні кров'яні виділення зі статевих шляхів на протязі 9-ти днів. Із анамнезу: менструації регулярні, по 7-8 днів на протязі 6-ти місяців. Страждає хронічним запаленням придатків матки. Піхвове дослідження: шийка матки чиста, тіло матки збільшене до 10-ти тижнів вагітності, вузловате, безболісне, рухоме. Виділення кров'яні, рясні. Що спричинило гіперменструальний синдром?
A *Пухлина матки
B Дисгенезія гонад
C Пухлина гіпофіза
D Атрезія церві кального каналу
E Полікістоз яєчника

71До лікаря звернулася пацієнтка 45-ти років зі скаргами на рясні кров'яні виділення зі статевих шляхів на протязі 10-ти днів. Лікування пацієнтки треба почати з:
A *Діагностичного вишкрібання слизової оболонки матки
B Симптоматичної терапії
C Гормонального гемостазу
D Введення амінокапронової кислоти
E Корекції обмінно-ендокринних порушень

72Пацієнтка 28-ми років, звернулася до лікаря зі скаргами на безплідність протягом 5-ти років. Із анамнезу: порушень менструальної функції не має. Бімануальне обстеження без особливостей. Виділення білі. Яке обстеження слід провести насамперед?
A *Обстеження чоловіка
B УЗД
C Бактеріоскопічне дослідження
D Гістеросальпінгографію
E Кольпоцитологічне дослідження

73В гінекологічне відділення поступила пацієнтка зі скаргами на сильний біль в животі. З анамнезу відомо, що напередодні в жіночій консультації діагностовано кіста яєчника. Ваші дії:
A *Викликати лікаря. Підготувати інструментарій для пункції черевної порожнини через заднє склепіння матки.
B Ввести знеболювальні препарати, викликати лікаря
C Ввести спазмолітики, положити теплу грілку на низ живота
D Розпочати інфузійну терапію
E Взяти кров для визначення групи крові та резус-фактора

74В жіночу консультацію звернулася пацієнтка 32-х років, яка страждає на протязі 7-ми років хронічним сальпінгоофоритом. Вкажіть найбільш поширене ускладнення перенесених запальних процесів жіночих статевих органів:
A *Безплідність
B Рак маткових труб
C Поліпоз ендометрія
D Ендометріоз
E Ерозія шийки матки

75Хвора 31 рік, поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на постійний тупий біль унизу живота, що з'явився три дні тому, підвищена температура тіла до 38,0°*C*. При піхвовому дослідженні визначаються збільшені, болючі при пальпації придатки, симптом Щьоткіна-Блюмберга відсутній. Діагноз:
A *Гострий сальпінгоофорит
B Гострий ендоцервіцит
C Пельвіоперитоніт
D Параметрит
E Гострий кольпіт

76До ФАПу звернулася хвора зі скаргами на появу виділень зі статевих шляхів, відчуття свербіння в ділянці статевих органів. Об'єктивно: слизова оболонка піхви гіперемійована, виділення пініcтого характеру. Діагностовано трихомоніаз. Виберіть препарат для лікування цієї хворої:
A *Метронідазол
B Вагілак
C Ністатин
D Анальгін
E Етазол

77В гінекологічне відділення поступила жінка 42-х років, з матковою кровотечею та підозрою на субмукозний вузол. Які препарати протипоказані для введення хворій при наданні долікарської допомоги?
A *Окситоцин
B Хлорид кальцію
C Е-амінокапронову кислоту
D Вікасол
E Введення кровозамінників

78В кабінет планування сім'ї звернулася молода жінка 19-ти років, незаміжня, на консультацію з методів контрацепції. Який метод найдоцільніше їй запропонувати?
A *Презерватив
B Сперміциди
C Комбіновані оральні протизаплідні засоби
D Внутрішньоматковий контрацептив
E Діафрагма

79У хворої, 30-ти років, зі скаргами на гнійні виділення із статевих шляхів, пр.

гінекологічному дослідженні виявлена гіперемія та набряк слизової оболонки піхви з великою кількість гнійного нальоту на стінках. Який додатковий метод дослідження допоможе уточнити діагноз?
A *Бактеріологічне дослідження
B Ультразвукове дослідження
C Кольпоцитологічне дослідження
D Гістологічне дослідження
E Онкоцитологічне дослідження

80Пацієнтка, 49-ти років, звернулась зі скаргами на рідкі, зменшені менструації протягом останніх 6-ти місяців, "припливи" жару до обличчя до 10-12 разів на добу, інтенсивне потовиділення, серцебиття, запаморочення. Який синдром має місце в даному випадку?
A *Клімактеричний
B Гіпоменструальний
C Передменструальний
D Гіперменструальний
E Адреногенітальний

81На прийом до ж/к викликана хвора, 40-а років, яка знаходиться на "Д" обліку з приводу фіброми матки. P.V.: матка щільна, поверхня її деформована, збільшена до 12-ти тижнів вагітності. Необхідно вирішити питання про оперативне втручання в цьому випадку. Показанням до оперативного втручання будуть розміри матки, що дорівнюють:
A *12 тижнів вагітності
B 11 тижнів вагітності
C 10 тижнів вагітності
D 7 тижнів вагітності
E 5 тижнів вагітності

82У пацієнтки 45-ти років, з неповним видаленням матки заплановане оперативне втручання - кольпоперінеографія. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції?
A *Санація піхви
B Промивання шлунка
C Інстиляція сечового міхура
D Санація ротової порожнини
E Профілактика тромбоемболії

8328-ми річна жінка визначає відсутність вагітності протягом 3-х років після самовільного викидня, ускладненого запалення придатків матки. Який найбільш вірогідний чинник безпліддя?
A *Яєчниковий
B Матковий
C Цервікальний
D Коітальний
E Чоловічий

84До вас звернулась хвора, 38-ми років, з приводу значної кровотечі із статевих

шляхів. Шкіра бліда, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 95/хв. Огляд у дзеркалах: шийка матки деформована, має вигляд цвітної капусти. Що в першу чергу вам необхідно зробити?
A *Провести тугу тампонаду піхви
B Ввести знеболюючі засоби
C Ввести скорочувальні засоби
D Покласти холод на низ живота
E Ввести кровоспинні засоби

8523-х річна хвора доставлена у клініку із гострим болем унизу живота, що іррадіює у пряму кишку, температурою - 40°*C*. Остання менструація 6 діб тому. P.V.: матка не змінена, дещо болісна при зміщенні, ліворуч придатки без особливостей, праворуч визначається реторто подібне утворення, болісне при зміщенні, 9х4 см, що флюктуює. Який діагноз найбільш імовірний?
A *Піосальпінкс
B Апоплексія яєчника
C Гострий апендицит
D Трубна вагітність
E Перекрут ніжки пухлини

86Жінка, 30-ти років, знаходиться на “Д” обліку з приводу фіброміоми матки. Призначено ендоскопічне обстеження з метою контролю при діагностичному вишкрібанні слизової матки. Що із переліченого до нього належить?
A *Гістероскопія
B Пертубація
C Біопсія
D Зондування
E Гідротурбація

87Хвора, 22-х роки, звернулась зі скаргами на нерегулярні менструації. З метою діагностики призначено дослідження функції яєчників. Що з переліченого до нього належить?
A *Визначення симптому “папороті”
B Гістеросальпінографія
C Мазок на ступінь частоти піхви
D Біопсія шийки матки
E Кольпоскопічне дослідження

88Жінка, 39-ти років, знаходиться на “Д” обліку в ж/к з приводу ерозії шийки матки та поліпа шийки матки, що рецидивує. Призначена консультація онкогінеколога, та онкоцитологічне обстеження. Мазок на онкоцитилогічне дослідження необхідно взяти з:
A *Поверхні шийки матки та церві кального каналу
B Бокового склепіння піхви
C Переднього склепіння піхви
D Заднього склепіння піхви
E Присінка піхви

89Хвора, 25-ти років, звернулась до ж/к зі скаргами на слизові виділення з вагіни

та конгтактні кров'янисті виділення. Огляд за допомогою дзеркал: шийка матки конічної форми, біля зовнішнього вічка визначається дефект епітелія яскраво-червоного кольору розміром 2х2 см, легко кровоточить при дотику. Який з методів обстеження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?
A *Прицільна біопсія шийки матки
B Ультразвукове дослідження
C Діагностичне вишкрібання
D Зондування матки
E Функціональні тести

90Хвора, 40-а років, скаржиться на виділення з піхви жовтого кольору. Огляд за допомогою дзеркал: на задній губі шийки матки виявлені сухі білі плями різної величини. Який метод лікування найбільш ефективний при цьому захворювання?
A *Кріодеструкція
B Пахвові мазьові тампони
C Піхвові ванночки
D Піхвові спринцювання
E Ампутація шийки матки

91У ж/к звернулась вагітна 28-ми років у терміні 3-х місяці вагітності зі скаргами на кров'янисті виділення, іноді з міхурцями. P.V.: матка збільшена до 4-х місяців вагітності щільно-еластичної консистенції. Ультразвукове дослідження: плід не визначається, в порожнині матки картина "снігові бурі". Ваш діагноз:
A *Міхуровий занесок
B Рак тіла матки
C Трубний аборт
D Фіброміома матки
E Хоріонепітеліома

92До дитячого гінеколога ж/к звернулась мати 9-річної дівчинки зі скаргами на появу у дитини менструації та розвиток вторинних статевих ознак. P.V.: матка не змінена, безболісна. При пальпації придатків ліворуч визначається пухлиноподібне утворення розміром 4х5 см. Що з переліченого є найбільш імовірною цієї патології?
A *Фолікулярна кіста
B Параоваріальна кіста
C Адреногенітальний синдром
D Фіброма яєчника
E Ендометріоз яєчника

93Лікар призначив пацієнтці гормональну кольпоцитодіагностику. Із яких ділянок статевих органів акушерка повинна взяти матеріал для дослідження?
A *Передньобічного склепіння піхви
B Задньобічного склепіння піхви
C Шийки матки
D Порожнини матки
E Цервікального каналу

94Жінка скаржиться на свербіння, печію, болючість в ділянці зовнішніх статевих

органів, значні сироподібні виділення із піхви. Ваш діагноз:
A *Кандидозний кольпіт
B Трихомоніаз
C Гонорея
D Герпес
E Хламідійна інфекція

95На онкопрофогляді у пацієнтки при огляді шийки матки у дзеркалах виявлено ерозію. Який метод діагностики необхідно провести для уточнення діагнозу?
A *Кольпоскопічний
B Рентгеноскопічний
C Радіоімунний
D Бактеріоскопічний
E Ультразвуковий

96Визначте ранні симптоми раку тіла матки:
A *Виділення із піхви у вигляді м'ясних помиїв
B Контактні кровотечі
C Ациклічні маткові кровотечі
D Болі внизу живота
E Кров у фекаліях

97В гінекологічне відділенні поступає жінка з підозрою на позаматкову вагітність. Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Дії акушерки:
A *Підключити систему з кровозамінником, негайно викликати лікаря
B Підготувати набір для діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки
C Провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви
D Розгорнути операційну
E Провести гемотрансфузію

98Акушерка здійснює патронаж хворої на рак шийки матки. Хвора скаржиться на значні кров'янисті виділення з піхви. Ваші дії:
A *Зробити тугу тампонаду піхви, викликати "швидку допомогу"
B Виписати направлення в гінекологічне відділення і залишити його жінці
C Ввести вікасол, хлористий кальцій і залишити вдома
D Дати пораду відвідати лікаря жіночої консультації
E Провести гінекологічне дослідження

99Пацієнтка 22-х років, звернулася з приводу попередження небажаної вагітност, в шлюбі, має двох дітей. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?
A *ВМЗ
B Перерваний статевий акт
C КОК
D Посткоїтальний
E Хірургічний

100Вкажіть препарат, що використовують для лікування трихомонадного кольпіту:

A *Метронідазол
B Ністатін
C Марвелон
D Бісептол
E Цефтриаксон

101На прийом у ЖК прийшла пацієнтка зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років регулярного статевого життя без використання засобів контрацепції. З якого методу дослідження найдоцільніше розпочати обстеження?
A *Аналіз сперми статевого партнера
B Дослідження функції яєчників
C Ультразвукового
D Бактеріоскопічного
E Рентгенологічного

102При проведенні медичного огляду старшокласниць у двох дівчаток у віці 17 років виявлено відсутність менструацій. Який вік вважається фізіологічним віком настання менархе?
A *12-15 років
B 8-10 років
C 10-12 років
D Після 17 років
E 15-17 років

103Які лікарські препарати призначають при менометрорагії?
A *Окситоцин
B Віадріл
C Но-шпа
D Пеніцилін
E Прозерин

104Клініка поліпу шийки матки:
A *Кровоточивий виріст слизової оболонки на шийці матки
B Атрофія
C Білі плями, бородавки
D Вивернута шийка матки з ерозією
E Виразка

105Яка пухлина яєчника найчастіше перероджується в рак?
A *Папілярна кістома
B Серозна кістома
C Фолікулярна кіста
D Міома яєчника
E Муцинозна кістома

106Метод діагностики запальних захворювань жіночих статевих органів:
A *Мазок на ступінь чистоти піхви та флору
B Діагностичне вишкрібання порожнини матки
C Зондування порожнини матки

D Цитологічне дослідження мазків з піхви
E Аналіз сечі на білок

107Причини випадіння матки:
A *Розриви промежини
B Запалення матки
C Запалення придатків матки
D Аборти
E Клімакс

108Лікування атрезії піхви:
A *Оперативне
B Антибіотики
C Біогенні стимулятори
D Фізіотерапевтичне
E Санаторно-курортне

109Схема вживання КОК (низькодозованих) при невідкладній контрацепції:
A *4 таблетки в перші 72 год., потім ще 4 таблетки через 12 год.
B 2 таблетки в перші 72 год., потім ще 2 таблетки через 12 год.
C 6 таблетки в перші 72 год., потім ще 6 таблетки через 12 год.
D 6 таблетки в перші 72 год., потім ще 4 таблетки через 12 год.
E 2 таблетки кожні 4 години протягом 24 год.

110Жінка з вагітністю 8-ми тижнів поступила до гінекологічного відділення зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, значні кров'янисті виділення зі згустками. Ваші дії:
A *Негайно викликати лікаря, підготувати інструментарій для вишкрібання порожнини матки
B Забезпечити жінці ліжковий режим та накласти холод на низ живота
C Стежити за загальним станом хворої, вивести сечу катетером
D Стежити за кількістю кров'янистих виділень, вимірювати АТ
E Ввести спазмолітики, кровоспинні препарати

111Ви фельдшер здоровпункту. До вас звернулася жінка 53-х років із скаргами на виділення у вигляді "м'ясних" помиїв протягом кількох місяців. Менопауза 2 роки. При бімануальному обстеженні: матка збільшена, бугриста, неболюча при пальпації, не рухома. Для уточнення діагнозу необхідно провести:
A *Роздільне вишкрібання порожнини матки і шийки
B Онкоцитологію
C Лапороскопію
D Зондування матки
E Біопсію шийки матки

112Визначіть час настання контрацептивного ефекту сперміцидів (желе та кремів) і його тривалість при поєднанні з діафрагмою або ковпачком:
A *Через 15 хв. після введення до 6-8 годин
B Через 5 хв. після введення до 2 годин

C Через 10 хв. після введення до 3 годин
D Через 15 хв. після введення до 1 години
E Одразу після введення до 6 годин

113Визначіть найбільш давній спосіб запобігання вагітності:
A Бар'єрний метод
B Температурний метод
C Метод цервікального слизу
D Календарний метод
E Використання сперміцидів

114Яку із хвороб, що передається статевим шляхом називають класичною венеричною?
A *Сифіліс
B Генітальний герпес
C Урогенітальний хламідіоз
D Урогенітальний трихомоніаз
E Кандидоз

115Визначіть термін контрацептивної дії імплантованого під шкіру "Норпланту":
A *5 років
B 1 рік
C 2 роки
D 3 роки
E 8 років

116Визначіть недолік перерваного статевого акту, як одного з методів планування сім'ї:
A *Не забеспечує захисту від ЗПСШ
B Ефективність 85%
C Не потребує лікарських засобів
D Не потребує медичного втручання
E Залучає обох партнерів до планування сім'ї

117У якому випадку можливе використання методу лактаційної аменореї?
A *Якщо жінка годує дитину виключно груддю до 10-ти разів на добу
B Якщо в жінки відновилася менструація
C Коли дитині призначають підгодовування
D Якщо дитину годують груддю менше 6-ти разів на добу
E Якщо дитині виповнилось 6 міс

118Вегетативна нервова система іннервує:
A *Внутрішні органи, кровоносні та лімфатичні судини, лімфовузли
B Ендокринні залози, серце, спинний мозок
C Головний і спинний мозок
D Внутрішні органи, спинний мозок
E М'язи шкіри, ендокринні залози

119Хвора скаржиться на свербіж у піхві,пінисті білі. При огляді: почервоніння і

набряк слизової оболонки піхви піністі білі. Який метод дослідження необхідно провести?
A *Мазок на ступінь чистоти піхви
B Кольпоскопія
C Мазок на атипові клітини
D Гістеросальпінгографія
E Визначення каріопікнотичного індексу

120Жінка 42-х років скаржиться на кровотечу. Відмічає порушення менструального циклу. При гінекологічному дослідженні тіло матки, придатки без змін. До якої операції слід підготувати інструменти?
A *Лікувально-діагностичне вискоблювання
B Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
C Зондування порожнини матки
D Біопсія
E Лапароскопія

121Жінка скаржиться на переймоподібні болі внизу живота, кров'янисті виділення з піхви. Матка збільшена до 7-ми тижнів. При огляді в дзеркалах в ділянці зовнішньоговічка візуалізується нижній полюс плодового яйця, кров'янисті виділення. Попередній діагноз:
A *Вагітність 7 тижнів. Самовільний аборт у ходу
B Вагітність 7 тижнів. Загроза аборту.
C Вагітність 7 тижнів. Аборт що розпочався.
D Вагітність 7 тижнів. Неповний аборт
E Вагітність 7 тижнів. Повний аборт.

122Жінка 29-ти років скаржиться на різкі болі внизу живота, які виникли раптово і кров'янисті відділення зі статевих шляхів. Відмічає затримку менструацій. При обстеженні - тіло матки дещо збільшені. Додатки з права болючі, збільшені, симптом Щьоткіна-Блюмберга позитивний. Ваш діагноз:
A *Порушена позаматкова вагітність
B Міома матки
C Кіста яєчника
D Самовільний аборт
E Дисфункціональна маткова кровотеча

123Жінка 30-ти років скаржиться на болі внизу живота, тривалі і рясні менструації. При обстеженні тіло матки збільшено до 10-11 тижнів, щільне. Ваш діагноз:
A *Міома матки
B Кіста яєчника
C Вагітність 10-11 тижнів
D Рак тіла матки
E Дисфункціональна маткова кровотеча

124При проведенні профілактичного огляду з метою ранньої діагностики раку шийки матки використовують:
A *Мазки на атипові клітини
B Мазки на ступінь чистоти піхви

C Симптом папороті
D Симптом зіниці
E Бактеріологічне дослідження

125Серед захворювань статевих органів у дівчаток найчастіше трапляються:
A *Вульвовагініти
B Ендоцервіцити
C Ендометріти
D Параметріти
E Пельвіоперітонити

126При атрезії дівочої пліви і нижньої третини вагіни, з утворенням гематокольпосу, лікування полягає в:
A *Хірургічному втручанні
B Застосуванні зігріваючого компресу
C Застосуванні спазмолітиків
D Застосуванні анальгетиків
E Застосуванні холоду

127Хвора 47-ми років скаржиться на рясну кровотечу зі статевих шляхів, затримка менструації 4 місяці. При гінекологічному обстеженні тіло матки нормальних розмірів, безболісне. Який імовірно діагноз?
A *Клімактерична дисфункціональна кровотеча
B Міома матки
C Перервана вагітність
D Рак шийки матки
E Внутрішній ендометріоз

128Механізм дії бар'єрних контрацептивів:
A *Створюють бар'єрні перешкоди на шляху попадання сперми в вагіну
B Викликає зміни цервікального слизу
C Запобігає овуляції
D Зменшує життєдіяльність сперматозоїдів
E Викликають зміни ендометрію

129У хворої 55-ти років, діагностований рак шийки матки з розпадом пухлини. Виникла кровотеча з піхви. Вкажіть об'єм долікарської допомоги:
A *Виконати тугу тампонаду піхви
B Ввести кровозупинні засоби
C Провести піхвову ванночку
D Обробити перекисом водню шийку матки
E Холод на низ живота

130У жінки 25-ти років скарги на гострий біль внизу живота, запаморочення, менструальний цикл нерегулярний, остання менструація 2 тижні тому. Тест на вагітність негативний. Якій патології відповідає дана клінічна картина?
A *Апоплексія яєчника
B Позаматкова вагітність

C Хронічний аднексит
D Мимовільний аборт
E Рак яєчника

131Назвіть засіб контрацепції, який використовують для профілактики небажаної вагітності та інфікування захворюваннями, які передаються статевим шляхом?
A *Презерватив
B Жіноча стерилізація
C Внутрішньоматкова спіраль
D Сперміциди
E Чоловіча стерилізація

132Вкажіть, в який період менструального циклу виникає овуляція:
A *В середині менструального циклу
B Після менструації
C На 7-8 день менструального циклу
D Перед наступною менструацією
E Спочатку менструації

133Пацієнтці 24 роки, рекомендовано вимірювання базальної температури. Як правильно виконати цю маніпуляцію?
A *Щоденно вранці, після пробудження
B Щоденно ввечері, після їди
C Щоденно вранці, після їди
D Зранку і ввечері щоденно
E Щоденно вранці, з 5 дня менструального циклу

134Яка неускладнена пухлина яєчників не потребує оперативного лікування?
A *Фолікулярна кіста
B Дермоїдна кіста
C Папілярна кістома
D Серозна кістома
E Шоколадна кіста

135Назвіть зміни, які відбуваються в тканинах при краурозі вульви:
A *Атрофія
B Запалення
C Гіпертрофія
D Регенерація
E Десквамація

136При профілактичному огляді жінки, на шийці матки виявлено ерозію шийки матки розміром 2х3см. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
A *Колькоскопія
B Гістеросальпінгографія
C Гістероскопія
D Лапароскопія
E УЗД-обстеження

137Назвіть характерні ознаки гермафродитизму:
A *Наявність в однієї особи статевих ознак обох статей
B Недорозвинена матки
C Пізне менархе
D Вагінізм
E Наявність атрезії піхви

138Безплідною подружньою парою вважається та, у якої при активних статевих стосунках зачаття не наступає протягом вказаного періоду часу:
A *12 місяців
B 3 місяці
C 6 місяців
D 2 роки
E 3 роки

139Назвіть основний метод гінекологічного дослідження дітей:
A *Ректоабдомінальне дослідження
B Кольпоцитологічне дослідження
C Вагіноскопія
D Рентгенопельвіографія
E Огляд ш/матки в дзеркалах

140Пацієнтка 24-х років скаржиться на гострий біль у лівій здухвинній ділянці з іррадіацією в пряму кишку, який виник раптово після статевого акту. Остання менструація була 2 тижні тому. При пальпації визначаються біль та позитивні симптоми подразнення очеревини зліва. Який попередній діагноз можна поставити?
A *Апоплексія лівого яєчника
B Загроза переривання вагітності
C Гострий апендицит
D Розрив маткової труби
E Сальпінгоофорит

141 На ФАП доставлена пацієнтка 69-ти років, із профузною кровотечею із статевих шляхів, що зумовлено раком шийки матки. Яку невідкладну допомогу повинна надати акушерка?
A *Туга тампонада піхви
B Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
C Мазок на цитологічне дослідження
D Кольпоскопія
E Зондування порожнини матки

142 В жіночу консультацію звернулася жінка з підозрінням на прогресуючу позаматкову вагітність. Вкажіть додатковий метод обстеження для підтвердження діагнозу:
A *УЗД
B Накладання клем на параметрій

C Притиснення черевної аорти
D Накладання холоду на низ живота
E Введення тампону з ефіром в заднє склепіння

143До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка 38-ми років, що скаржиться на загальне недомагання, болі в ділянці зовнішніх статевих органів, які посилюються при ходьбі. Об'єктивно: температура тіла - 38,0°*C*, відмічається гіперемія, набряк, різка болючість, місцеве підвищення температури в ділянці великої статевої губи. Ваш попередній діагноз:
A *Бартолініт
B Вульвіт
C Рак вульви
D Крауроз вульви
E Лейкоплакія вульви

144В гінекологічне відділення поступила хвора 14-ти років зі скаргами на кров'яні виділення із статевих шляхів, нерегулярні, які почалися в термін менструації і тривають 10 днів. Менархе з 13-ти років нерегулярні. Ваш попередній діагноз:
A *Ювенільна кровотеча
B Перервана маткова вагітність
C Перервана позаматкова вагітність
D Народження фіброматозного вузла
E Травма статевих органів

145В гінекологічне відділення поступила хвора 14-ти років зі скаргами на кров'яні виділення із статевих шляхів, нерегулярні, які почалися в термін менструації і тривають 10 днів. Менархе з 13-ти років нерегулярні. При обстеженні зовнішніх статевих органів - розвиваються правильно. Дівоча пліва ціла. Ваш попередній діагноз:
A *Ректоабдомінальне дослідження
B Дослідження в дзеркалах
C Піхвове дослідження
D Взяття мазка на цитологічне дослідження
E Кольпоскопічне дослідження

146Пацієнтка 30-ти років звернулась в жіночу консультацію з приводу неплідності. З анамнезу: двобічний хронічний сальпінгоофорит. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення прохідності маткових труб?
A *Гістеросальпінгографія
B Гістероскопія
C Кульдоскопія
D Лапароскопія
E Вимірювання базальної температури

147Хвора 47-ми років звернулась до акушерки ФАПу в зв'язку з кровотечею, яка почалася 2 тижні тому. Остання менструація 3 місяці тому. Менструація відмічалася на протязі останніх 2-х років. Місячні проходили з затримкою від 5 до 15 днів і тривала 8-10 днів. Вагінально - матка нормальних розмірів, рухома, не болюча, звичайної консистенції. Ваш попередній діагноз:

A *Дисфункціональні маткові кровотечі клімактеричного періоду
B Рак тіла матки
C Міома матки
D Дисфункціональні маткові кровотечі ювенільного періоду
E Початковий аборт

148В жіночу консультацію доставлена пацієнтка 13-ти років зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: менструації, відсутні рахує себе хворою, на протязі 3-х місяців. З появою болів внизу живота, що тривали 2-3 дні, і повторювалися щомісячно. При огляді в ділянці передвір'я піхви визначається яскраво-багрове випинання. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Ваш попередній діагноз:
A *Атрезія дівочої перетинки
B Гострий апендицит
C Кишкова коліка
D Гострий вульвіь
E Гострий кольпіт

149Хвора 47-ми років звернулась до акушерки ФАПу в зв'язку з кровотечею яка, почалася 2 тижні тому. Остання менструація 3 місяці тому. На протязі останніх 2-х років місячні проходили з затримкою від 5 до 15 днів і тривала 8-10 днів. Вагінально - матка нормальних розмірів, рухома, не болюча, звичайної консистенції. Ваша подальша тактика:
A *Госпіталізація в гінекологічне відділення
B Взяття на диспансерний облік
C Призначити симптоматичне лікування
D Відвідати хвору на дому через 2 дні
E Організувати стаціонар на дому

150В жіночу консультацію доставлена пацієнтка 13-ти років зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: менструації відсутні рахує себе хворою, на протязі 3-х місяців. З появою болів внизу живота, що тривали 2-3 дні, і повторюють щомісячно. При огляді в ділянці передвір'я піхви визначається яскраво-багрове випинання. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Який метод лікування є найбільш доцільний?
A *Розсікання дівочої перетинки
B Сидячі ванночки
C Спринцювання
D Примочки
E Електрофорез з новокаїном

151До акушерки на ФАП звернулась хвора 32-х років зі скаргами на гноєподібні виділення з статевих шляхів, свербіння та печія в ділянці зовнішніх статевих органів та в піхві. При огляді: шкіра та слизова вульви гіперемійована, сліди розчухів, слизова піхви гіперемійована, виділення гноєподібні. Тіло матки та додатки без особливостей. Ваш попередній діагноз:
A *Гострий вульвовагініт
B Гострий ендометрит
C Гострий бартолініт
D Гострий аднексит

E Гострий кольпіт

152До акушерки на ФАП звернулась хвора 32-х років зі скаргами на гноєподібні виділення з статевих шляхів, свербіння та печія в ділянці зовнішніх статевих органів та в піхві. При огляді: шкіра та слизова вульви гіперемійована, сліди розчухів, слизова піхви гіперемійована, виділення гноєподібні. Тіло матки та додатки без особливостей. Яке обстеження доцільно провести при даній патології?
A *Взяття мазка на ступінь частоти
B Взяття мазка на цитологічне дослідження
C Взяття мазка на цитогормональне дослідження
D Зондування порожнини матки
E Гістероскопія

153У хворої 28-ми років на 3-ю добу після проведеного діагностичного вишкрібання з'явилася температура до 38°*C*, біль внизу живота, і слизисто-гнійні виділення з неприємним запахом. Матка незначно збільшена тістуватої консистенції, болюча. Виділення з церві кального каналу серозно-гнійні. В мазку виявлена велика кількість диплококів, розміщені всередині лейкоцитів та позаклітині. Ваш попередній діагноз:
A *Загострення хронічного гонорейного ендометриту
B Загострення хронічного гонорейного кольпіту
C Загострення хронічного гонореї нижнього відділу сечостатевого тракту
D Гострий трихомоніаз
E Гострий хламідіоз сечостатевих органів

154У пацієнтки 42-х років при бімануальному дослідженні виявлено, що матка збільшена до 7-8 тижнів вагітності, щільної консистенції, неболюча. Менструації регулярні, по 8-9 днів, через 28 днів, помірні. Остання менструація 2 тижні тому. Про який патологічний стан з боку матки можна подумати?
A *Фіброміома матки
B Ендометріоз матки
C Гіперплазія матки
D Ендометрит
E Міхурцевий занесок

155При обстеженні у жіночій консультації у паіцєнтки 38-ми років виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:
A *Передракових станів
B Доброякісних пухлин
C Ретекційних кист
D Злоякісного захворювання шийки матки
E Запльних захворювань шийки матки

156Пацієнтка 30-ти років. Звернулася до акушерки ФАПу на консультацію з приводу попередження непланової вагітності. Пацієнтка пеербуває в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Менструальни цикл регулярний. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?

A *Внутрішньоматкові засоби контрацепції
B Комбіновані оральні контрацептиви
C Бар'єрні методи контрацепції
D Природні методи планування сім'ї
E Лапараскопічну стерилізацію

157До акушерки ФАПу звернулась жінка 27-ми років із травмою зовнішніх статевих органів. При огляді виявлено невелику гематому правої великої статевої губи, яка не збільшується. Яка тактика акушерки?
A *Госпіталізувати хвору
B Ввести спазмолітичні засоби
C Прикласти зігрівальний компрес
D Ввести знеболюючі засоби
E Взяти мазок на бактеріологічне дослідження

158Пацієнтка 65-ти років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на рак ендометрію. Вкажіть найдоцільніший метод дослідження для уточнення діагнозу:
A *Роздільне діагностичне вишкрібання слизової облонки шийки матки і слизової матки
B Ультразвукове дослідження
C Бактеріологічне дослідження
D Мазок на цитологічне дослідження
E Гістеросальнінгографія

159До жіночої консультації звернулась жінка 28-ми років зі скаргами на періодичний переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструації 5 тижнів. При проведенні бімануального дослідження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабого наповнення. Вкажіть попередній діагноз:
A *Порушена позаматкова вагітність
B Апоплексія яєчника
C Прогресуюча позаматкова вагітність
D Перекрут ніжки кистоми
E Розрив піосальпінксу

160Вкажіть які інструменти треба підготувати, якщо лікар після огляду пацієнтки в гінекологічному відділенні запідозрив позаматкову вагітність:
A *Для пункції заднього склепіння піхви
B Для зондування матки
C Для гідротубації
D Для діагностичного вишкрібання матки
E Інструменти для біопсії шийки

161Встановіть попередній діагноз, якщо до вас на ФАП звернулась молода дівчина 16-ти років зі скаргами на нерегулярні місячні, слабкість, головні болі, АТ-100/60 мм рт.ст., пульс - 70/хв.:
A *Порушення менструального циклу
B Захворювання щитовидної залози
C Гіпертонічна хвороба

D Гіпотонія
E Вегетасудинна дистонія

162Вкажіть основні завдання, що стоять перед акушеркою оглядового кабінету:
A *Виявлення фонових та передракових захворювань жіночої статевої сфери
B Диспансеризація вагітних
C Виявлення хвороб серця у вагітних
D Виявлення хвороб нирок у вагітних
E Виявлення ендокринних захворювань у вагітних

163Обґрунтуйте тактику, якщо ви працюєте на ФАПі і до вас звернулась дівчина 14-ти років, у якої розпочалась ювенільна кровотеча:
A *Госпіталізувати хвору
B Ввести спазмолитики, дати пораду
C Ввести знеболюючи засоби
D Ввести серцеві препарати
E Розпочати інфузійну терапію

164Обґрунтуйте вашу тактику, якщо ви працюєте в гінекологічному відділенні, куди доставили хвору в тяжкому стані з підозрою на порушену позаматкову вагітність:
A *Викликати лікаря, підготувати інструменти для діагностичної пункції заднього склепіння
B Підготувати ін’єкції матко-скорочуючих засобів
C Ввести в/м 1,0 - 1% вікасолу
D Ввести знеболюючи засоби
E Підготувати серцеві препарати для в/в введення

165Встановіть попередній діагноз для надання допомоги, якщо до вас на ФАП звернулась дівчина 16-ти років зі скаргами на відсутність нормальних менструацій, невеликий зріст, слабий розвиток молочних залоз, погану пам’ять:
A *Затримка статевого розвитку
B Полікістоз яєчників
C Нейроендокринний синдром
D Киста яєчника
E Дисгермінома яєчників

166Проаналізуйте дану ситуацію та запропонуйте лікування, якщо ви працюєте на ФАПі і до вас звернулась хвора з давнім розривом промежини:
A *Хірургічне лікування
B Вагінальні ванночки
C Вагінальні тампони
D Гімнастика лікувальна
E Санаторно-курортне лікування

167Яке лікування можна запропонувати жінці 80-ти років якщо ви працюєте на ФАПі і до вас звернулась хвора з давнім розривом промежини?
A *Лікування консервативне (жіночий пессарій та гігієнічні засоби)
B Вагінальні тампони

C Санаторно-курортне лікування
D Хірургічне лікування
E Вагінальні ванночки

168Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати пацієнтці 22-х років, яка звернулась з приводу попередження небажаної вагітності. Пацієнтка в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено:
A *Внутрішньоматковий
B Гормональний
C Хірургічний
D Бар'єрний
E Посткоїтальний

169Назвіть основний тест функціональної діагностики в гінекології, який може виконати сама жінка:
A *Базальна температура
B Феномен зіниці
C Мазки з піхви
D Симптом папороті
E Гормональне дзеркало

170Встановіть попередній діагноз, якщо до вас звернулась молода жінка зі скаргами на болі внизу живота, гнійні виділення з піхви, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів. Температура - 36,6°*C*. Симптоми з'явились після статевого контакту 3 доби тому з випадковим партнером:
A *Специфічний запальний процес (гонорея)
B Вульвіт
C Вульвовагініт
D Колпіт
E Ендометрит

171Який метод контрацепції має 100% ефективність?
A *Ніякий
B Бар'єрний метод
C Внутрішньоматкова контрацепція
D Гормональна контрацепція
E Посткоїтальна контрацепція

172З якого методу дослідження починають обстеження при безплідді?
A *Спермограма
B Лапароскопія
C Гістеросальпінгографія
D Вимірювання базальної температури
E Визначення рівня гормонів у крові

173Вкажіть що дозволяє діагностувати такий метод дослідження як пункція черевної порожнини:
A *Порушену позаматкову вагітність

B Маткову вагітність
C Безплідність
D Пухлину матки
E Ендометріоз

174Вкажіть, який метод дослідження необхідно призначити хворій, для уточнення діагнозу, якщо у хворої 36-ти років запідозрили міому матки:
A *Ультразвуковий
B Кольпоскопічний
C Кольпоцитологічний
D Ренгенологічний
E Радіоімунний

175Вкажітьзбудники специфічних запальних захворювань:
A *Бліда спірохета
B Стафілококи
C Кишкова паличка
D Анаероби
E Стрептококи

176Наиболее эффективный метод контрацепции, в плане профилактики ВИЧ инфекции:
A *Презервативы
B Оральные контрацептивы
C Прерванный половой акт
D ВМС
E КОК

177Больная, 30-ти лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на мажущие кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота. Последние месячные были 2 месяца назад. Pv: шейка матки цианотична, наружный зев пропускает кончик пальца. Матка увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки не определяются. Вероятный диагноз:
A *Угрожающий выкидыш
B Дисфункция яичников
C Неполный аборт
D Внематочная беременность
E -

178В гинекологическое отделение поступила пациентка, 18 лет, с жалобами на резкие боли внизу живота и левой подвздошно-паховой области, тошноту, рвоту. Месячные с 14 лет по 3-4 дня, через 28 дней. Последние месячные были 2 недели назад. Pv: тело матки нормальных размеров, придатки справа не определяются, слева - не пальпируются из-за резкой болезненности. О какой патологии можно думать?
A *Апоплексия яичника
B Острый сальпингоофорит
C Трубная беременность
D Пельвиоперитонит

E Пиосальпинкс

179Больная, 25 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на контактное кровотечение из половых путей. При осмотре шейки матки с помощью зеркал выявлено ярко-красное образование в области наружного зева. Какой метод диагностики целесообразно применить для уточнения диагноза?
A *Кольпоскопию
B Бимануальное исследование
C Бактериологическое
D Кульдоскопию
E Бактериоскопическо

180У женщины, 40 лет, во время осмотра с помощью влагалищных зеркал выявлена эрозия на шейке матки, которая легко кровоточит при прикосновении. Какое наиболее информативное исследование для уточнения диагноза необходимо провести?
A *Биопсию шейки матки
B Выскабливание шейки матки
C Кульдоскопию
D Зондирование шейки матки
E Аспирационную биопсию

181Женщина, 38 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровянистые выделения из половых путей в течение 10 дней, которые начались после 2-х месячной задержки. Из анамнеза: в течение 2-х лет находится на “Д” учете по поводу гиперплазии эндометрия. Pv: тело матки нормальных размеров, придатки не определяются. Какой дополнительный метод исследования необходимо провести для уточнения диагноза?
A *Раздельное диагностическое выскабливание
B Зондирование матки
C Гистеросальпингографию
D Гидротубацию
E Пункцию брюшной полости через задний свод влагалища

182У пациентки, 32-х лет, с осложненными родами в анамнезе, и жалобами на истечение мочи из влагалища, зуд и боли в области наружных половых органов при осмотре в зеркалах на передней стенке влагалища определяется свищевое отверстие. Какой дополнительный метод поможет выяснить ход свищевого канала?
A *Фистулография
B Кульдоскопия
C Бимануальное исследование
D Лапароскопия
E Ректально-абдоминальное исследование

183В приемное отделения гинекологического стационара доставлена пациентка с резкими болями внизу живота, дома была рвота. Две недели назад во время профосмотра у нее была обнаружена киста правого яичника до 8 см в диаметре. При влагалищном исследовании ранее обнаруженная киста не определяется.

Предположительный диагноз:
A *Разрыв кисты яичника
B Почечная колика
C Острый аппендицит
D Апоплексия яичника
E Перекрут ножки кисты яичника

184В гинекологическое отделение поступила женщина с диагнозом “Прервавшаяся трубная беременность по типу разрыва трубы”. Какой дополнительный метод исследования необходимо провести для уточнения диагноза?
A *Пункция брюшной полости через задний свод влагалища
B Зондирование матки
C Гистеросальпингографию
D Диагностическое выскабливание матки
E Биопсию шейки матки

185Какой наиболее информативный дополнительный метод исследования необходимо провести при подозрении на прогрессирующую трубную беременность?
A *УЗИ
B Пункцию брюшной полости через задний свод влагалища
C Гистеросальпингографию
D Зондирование матки
E Кольпоскопию

186Женщина, 25-ти лет, проходит обследование по поводу бесплодия. Врач назначил взятие материала для определения симптома “зрачка”. Из какого отдела половой системы акушерке необходимо взять материал?
A *Из цервикального канала
B Из задней стенки влагалища
C Из уретры
D Из заднее-боковой стенки влагалища
E Из передней стенки влагалища

187Какой медицинский документ должна оформить акушерка при взятии пациентки на “Д” учет по поводу миомы матки?
A *Контрольную карту диспансерного наблюдения
B Обменную карту
C Историю болезни
D Индивидуальную карту беременной
E Больничный лист
188Обильное маточное кровотечение у больной 45-ти лет привело к ухудшению состояния. Появилась слабость, обмороки, снизилось АД, участился пульс. Для лечения анемии врач рекомендовал начать переливание кровезаменителей. Что необходимо в первую очередь выполнить акушерке?
A *Определить группу крови и резус фактор
B Измерить температуру тела
C Взвесить женщину

D Определить наличие белка в моче
E Определить чувствительность к антибиотикам

189На ФАП обратилась пациентка, 50-ти лет, с жалобами на чувство тяжести, боли в области крестца, учащенное, болезненное мочеиспускание. Менопауза 5 лет. В анамнезе 4 родов, последние осложнились глубокими разрывами промежности. Объективно: половая щель зияет. При натуживании из половой щели появляется шейка матки. Диагноз:
A *Опущение матки, стенок влагалища
B Миома матки
C Рак матки
D Хронический эндометрит
E Хронический периметрит

190Девушка, 16-ти лет, предъявляет жалобы на отсутствие месячных. Объективно: вторичные половые признаки не выражены. При гинекологическом исследовании размеры матки, яичников меньше нормы. О какой возможной патологии идет речь?
A *Задержка полового развития
B Атрезия девственной плевы
C Ложный гермафродитизм
D Синдром склерокистозных яичников
E Преждевременное половое развитие

191Какой метод позволяет определить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам при воспалительных заболеваниях половых органов?
A *Бактериологический
B Бактериоскопический
C Цистологический
D Кольпоскопический
E Гистологический

192К акушерке ФАП обратилась женщина, 38-ми лет, с жалобами на обильные месячные. Как называется такое нарушение менструального цикла?
A *Гиперменорея
B Олигоменорея
C Опсоменорея
D Пройоменорея
E Полименорея

193В здравпункт промышленного предприятия обратилась женщина, 34-х лет, с жалобами на боли внизу живота и пояснице, кровянистые выделения, повышение температуры до 37,5°*C*. Заболела после медицинского аборта. Предположительный диагноз:
A *Острый эндометрит
B Миома
C Кольпит
D Вульвит
E Бартолинит

194Женщина 52-х лет, обратилась к акушерке ЖК с жалобами на кровянистые выделения из влагалища. Какое основное исследование надо провести для постановки окончательного диагноза?
A *Фракционное выскабливание
B Осмотр в зеркалах
C Бимануальное исследование
D Бактериологическое
E Бактериоскопическое

195Акушерка ФАП взяла мазок из шейки матки. Обнаружены атипические клетки. Для какого заболевания это характерно?
A *Дисплазия шейки матки
B Эктопия
C Лейкоплакия
D Полип цервикального канала
E Эритроплакия

196На диспансерный учет взята женщина с диагнозом - эрозия шейки матки. Какое исследование необходимо провести для исключения рака шейки матки?
A *Кольпоскопия, проба Шиллера
B Осмотр в зеркалах
C Бактериоскопическое
D Бактериологическое
E Бимануальное исследование

197У девочки 13-ти лет появились признаки полового созревания. Что является основным признаком полового созревания девочки?
A *Менархе
B Увеличение молочных желез
C Изменение фигуры
D Изменение голоса
E Бели

198Акушерка гинекологического отделения готовит все необходимое для пункции заднего свода. Что является показанием для пункции заднего свода?
A *Внематочная беременность
B Миома матки
C Хронический аднексит
D Эндометриоз
E ДМК

199Акушерка ФАП проводит консультирование по планированию семьи. Какой способ контрацепции одновременно защищает от ЗППП и предохраняет от нежелательной беременности?
A *Презерватив
B Шеечный колпачок
C Влагалищная диафрагма
D ВМС

E МЛА

200На здравпункт промышленного предприятия обратилась женщина, 28-ми лет, с жалобами на пенистые обильные выделения со зловонным запахом. Для какого заболевания характерны эти симптомы?
A *Трихомониаз
B Гарднереллез
C Гонорея
D Банальный кольпит
E Хламидиоз

201К акушерке ФАП обратилась женщина 35-ти лет, за подбором контрацептива. Замужем, она имеет 3-х детей. Выберите самый эффективный метод?
A *ВМС-Мирена
B КОКи
C Природные
D Барьерные
E Спермициды

202К акушерке ЖК обратилась пациентка. У ее дочери, 13-ти лет, отсутствует менструация и периодические боли внизу живота. Поставлен диагноз - атрезия девственной плевы. Что рекомендовать ей?
A *Крестообразное рассечение девственной плевы
B Симптоматическая терапия
C Проф. осмотр 1 раз в год
D Заместительная гормональная терапия
E Диспансерное наблюдение через 3 месяца

203К акушерке ФАП обратилась женщина 22-х лет с жалобами на боль в области наружных половых органов. При осмотре на большой половой губе плотное, болезненное опухолевидное образование. Предположительный диагноз:
A *Острый бартолинит
B Гемангиома
C Липома
D Фиброма
E Парауретральная киста

204На диспансерном учете в ЖК женщина в течение 5-ти лет. Матка была увеличена до 8 недель. На последнем приеме отмечен быстрый рост опухоли до 13-14 недель. Какое показано лечение?
A *Оперативное
B Консервативное
C Гормональное
D Лучевая терапия
E Комбинированное лечение

205К акушерке ФАП обратилась женщина 48-ми лет с жалобами на кровянистые выделения в течение трех недель. Что необходимо предпринять в первую очередь?
A *Диагностическое выскабливание

B Пункция заднего свода
C Зондирование матки
D Гистероскопия
E УЗИ

206Під час огляду жінки 40-а років акушерка ФАП виявила, що тіло матки щільної консистенції, бугристе, збільшене в розмірах до 7-8 тижнів вагітності, рухоме при зміщенні, чутливе. Додатки без патологічних змін. Параметрії вільні. Жінка скаржиться на підвищену крововтрату під час місячних, кровотечу, загальну слабість. При огляді шкірні покриви і видимі слизові бліді. Встановіть діагноз:
A *Симптомна міома матки
B Кіста обох яєчників
C Рак ендометрію
D Дисфункціональна маткова кровотеча
E Гормонпродукуюча пухлина яєчника

207Хвора 48-ми років, скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, болі внизу живота. Клініка виникла півроку тому. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки визначаються щільні, бугристі, нерухомі пухлини, які виповнюють порожнину малого тазу. Який діагноз у хворої?
A *Рак яєчників
B Рак тіла матки
C Міома матки
D Кісти яєчників
E Кістоми яєчників

208Хвора, 34-х років, надійшла до стаціонару в тяжкому стані зі скаргами на слабкість, затримку менструації на 3-у тижні, серцебиття, холодний піт. На вулиці втрачала свідомість. Які методи діагностики можна використати для постановки попереднього діагнозу?
A *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
B Ультразвукове дослідження
C Клінічний аналіз крові, сечі, коагулограмма
D Вишкрябування порожнини матки з гістологічним дослідженням зскрібку
E Лапароскопія

209 Жінка 68-ми років скаржиться на свербіж, печію зовнішніх статевих органів. При огляді визначається сухість шкіри зовнішніх статевих органів, атрофія статевих губ. Попередній діагноз:
A *Крауроз
B Вульвіт
C Кольпіт
D Лейкоплакія
E Рак зовнішніх статевих органів

210Хвора 58-ми років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Менопауза 8 років. При гінекологічному

обстеженні: матка дещо збільшена, щільна на дотик, обмежена в рухомості, придатки не визначаються, параметрії вільні. При фракційному вишкрібанні з порожнини матки одержано значний мозкоподібний зішкріб. Який діагноз?
A *Рак тіла матки
B Рак шийки матки
C Аденоміоз
D Хоріонепітеліома
E Гормонопродукуюча пухлина яєчників

Педіатрія

1 Ви працюєте на ФАПі в кабінеті профілактичних щеплень. У 4-х місячної дитини після введення ІІ АКДП раптово виникли симптоми анафілактичного шоку. З введення якого препарату Ви почнете надавати невідкладну допомогу?
A *Р-н адреналіну гідрохлориду 0,1% 0,1 мл
B Р-н анальгіну 50% 0,1 мл
C Р-н сібазону 0,5% 0,3 мл
D Р-н аміназину 2,5% 0,2 мл
E Р-н кальцію глюконату 10% 1,0 мл

2 Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?
A *2,2-2,5 ммоль/л
B 1-1,5 ммоль/л
C 1,75-2,0 ммоль/л
D 2,5-2,75 ммоль/л

E 2,75-3,0 ммоль/л

3Яка з функцій шкірних покривів у новонародженого розвинена найгірше?
A *Терморегуляторна
B Дихальна
C Пігментоутворююча
D Резорбційна
E Регенераторна

4Які з придатків шкіри при народженні дитини недорозвинені?
A *Потові залози
B Нігті
C Сальні залози
D Пушкове волосся між лопатками
E Вії на повіках очей

5У дитини 2-х років температура - 38°*C*, вологий кашель, задишка змішаного типу, в'ялість, розлад сну, тахікардія. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Такі симптоми визначають при:
A *Гострій пневмонії
B Госторому ларингіті
C Назофарингіті
D Бронхіальній астмі
E Гострому бронхіті

6 Дитина 4-х років захворіла раптово, з'явився сухий кашель, свистячий видих, який чути на відстані, в акті дихання участь допоміжних м'язів. Визначте діагноз:
A *Бронхіальна астма
B Гострий бронхіт
C Гострий ларингіт
D Назофарингіт
E Гостра пневмонія

7Головним чинником ризику розвитку бронхіальної астми є:
A *Алергічні захворювання, що передаються по спадковості
B Неефективне лікування пневмоній
C Септичні захворювання шкіри
D Дисбактеріоз
E Хронічні вогнища інфекції

8У дитини з раннього віку спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:
A *Природженій ваді серця
B Вегето-судинній дистонії
C Ревматизмі
D Малій хореї
E Інфекційному міокардиті

9Для якого захворювання є характерним ниючий тупий біль у ділянці правого підребір'я з іррадіацією в праву лопатку?
A *Хронічного холециститу
B Хронічного гастриту
C Хронічного коліту
D Хронічного панкреатиту
E Виразкової хвороби

10 Дитина 5-ти років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок симетрично розташовані, дрібні, геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:
A *Геморагічний васкуліт, шкірна форма
B Хвороба Верльгофа
C Кір
D Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
E Гемофілія

11Клінічна картина гострого пієлонефриту характеризується у дітей наявністю:
A *Піурії
B Ціанозу шкіри
C Головним болем
D Глюкозурією
E Носовою кровотечею

12Дівчина 12-ти років одержує інсулін, порушила дієту і стан погіршився. Шкіра бліда суха, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, посилення діурезу. Визначте діагноз:
A *Гіперглікемічний стан
B Гіпоглікемічний стан
C Печінкова кома
D Уремічна кома
E Анафілактичний шок

13У дитини 3-х місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5х5 см. Симптоми вказують на:
A *Рахіт
B Гіпервітаміноз Д
C Алергічний діатез
D Спазмофілію
E Гіпотрофію

14Загальний стан дитини дуже важкий, температура - 39,5°*C*, повторні блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають "зірчасту форму". Встановіть діагноз:
A *Менінгококцемія
B Вітряна віспа
C Кір
D Дифтерія
E Скарлатина

15Енантеми, плями Філатова-Копліка-Бельського на слизовій оболонці рота, етапність появи плямисто-папульозного висипу - симптоми, які вказують на:
A *Кір
B Скарлатину
C Менінгококову інфекцію
D Вітряну віспу
E Краснуху

16Мікрофлора кишечнику дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні переважно складається з:
A *Біфідо-бактерій
B Кишкової палички
C Стрептококів
D Стафілококів
E Дріжджової мікрофлори

17У новонародженої дівчинки на 2-гу добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Для якого стану характерні дані симптоми:
A *Фізіологічної жовтяниці новонароджених
B Гемолітичної хвороби новонароджених
C Обтураційної жовтяниці
D Вірусного гепатиту
E Аномалій розвитку гепатобіліарної системи
18 Згідно календаря профілактичних щеплень у віці 12-ти місяців дитині проводять вакцинацію проти:
A *Кору, краснухи, паротиту
B Гемофільної інфекції
C Туберкульозу
D Вірусного гепатиту В
E Поліомієліту

19 Згідно призначень лікаря, новонародженій дитині з ознаками метеоризму Ви ввели газовивідну трубку. На який час можна залишити введену трубку:
A *20-30 хвилин
B 5-10 хвилин
C 2-3-хвилини
D 1 годину
E 2 години

20Вкажіть препарат, який необхідно ввести дитині при анафілактичному шоці:
A *Преднізолон
B Корглікон
C Еуфілін
D Фуросемід
E Седуксен

21У стаціонар поступила дівчинка 8-ми років з підозрою на гострий гломерулонефрит. Які зміни в сечі найбільш характерні для даного захворювання:
A *Протеїнурія, гематурія
B Лейкоцитурія, гематурія
C Глюкозурія
D Бактеріурія
E Ацетонурія, протеїнурія

22Воду якої температури Ви підготуєте для промивання шлунку дитині 5-ти років з гострим гастритом?
A *20-24°*C*
B 26-28°*C*
C 16-20°*C*
D 36-37°*C*
E 24-28°*C*

23 З диспансерного обліку дітей з виразковою хворобою шлунку можна знімати через:
A *5 років повної ремісії
B 2 роки повної ремісії
C 6 місяців повної ремісії
D 1 рік повної ремісії
E 3 роки повної ремісії

24 Згідно призначень лікаря, Ви повинні ввести антитоксичну протидифтерійну сироватку за методом Безредко. В якому розведенні Ви зробите першу ін'єкцію і який оберете шлях введення?
A *1:100, внутрішньошкірно
B Нерозведену, внутрішньошкірно
C Нерозведену, підшкірно
D 1:100, підшкірно
E 1:100, внутрішньом'язово

25 Вкажіть початкову дозу інсуліну для надання невідкладної допомоги дитині з діабетичною комою:
A *0,1-0,2 ОД/кг
B 0,5 ОД/кг
C 0,3-0,5 ОД/кг
D 5,0 ОД/кг
E 2,0 ОД/кг

26 Які показники гемоглобіну у дітей характерні для анемії середньої ступені важкості?
A *70-90 г/л
B 90-100 г/л
C 70-50 г/л
D 90-110 г/л
E 60-80 г/л

27 У дівчинки молодшої групи дитячого садочку діагностовано вітряну віспу. На який термін необхідно ізолювати контактних дітей?
A *21 день
B 7 днів
C 5 днів
D 10 днів
E 17 днів

28 Вкажіть, з якої маніпуляції розпочинається невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності:
A *Санації верхніх дихальних шляхів
B Оксигенотерапії
C Відволікаючої терапії
D Інфузійної терапії
E Введення еуфіліну

29 Вкажіть захворювання, яке супроводжується різким погіршенням загального стану, збудженістю, вимушеним сидячим положенням, експіраторною задишкою:
A *Бронхіальна астма
B Стенозуючий ларинготрахеїт
C Бронхіоліт
D Кашлюк
E Гостра пневмонія

30 Назвіть захворювання, яке розвивається на першому тижні життя, характеризується наявністю пустул розміром 0,5 см, заповнених серозним прозорим або каламутним вмістом:
A *Везикулопустульоз
B Попрілості
C Алергічний дерматит
D Краснуха
E Скарлатина

31 До групи ризику по бронхіальній астмі відносяться діти з:
A *Атопічним дерматитом
B Захворюваннями нирок
C Цукровим діабетом
D Захворюваннями шкіри
E Ревматизмом

32 З якого препарату доцільно розпочати лікування ревматизму:
A *Антибіотиків
B Еуфіліну
C Серцевих глікозидів
D Сечогінних
E Вітамінів

33 У дитини 2-х років погіршення апетиту. При огляді шкіра та слизові оболонки бліді. В загальному аналізі крові еритроцитів - $2,7 \cdot 10^{12}$, гемоглобін - 85 г/л. Яке

захворювання можна діагностувати за даними симптомами?
A *Анемія
B Гострий лейкоз
C Геморагічний васкуліт
D Гемофілія
E Тромбоцитопенічна пурпура

34 У дівчинки 5-ти років скарги на зниження апетиту, слабкість, млявість. При огляді: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ- 130/80 мм рт.ст., сеча кольору “м’ясних помиїв”. Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для визначення видільної та концентраційної функції нирок?
A *Аналіз сечі за Зимницьким
B Загальний аналіз сечі
C Аналіз сечі за Нечипоренком
D Аналіз сечі за Амбурже
E Аналіз сечі за Аддісом-Каковським

35 Лікар призначив дитині дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію сечі необхідно зібрати для виконання цього дослідження?
A *Середню порцію ранкової сечі
B Всю ранкову сечу
C Нічну порцію сечі
D Добову сечу
E Любу порцію сечі

36 Дитина народилася з масою тіла 3800 г. Дитині з 4-х тижневого віку треба проводити профілактику рахіту. Що акушерка буде використовувати для специфічної профілактики рахіту у дітей?
A *Вітамін D_3
B Вітамін *E*
C Вітамін *A*
D Вітамін *C*
E Прогулянки на свіжому повітрі

37 При проведенні патронажу до новонародженої дитини, акушерка відмітила серозні виділення з пупкової ранки. Шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Катаральний омфаліт
B Флегмонозний омфаліт
C Сепсис
D Пупкова грижа
E Попрілості

38 У дитини 2-х років, на фоні ГРВІ, акушерка ФАПу відмітила неспокій, “гавкаючий кашель”, захриплість голосу, задишка, блідість шкіри. Вкажіть яке ускладнення, розвинулося у дитини:
A *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
B Гострий назофарингіт
C Обструктивний бронхіт

D Пневмонія
E Тонзиліт

39 У новонародженої дитини акушерка помітила ціаноз, який посилюється при крику, прийманні їжі. З анамнезу відомо, що мати дитини перехворіла грипом на 10-у тижні вагітності. Для якої патології притаманні ці симптоми?
A *Природжена вада серця
B Вогнищева пневмонія
C Асфіксія новонародженого
D Пологова травма
E Анемія

40 У 12-ти річної дитини через 2 тижні після перенесеної ангіни з'явився біль у серці, блідість шкіри, слабкість, втомлюваність, тахікардія, тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Яку патологію може запідозрити акушерка ФАПу?
A *Ревмокардит
B Вроджену ваду серця
C Анемію
D Вегето-судину дистонію
E Вогнищеву пневмонію

41 Хлопчик 13-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики даного захворювання акушерка ФАПу розцінює як головний?
A *Фіброгастродуоденоскопія
B Фракційне зондування
C Рентген обстеження
D Дуоденальне зондування
E Копрологічне обстеження

42 У дитини 5-ти місяців після ведення в раціон 100 г овочевого пюре з'вились рідкі випорожнення жовтого кольору з білими грудочками та слизом в кількості 5-6 разів на добу, одноразова блювота. Лікар призначив водно-чайну паузу. Яким розчином акушеркабуде її проводити?
A *Розчином регідрону
B Розчином фурациліну
C Фруктовим соком
D 40% розчином глюкози
E Відваром кропиви

43 Акушерка у новонародженої дівчинки виявила крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Що з дитиною?
A *Кефалогематома
B Пологова пухлина
C Внутрішньочерепна пологова травма
D Пухирчатка новонародженого
E Водянка мозку

44 За 5 днів життя недоношена дитина втратила 10% маси, патологічних змін

немає. Вкажіть причини такого стану:
A *Фізіологічна втрата маси тіла
B Фізіологічна жовтяниця
C Транзиторний катар кишок
D Статевий криз
E Фізіологічна ерітема

45 Які рекомендації повинна надати акушерка матері доношеної новонародженої дитини, щодо частоти прикладання до грудей?
A *Годувати за вимогою новонародженого
B Годувати 10 разів на добу
C Годувати 7 разів на добу
D Годувати 6 разів на добу
E Годувати 5 разів на добу

46 Мати дитини 5-ти місяців поскаржилась, що останнім часом дитина стала неспокійною, погано спить. Акушерка з'ясувала, що за останній місяць вона набрала 500 г маси тіла. Яке обстеження необхідно провести?
A *Контрольне зважування
B Вимірювання обводу грудної клітини
C Вимірювання зросту
D Вимірювання обводу голови
E Вимірювання температури тіла

47Дитина народилася від 1 вагітності , фізіологічних пологів з масою тіла 3200 г, з ростом 49 см. За шкалою Апгар - 9 б. При огляді: дитина здорова, *t*° - 36,5°*C*. Які щеплення повинна провести акушерка дитині у пологовому будинку?
A *Проти гепатиту В, туберкульозу
B Проти кашлюку, дифтерії
C Проти поліомієліту, гемофільної інфекції
D Проти кору, краснухи
E Проти правцю, дифтерії

48У дитини 3-х років підвищилася температура тіла до 38°*C*. На шкірі волосяної частини голови, обличчя, губах з'явилася везикулярна висипка. Такий стан характерний для:
A *Вітряна віспа
B Кір
C Краснуха
D Скарлатина
E Менінгокова інфекція

49Ви працюєте акушеркою в пологовій залі, здійснюєте контакт "шкіра до шкіри" здорової новонародженої дитини з матір'ю. Такий контакт триває:
A *2 години
B 1 годину
C До початку годування
D До вимірювання *t*° тіла новонародженого
E До обробки пуповини

50На амбулаторному прийомі дитина, яка може самостійно сидіти і стояти біля опори, голосно повторювати різні склади. Нервово-психічний розвиток дитини відповідає віку:
A *8 місяців
B 6 місяців
C 5 місяців
D 4 місяці
E 12 місяців

51Дитині 6-ти місяців. Підберіть продукт першого прикорму:
A *Овочеве пюре з одного овоча
B Овочеве пюре з різних овочів
C Вівсяна каша на молоці
D Яєчний жовток
E Суміш NAN

52Дитині 4 місяці. У неї підвищена пітливість, неспокійний сон. Лікарем поставлено діагноз: рахіт, початковий період. Для специфічного лікування рахіту необхідно призначити:
A *Аквадетрим
B ЛФК, массаж
C Раціональне харчування
D Дезінтоксикаційна терапія
E Призначення водних процедур

53Дитині 10-ти місяців. Мати вигодовувала дитину коров'ячим молоком та манною кашею. В аналізі крові: Hb- 90 г/л. Лікарем поставлено діагноз: анемія. Визначіть чинник, який сприяв розвитку анемії у дитини:
A *Одноманітне вуглеводне годування
B Раннє введення фруктових соків
C Зниження загального опору організму
D Дія алергенів
E Гормональні порушення

54У дитини 5-ти років температура 39,5°*C*, головний біль, катаральні явища в носоглотці, з'явилися судоми. Вашими першочерговими діями будуть:
A *Введення літичної суміші
B Ввести розчин адреналіну
C Ввести серцеві засоби
D Ввести гормони
E Ввести розчин глюкози внутрішньовенно

55Мати дитини 2-х років цікавиться, яким дітям проводять хіміопрофілактику туберкульозу:
A *З віражем туберкулінової проби
B З негативною пробою Манту
C Часто хворіючим дітям
D Зі скаргами на слабкість, блідість, схуднення, підвищення *t*° тіла
E З порушеннями дихання

56Дитині 2 роки. Лікарем встановлено діагноз: кашлюк. Найчастішими ускладненнями кашлюку у дітей раннього віку можуть бути:
A *Пневмонія
B Анемія
C Ангіна
D Бронхіальна астма
E Несправжній круп

57У дитини 12-ти років скарги на спрагу, часті сечовипускання, підвищений апетит та схуднення. Ці симптоми вказують на:
A *Цукровий діабет
B Пієлонефрит
C Анемія
D Хронічний гастрит
E Туберкульоз

58У дитини 3-х років скарги на болі в животі, нестійкі випорожнення, свербіж в ділянці заднього проходу. Першочерговим дослідженням повинно бути:
A *Зіскоб з періональних складок
B Бактеріологічний посів кала
C Кал на яйця гельмінтів
D Копрологічне дослідження
E Зондування шлунку

59У дитини першого року життя важкий стан, дефіцит маси тіла 30%, шкіра із сіруватим відтінком, зморшкувата, виникають диспептичні розлади. Що може обумовити такий стан?
A *Гіпотрофія III-го ступеня
B Гіпотрофія II-го ступеня
C Гастрит
D Анемія
E Вроджена вада серця

60Після проведення щеплення дитині 12-ти місяців, необхідно заповнити наступну медичну документацію:
A *Форма 112/0, Форма 063/0
B Форма 097/0, Форма 063/0
C Журнал обліку використання вакцини
D Журнал реєстрації проби Манту
E Історію хвороби дитини

61Після вживання полуниці у дитини на шкірі тулуба та обличчі з'явилася плямисто-папульозна висипка, свербіж, підвищення температури тіла до 38°*C*. Що необхідно зробити?
A *Ввести глюкокортикостероїди.
B Застосувати знеболюючі препарати.
C Ввести сечогінні препарати.
D Застосувати антибіотики.

E Госпіталізувати до відділення.

62Акушерка навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним залишком. Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:
A *Підтримувати пуповинний залишок завжди сухим та чистим
B Накривати пуповинний залишок підгузниками
C Обробляти пуповинний залишок 1% р-м діамантового зеленого
D Накладати стерильну пов'язку
E Обробляти пуповинний залишок 96° розчином етилового спирту

63Дитина 9-ти місяців вигодовувалась молочними сумішами, з прикормів отримує манну кашу. Яке дослідження треба запланувати дитині з метою виявлення анемії?
A *Аналіз крові загальний
B Аналіз сечі загальний
C Копрограму
D Зіскоб на ентеробіоз
E Мазок із зіва на флору

64Ви прийшли на активний патронаж до новонародженої дитини10-ти днів. На шкірі з'явилась пітниця. Які симптоми на це вкажуть?
A *Дрібно-крапкові висипання на шиї
B Блідість шкіри та слизових оболонок
C Акроціаноз кінцівок
D Гіперемія в пахових складках
E Затруднене носове дихання

65Мати проводить підготовку дитини до годування груддю, виявила утруднене носове дихання, пов'язане з великою кількістю слизу. Чим потрібно промити носові ходи?
A *Фізіологічним розчином
B Нафтізином
C Галазоліном
D Ефедрином
E Соком алое

66Дитина народилася в строк з вагою - 3200 г та зростом - 52 см, здорова. Коли акушерка планує прикласти новонароджену дитину до грудей матері вперше?
A *Протягом 30 хв. після народження
B Через 2 години
C Після переведення матері і дитини в палату для сумісного перебування
D Через 12 годин
E На другий день після народження

67Консультативний прийом в кабінеті "Здорова дитина". Дайте відповідь на запитання батьків: "В якому віці дитина починає самостійно сидіти?"
A *6 місяців
B 8 місяців
C 9 місяців

D 10 місяців
E 11 місяців

68Ви проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації матері щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?
A *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини
B Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди
C Новонароджених годують 5 разів на добу
D Вночі новонароджених дітей не годують (перерва 8 годин)
E Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

69У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається гіперемійована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Попрілості III-го ступеня
B Везикулопустульоз
C Пітниця
D Попрілості I-го ступеня
E Пухирчатка новонародженого

70У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичні блювання, нічні жахи, емоційна нестійкість. Об'єктивно: хлопчик пониженого харчування, астенічної тілобудови, інтелектуально добре розвинутий. В сечі - ацетон (+++). Ця клінічна картина характерна для діатезу:
A *Нервово-артритичного
B Геморагічного
C Ексудативно-катарального
D Алергічного
E Лімфатико-гіпопластичного

71Дитина12-ти років з підозрою на хронічний гастрит звернулася до дитячої лікарні. До якого обстеження треба готувати цю дитину?
A *Фіброгастродуоденоскопії
B Дуоденального зондування
C Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини
D Флюорографії
E Колоноскопії

72У дівчинки 4-х років, що відвідує дитячий садок, з'явилась дратівливість, нічне нетримання сечі, свербіж в періанальній ділянці. Ці проблеми найбільш вірогідні для:
A *Ентеробіозу
B Аскаридозу
C Трихоцефальозу
D Гіменоліпедозу
E Трихінельозу

73У дівчинки 7-ми років скарги на періодичний ниючий біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання. В сечі: лейкоцити - 16 в полі зору. Яку патологію

можна запідозрити в даному випадку?
A *Інфекцію сечовивідних шляхів
B Гострий вагініт
C Гострий гломерулонефрит
D Гострий проктит
E Енурез

74Мати дитини 3-х місяців скаржиться на неспокій дитини, здуття живота, зниження апетиту. Патронажна медсестра пояснила матері, що у дитини метеоризм. Для зменшення метеоризму вона порекомендувала використовувати:
A *Кропову воду
B Коров'яче молоко
C Некип'ячену воду
D Фруктовий сік
E Солодку воду

75До Вас звернулась мати з дитиною 6-ти років зі скаргами на непостійний біль у животі, навколо пупка, нудоту, зниження апетиту, висип на шкірі у вигляді кропив'янки. Яке обов'язкове обстеження Ви порекомендуєте?
A *Кал на яйця гельмінтів
B Кал на стеркобілін
C Кал на бактеріологічне дослідження
D Кал на копрологію
E Кал на приховану кров

76Новонародженій дитині два дні. Під час сповивання акушерка помітила на шкірі кінцівок та тулуба окремі ділянки гіперемії та лущення. Як ви розцінюєте такий стан?
A *Фізіологічна еритема. Ретельний догляд за шкірою
B Сепсис. Лікування у відділенні патології новонароджених
C Везикулопустульоз. Хвору дитину ізолюють від здорових
D Ексудативно-катаральний діатез. Лікування у алерголога
E Токсична еритема. Лікування у відділенні патології новонароджених

77Дитина народилася від ІІ-ї вагітності ІІ-х нормальних пологів з масою - 3100 г, зростом - 50 см. Вкажіть, яке щеплення необхідно зробити в перший день життя:
A *Проти вірусного гепатиту В
B Проти туберкульозу
C Проти дифтерії
D Проти епідемічного паротиту
E Проти кору

78Одразу після народження над лівою тім'яною кісткою у новонародженого відмічається, флюктуруюча пухлина, яка не поширюється за межі однієї кістки. Про яку потологію це свідчить?
A *Кефалогематома
B Пологова пухлина
C Набрякова форма гемолітичної хвороби
D Гідроцефалія

E Абсцес

79У перший день життя у новонародженої дитини спостерігається густі, в'язкі, темнозелені випорожнення. Оцініть їх:
A *Меконії
B Стул при дезентерії
C Кров'яний стул
D Стул при сальмонельозі
E Стул при вірусному гепатиті

80При обстеженні на дому дитини 2,5 місяців акушерка звернула увагу на те, що дитина здригається при помірно сильних звуках, має підвищену пітливість, помірне облисіння волосяної частини потилиці. Якому захворуванню відповідають ці ознаки?
A *Рахіт
B Пневмонія
C Обструктивний бронхіт
D Анемія
E Спазмофілія

81На 5-й день після народження у дитини після сечовипускання на пелюшках залишається плями жовтувато-цегляного кольору. З чим це пов'язано?
A *Сечокислим інфактором нирок
B Мікрокістозом нирок
C Гідронефрозом
D Пухлиною нирок
E Гломерулонефритом

82Дитина віком 2 місяці на природному вигодовуванні, добре набирає масу тіла. Фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Мати самостійно дала дитині 10 мл яблучного соку. Поясніть, до чого це може призвести:
A *До появи травних розладів
B До зневоднення
C До ранього нервово-психічного розвитку
D До порушень фізичного розвитку
E До порушень нервово-психічного розвитку

83Хлопчик народився від перших пологів при терміні гестації 33 тижні, з масою тіла - 1800 г, довжиною тіла - 40 см. Ви оцінили таку дитину наступним чином:
A *Недоношена
B Доношена
C Переношена
D Доношена із затримкою внутрішньоутробного розвитку
E Переношена із природженою гіпотрофією

84Ви запросили матір з 6-ти місячною дитиною на вакцинацію проти вірусного гепатиту В. Вкажіть дозу та спосіб введення вакцини:
A *0,5 мл в/м в зовнішню поверхню стегна
B 0,5 мл п/ш в плече

C 0,1 мл в/ш в передпліччя
D 0,1 мл в/м в сідницю
E 1,0 мл п/ш в плече

85Яку лікувальну ванну ви оберете для дітей з ексудативно-катаральним діатезом?
A *Череда, корінь дуба, аїра, крохмальні
B Морські ванни
C Радонові ванни
D Гігієнічні ванни
E Хвойні ванни

86При профілактичному огляді дитини 2-х місяців, ви виявили прибавку у вазі за місяць 400 г, зі слів матері, кількість сечовипускань за добу не перебільшує 5. Ви розцінили це як:
A *Абсолютні ознаки недогодовування
B Перегодовування дитини
C Нормальні показники
D Індивідуальні особливості організму дитини
E Вплив навколишнього середовища

87Ви медсестра дитячої поліклініки. У вас на дільниці ВІЛ-інфікована жінка народила дитину. ВІЛ статус дитини не визначено. Які профілактичні щеплення можна проводити дитині до уточнення ВІЛ статусу?
A *АКДП
B БЦЖ
C Кір, краснуха, епідпаротит
D Поліомієліт перорально
E Проти вітряної віспи

88Дитині 6 місяців, педіатр порекомендував ввести в раціон дитини овочевий прикорм. Мама поцікавилась у акушерки, чи готова дитина до цього. Дайте роз'яснення матері:
A *Дитина самостійно сидить, відкриває рот при піднесенні ложки до рота
B Промовляє 2 слова
C Відвертає голову від ложки з їжею
D Випльовує їжу не ковтаючи її
E Закриває рот при вигляді їжі

89Які продукти харчування ви порекомендуєте з метою попередження розвитку залізодефіцитної анемії дитині першого року життя?
A *М'ясо, потім печінка, яєчний жовток, риба
B Овочеве пюре, фруктові соки
C Змішані каші з кількох круп
D Коров'яче або козяче молоко
E Протерті свіжі овочі та фрукти

90 Визначіть найбільш ефективний протигельмінтний препарат, який

використовують для лікування глистних інвазій у дітей:
A *Ворміл
B Піперазин
C Пірантел
D Ентеросгель
E Піпольфен

91Стан дитини порушений. Скарги на підвищення температури та кашель. Аускультативно в нижніх сегментах справа і зліва - велика кількість дрібно-пухирчастих хрипів. Які ще прояви виявимо у дитині?
A *Задишка змішаного типу
B Висипання в ротовій порожнині
C Висипання на шкірі
D Блідість носогубного трикутника
E Менінгіальні прояви

92Вкажіть середній приріст маси тіла для дитини на 2-му місяці життя:
A *800 г
B 400 г
C 500 г
D 600 г
E 700 г

93Визначіть особливості введення вакцини БЦЖ новонародженій дитині:
A *Вводять 0,1 мл розведеної вакцини внутрішньошкірно
B Вводять 0,2 мл розведеної вакцини внутрішньошкірно
C Вводять 0,5 мл розведеної вакцини підшкірно
D Вводять 0,05 мг розведеної вакцини підшкірно
E Вводять 0,1 мл розведеної вакцини підшкірно

94Визначіть положення дитини при приступі бронхіальної астми:
A *Вимушене - сидить, фіксуючи плечовий пояс
B Сидить із зігнутими колінами
C Лежить на животі
D Лежить на лівому боці
E Лежить, запрокинувши голову назад

95 Дитина 10-ти місяців неспокійна,перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподібний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?
A *Гострий стенозуючий ларингіт
B Гострий бронхіт
C Гострий фарингіт
D Гостра пневмонія
E Приступ бронхіальної астми

96У якому випадку вигодовування через зонд буде основним методом годування?
A *Відсутність ковтального рефлексу

B Кефалогематома
C Омфаліт
D Везикулопустульоз
E Відсутність смоктального рефлексу

97У новонародженого в перші години життя: порушене дихання, слабкий монотонний крик, ністагм, косоокість, тремор, порушене смоктання та ковтання. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Внутрішньочерепна пологова травма
B Параліч Ерба
C Сепсис
D Анемію
E Гемолітична хвороба новонароджених

98Коли проводять перше зважування доношеної новонародженої дитини?
A *У пологовій залі після контакту “шкіра до шкіри”
B У пологовій залі перед контактом “шкіра до шкіри”
C У пологовій залі після вимірювання температури тіла
D У пологовій залі перед прикладанням до грудей
E У палаті спільного перебування

99У дитини 2-х років поганий апетит, слинотеча, на слизовій щік та губ білі бляшки, оточені червоним обідком запаленої слизової оболонки. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A *Афтозний стоматит
B Пліснявка
C Кандидозний стоматит
D Кір
E Краснуха

100 У дівчинки 4-х років млявість, не збільшується маса тіла. Шкіра бліда, суха, лущиться, ламкість волосся, нігтів. У загальному аналізі крові знижена кількість гемоглобіну та еритроцитів. Такий стан діагностують при:
A *Анемії
B Гемофілії
C Гіпотрофії
D Лейкозі
E Ревматизмі

101У хлопчика 6-ти років відзначається припухлість і болючість правого колінного суглоба. З анамнезу відомо, що раніше спостерігались періодичні кровотечі, які довго не припинялись, з’явились масивні синці. У дідуся з боку матері теж були такі прояви. Яке найбільш ймовірне захворювання у хлопчика?
A *Гемофілія
B Тромбоцитопенічна пурпура
C Анемія
D Геморагічний васкуліт
E Лейкоз

102У дитини 3-х місяців, що хворіє на рахіт батьки спостерігали напад ціанозу, короткочасну зупинку дихання, дитина вкрилася липким потом. Через 1 хвилину настав гучний вдих і стан нормалізувався. Вкажіть причину вище згаданих симптомів:
A *Зниження рівня кальцію в крові
B Підвищення рівня кальцію в крові
C Метаболічний ацидоз
D Підвищення рівня фосфору в крові
E Зниження рівня фосфору в крові

10312-річна дитина - госпіталізована з підвищеною температурою. Попередньо перехворіла на загострення хронічного тонзиліту. Об'єктивно: летючий біль у великих суглобах, більу серці, задишка. Лабораторно: лейкоцитоз, CRB ++. Ваш попередній діагноз:
A *Гостра ревматична лихоманка
B Скарлатина
C Інфекційний мононуклеоз
D ГРВІ
E Фарингіт

104Хлопчику в пологовому будинку всановлено діагноз природженої вади серця (ДМШП). У 2 міс. віці з'явилася задишка, тахікардія, збільшення печінки. Які препарати необхідно застосувати для покращення стану?
A *Серцеві глікозиди
B Нестероїдні протизапальні
C Препарати калію
D Бета-блокатори
E Глюкокортикоїди

105За перший рік життя довжина тіла дитини всередньому збільшується на:
A *25 см
B 35 см
C 10 см
D 15 см
E 18 см

106Дитина народилася з масою 3000 г. Якою повинна бути маса у віці 3-х місяців?
A *5200 г
B 5000 г
C 5400 г
D 5600 г
E 5800 г

107У якому віці вводять І-й прикорм у разі природного вигодовування?
A *У 6 місяців
B У 5 місяців
C У 9 місяців
D У 8 місяців

E У 7 місяців

108Якою повинна бути температура води для гігієнічної ванни?
A *37°*C*
B 39°*C*
C 28°*C*
D 40°*C*
E 60°*C*

109Який лікарський препарат застосовують для вторинної профілактики ревматизму?
A *Біцилін-5
B Ацетилсаліцилову кислоту
C Ампіцілін
D Аскорбінову кислоту
E Діазолін

110Яка повинна бути температура рідини для промивання шлунку дитині?
A *20-24°*C*
B 16-18°*C*
C 48-50°*C*
D 30-32°*C*
E 10-12°*C*

111Кількість води для постановки очисної клізми дитині 3-х місяців:
A *50 мл
B 10 мл
C 30 мл
D 80 мл
E 100 мл

112Нижче за який показник знижується рівень гемоглобіну при анемії?
A *120 г/л
B 80 г/л
C 90 г/л
D 100 г/л
E 140 г/л

113Як збирають сечу для проведення проби за Зимницьким?
A *За добу кожні 3 години в окремий посуд
B Зранку за 3 години
C За добу в однин посуд
D За 12 годин в один посуд
E За 12 годин в кожні 3 години в окремий посуд

114Для якого захворювання характерні гематурія, протеїнурія, гіпостенурія?
A *Гломерулонефриту
B Інфекція сечовивідних шляхів
C Гострого циститу

D Пієлонефриту
E Цукрового діабету

115Який препарат застосовують при гострому пієлонефриті?
A *Фурадонін
B Фуросемід
C Діазолін
D Фестал
E Преднізолон

116Який препарат призначають при гіпоглікімічній комі?
A *Розчин глюкози
B Інсулін
C Кокарбоксілазу
D Розчин натрію гідрокарбонату
E Розчин аскорбінової кислоти

117Який препарат вводять дітям при судомах?
A *Сибазон
B Анальгін
C Вітамін *D*
D 20% розчин глюкози
E Димедрол

118Співвідношення частоти вдихів і натискань на грудину:
A *На 1 вдих 5 натискувань
B На 1 вдих 3 натискання
C На 1 вдих 4 натискання
D Одне натискання на 1 вдих
E Одне натискання на 3-4 вдихи

119У якому віці здійснюють щеплення проти вірусного гепатиту В?
A *На 1 добу, в 1 та 6 місяців
B На 3 добу, у 7, 14 років
C У 3, 4, 5, 18 місяців
D У 3, 4, 5, 18 місяців; 6, 14 років
E У 12 місяців, 6 років

120Підчас щеплення АКДП - дитина зблідла, втратила свідомість, АТ- 70/40 мм рт.ст., липкий піт. Який стан виник у дитини?
A *Анафілактичний шок
B Непритомність
C Гостра серцево-судинна недостатність
D Колапс
E Епілептичний напад

121Через який час після народження дитини акушерка повинна виміряти температуру тіла?
A *30 хвилин

B 40 хвилин
C 60 хвилин
D 2 години
E Не вимірюють

122На яку відстань від пупкового кільця накладають клему новонародженій дитині?
A *0,5 см
B 1 см
C 2 см
D 5 см
E 10 см

123Як довго триває контакт “шкіра-до-шкіри” матері та новонародженої дитини в пологовій залі?
A *2 години
B 30 хвилин
C 1,5 годин
D До початку годування
E Цілодобово

124Дитині 14 днів, поступила на лікування з ознаками гнійного омфаліту та підозрою на сепсис. Яке лабораторне дослідження підтверджує діагноз?
A *Бактеріологічний посів крові
B Загальний аналіз крові
C Загальний аналіз сечі
D Копрологічне дослідження
E Кал на дизбактеріоз

125При обстеженні дитини 3-х місяців виявлено облисіння потилиці, розлади сну, підвищену пітливість під час годування. На яке захворювання вказують ці симптоми?
A *Рахіт
B Гіпервітаміноз *“D”*
C Спазмофілія
D Гіпотрофія
E Гіповітаміноз вітаміну *“B”*

126Після народження дитини стан новонародженого оцінюють за шкалою Апгар. Скільки балів складає задовільний стан?
A *8-10
B 6-7
C 4-5
D 2-4
E 1-3

127Під час пологів акушерка помітила жовтяничне забарвлення навколоплідних вод; при огляді новонародженого спостерігається жовтяничне забарвлення пупкового канатика, шкіри і слизових. У матері Rh(-) у дитини Rh(+). Про яке захворювання можна подумати?

A *Жовтянична форма гемолітичної хвороби
B Анемічна форма гемолітичної хвороби
C Набрякова форма гемолітичної хвороби
D Атрезія жовчних шляхів
E Вроджений гепатит

128 Дитині проведено пробу Манту. Через 72 години на внутрішній поверхні передпліччя з'явилась папула діаметром 5 мм. Як оцінити результат проби?
A *Позитивна реакція
B Сумнівна реакція
C Слабо позитивна реакція
D Негативна реакція
E Гіперергічна реакція

129 До Вас звернулася мати з дитиною 12-ти років з ознаками харчового отруєння. Який елемент невідкладної допомоги слід застосувати в даному випадку?
A *Промивання шлунка
B Призначення антибіотиків
C Постановка гіпертонічної клізми
D Оксигенотерапія
E Зондування шлунка

130 У дитині 11-ти місяців рахіт. Під час плачу наступила короткочасна зупинка дихання з послідуючим гучним вдихом - "півнячим криком". Який стан можна запідозрити у дитини?
A *Спазмофілія, ларингоспазм
B Гіпервітаміноз вітаміну *"D"*
C Спазмофілія, карпопедальний спазм
D Несправжній круп
E Спазмофілія, еклампсія

131 При огляді зіву дитині 5-ти років видно на мигдаликах сірий наліт, який важко знімається шпателем. Яке захворювання треба запідозрити?
A *Дифтерія мигдаликів
B Афтозний стоматит
C Хронічний тонзиліт
D Лакунарна ангіна
E Кандидозний стоматит

132 Дівчинці 7 діб. Під час огляду акушерка виявила набрякання і збільшення грудних залоз, шкіра над ними не змінена. Зі статевої щілини кров'янисто-слизові виділення. Який стан спостерігається у дитини?
A *Статевий криз
B Токсична еритема
C Сечокислий інфаркт
D Транзиторна гіпотермія
E Транзиторна жовтяниця

133 Дитина, яка народилася з масою тіла - 3500 г, довжиною тіла - 52 см, гестаційний вік - 40 тижнів. Вона голосно кричить, активно смокче, добре утримує

тепло, виражений м'язевий тонус та фізіологічні рефлекси це:
A *Доношена новонароджена дитина
B Недоношена новонароджена дитина
C Переношена новонароджена дитина
D Дитина народжена в асфіксії
E Природжена гіпотрофія

134Дитині віком 5 місяців мати вперше ввела 120 г картопляного пюре. Через 40 хв. дитина стала млявою, в неї виникла блювота, рідкі випорожнення жовто-зеленого забарвлення з білими грудочками. Загальний стан не порушений, температура тіла - 36,7°*С*. Яка хвороба у дитини?
A *Проста диспепсія
B Рахіт
C Гіпотрофія
D Спазмофілія
E Анемія

135У дитини віком 1,5 роки, яка хворіє другий день, спостерігається гавкаючий сухий кашель, осиплість голосу, вночі з'явилася задишка, періоральний ціаноз. Визначте діагноз:
A *Стенозуючий ларинготрахеїт
B Гострий бронхіт
C Гостра пневмонія
D Гострий назофарингіт
E Вогнищева пневмонія

136У дитини 6-ти місяців, під час аускультації серця вислуховують грубий шум "машинного характеру", який вислуховується від моменту народження. Об'єктивно: шкіра бліда, відставання у фізичному розвитку. Така клінічна картина характерна для:
A *Природжена вада серця
B Анемія
C Гіпотрофія
D Ревматизм
E Пневмонія

137Дитина народилася здоровою з масою тіла - 3300 г, довжиною тіла - 50 см. Не хворіє. Визначте, в якому віці треба починати профілактику рахіту:
A *На 2-му місяці життя
B На 3-му місяці життя
C На 4-му місяці життя
D На 7-му місяці життя
E На 8-му місяці життя

138Після ін'єкції цефтріаксону у дівчинки різко погіршився стан: відчуття жару, блідість шкіри, алергійний висип, пульс слабкий, АТ знижується, утруднене дихання, запаморочення. Який препарат потрібно ввести у першу чергу?
A *0,1% розчин адреналіну гідрохлориду
B 2% розчин еуфіліну

C 10% розчин кальцію глюконату
D 50% розчин анальгіну
E 5% розчин ефедрину гідрохлориду

139Під час огляду дитини акушерка виявила почервоніння шкіри навколо пупка, серозно-гнійні виділення з пупкової ранки. Дитина неспокійна. Погано смокче груди. Температура тіла - 38,5°*С*. Яка тактика акушерки?
A *Госпіталізує дитину
B Проведе місцеве лікування
C Назначить загальне лікування
D Викличе лікаря швидкої допомоги
E Проведе УФ-опромінення

140Новонародженій дитині в пологовому будинку проводять вакцинацію проти туберкульозу. Як уводять вакцину БЦЖ?
A *Внутрішньошкірно
B Підшкірно
C Внутрішньом'язово
D Внутрішньовенно
E Внутрішньоартеріально

141Мати з дитиною віком 1 місяць прийшла на прийом на ФАП, задала питання: "Який середній приріст маси тіла на першому місяці життя"?
A *600 г
B 100 г
C 200 г
D 400 г
E 300 г

142На прийом на ФАП прийшла мама з дитиною 2-х місяців та поскаржилася,що хлопчик не витримує перерви між годуваннями, неспокійний, рідко мочиться. Що повинна порекомендувати акушерка?
A *Провести контрольне зважування
B Збільшити час годування
C Догодовувати дитину сумішшю
D Поїти дитину між годуваннями водою
E Зменшити час між годуваннями

143Дитині 3 роки. Стан важкий, температура тіла - 39,4°*С*, на слизовій оболонці мигдаликів плівки сірого кольору, які тяжко знімаються шпателем і кровоточать після зняття. Вкажіть найдоцільніший метод лікування дифтерії зіву:
A *Антитоксична сироватка
B Туберкулін
C Антибіотики
D Інтерферон
E Глюкокортикостероїди

144У дитини 6-ти років скарги на слабкість, млявість, погіршення апетиту. Температура тіла - 39°*С*. Шкіра бліда. Часті болісні сечовипускання, але сечі мало,

вона каламутна. Дитині поставлений діагноз: гострий пієлонефрит. Яку дієту призначають цій дитині?
A *Дієта №5
B Дієта №10
C Дієта №9
D Дієта №1
E Дієта №4

145Стан хлопчика 11-ти років, який стоїть на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, різко погіршився. У дитини після введення інсуліну з'явилось тремтіння рук і ніг, шкіра бліда, покрилася холодним липким потом. Затьмарена свідомість. Що необхідно вввести для надання невідкладної допомоги?
A *40% розчин глюкози
B 24 ОД інсуліну
C 4% розчин натрію гідрокарбонату
D 0,9% розчин натрію хлориду
E 10% р-н кальцію хлориду

146Під час першого патронажу новонародженого акушерка при огляді дитини виявила помірне почервоніння в ділянці пахових складок та сідниць. Чим акушерка порекомендує матері обробляти складки новонародженого?
A *Дитяча олія
B 3% розчин перекисю водню
C 70% розчин етилового спирту
D 1% розчин діамантового зеленого
E 5% розчин йоду

147У дитини 4-х років *t*° - 38,9°*C* на тлі ГРВІ, шкіра щік гіперемійована, відчуття жару. Що насамперед ви використаєте для зниження температури тіла?
A *Фізичні методи охолодження
B Літичну суміш
C Відволікаючу терапію
D Антибактеріальну терапію
E Антигістамінні засоби
148У дитини 9-ти місяців виникла раптово зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом. Через одну хвилину з'явився гучний вдих - "півнячий крик". З чого слід розпочати невідкладну допомогу при даному стані?
A *Ввести 0,5% розчин седуксену
B Ввести 10% розчин кофеїну
C Ввести 50% розчин анальгіну
D Ввести 5% розчин вітаміну *C*
E Ввести 1% розчин нікотинової кислоти

149До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 7-ми років. Захворювання розпочалось 3 дні тому з болю в горлі, *t*° - 37,8-38,3°*C*, головний біль, з'явилась дрібноцяткова висипка, рясна, яскраво-червона, переважно в складках шкіри, блідий носо-губний трикутник, язик обкладений білим нальотом. Який більш імовірний діагноз?
A *Скарлатина

B Вітряна віспа
C Кір
D Краснуха
E Менінгококцемія

150Акушерка ФАПу оглядає дитину 6-ти місяців, перебуває на грудному вигодовуванні. Дитина активна,посміхається, добре впізнає маму. Який продукт доцільно порадити призначити дитині для першого прикорму?
A *Овочеве пюре
B Кефір
C Манну кашу
D Сир
E Яблучний сік

151До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х років, яка захворіла 2 дні тому, *t*° - 37,8°*C*. На шкірі спини, сідниць плямисто-папульозна висипка, збільшені задньошийні та потиличні лімфатичні вузли. На яке захворювання вказують таки симптоми?
A *Краснуха
B Кір
C Скарлатина
D Вітряна віспа
E Атопічний дерматит

152До акушерки ФАПу звернулася бабуся з онукою 7-ми років, яку вкусила оса в ділянці обличчя. Через 30 хвилин дитина почала скаржитись на головний біль, осиплість голосу, припухлість на губах, щоках, повіках. Ваші першочергові дії при наданні невідкладної допомоги дитині:
A *Покласти холод на місце укусу і обколоти 0,1% розчином адреналіну, розведеним 0,9% розчином натрію хлориду
B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину
C Ввести 50%розчин анальгіну внутрішньом'язево
D Ввести 10% розчин глюкози внутрішньовенно
E Ввести 10% розчин кальцію хлориду внутрішньовенно

153Мама дитини 9-ти місяців запитала в акушерки ФАПу в якому віці відбувається закриття великого тім'ячка у здорової дитини?
A *8-18 місяців
B 6-7 місяців
C 7-8 місяців
D 18-20 місяців
E 21-24 місяців

154Акушерка ФАПу оглядає дитину 9-ти місяців. Дівчинка здорова. Тони серця ритмічні. Яка частота серцевих скорочень відповідає даному віку дитини (за 1 хвилину)?
A *120-130
B 140-160
C 110-120

D 100-110
E 80-90

155Після огляду дитини 3-х місяців акушерка робить запис в історії розвитку дитини про еволюцію знака БЦЖ. Найімовірніше в нормі на місці введення вакцини спостерігається:
A *Рубець округлої форми
B Гіперемія
C Папула
D Пустула
E Кірочка

156Мама з дитиною 3-х місяців прийшла на прийом до акушерки ФАПу. Хлопчик здоров, *t*° - 36,5°*C*, шкіра рожева, зі сторони внутрішніх органів патології не виявлено. Після отримання письмової згоди дитині необхідно зробити вакцинацію. Яку вакцину необхідно ввести згідно календарю щеплень?
A *Пентаксим
B БЦЖ
C Туберкулін
D КПК
E Проти гепатиту Б

157Дитина, віком 4-х місяців, лікувалась в стаціонарі з приводу гіпотрофії. Після закінчення курсу лікування виписана додому і буде знаходитись під спостереженням акушерки ФАПу. Що необхідно акушерці призначити дитині для нормалізації мікрофлори кишечника?
A *Бактисуптил
B Плазму
C Преднізолон
D Нерабол
E Альбумін

158У дівчинки 10-ти років скарги на ниючий біль у правому підребір'ї, поганий апетит, нудоту, відчуття гіркоти в роті. Під час пальпації живота - незначне напруження м'язів і біль у правому підребер'ї. Позитивний симптом Ортнера. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Хронічний холецистит
B Хронічний гастрит
C Виразкова хвороба 12-ти палої кишки
D Дискінезія жовчних шляхів
E Ентероколіт

159Дитина 13-ти років скаржиться на швидку стомлюваність, дратівливість, зміну почерку. Місяць тому перехворіла на ангіну. Об'єктивно: шкіра бліда, спостерігаються мимовільні скорочення м'язів обличчя, мигдалики гіпертрофовані. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Мала хорея
B Неревматичний кардит
C Ревматоїдний поліартрит

D Системний червоний вовчак
E Інфекційний ендокардит

160Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:
A *Потиличною та тім'яними
B Лобними та тім'яними
C Лобними
D Скроневими та тім'яними
E Лобними та скроневими

161Акушерка доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний інкубаційний період:
A *21 день
B 14 днів
C 7 днів
D 5 днів
E 2 дні

162Дитині 10 днів. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?
A *Слабкість кардіального сфінктера шлунка
B Підвищена секреторна активність шлунка
C Знижена секреторна активність шлунка
D Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка
E Підвищена перистальтика шлунка

163Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?
A *В перші 30 хв. після народження
B Через 2,5 год.
C Через 40 хв.
D Через 3 год.
E Через 3,5 год.
164У дитини 4-х років з'явилася лихоманка до 39°*C*, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка палпується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?
A *Дизентерія
B Холера
C Токсична диспепсія
D Ешерихіоз
E Сальмонельоз

165Дитині 4-х місяців на грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку слід ввести дитині перший прикорм?
A *З 6-ти місяців
B З 4-х місяців
C З 3-х місяців
D З 7-ми місяців

E З 8-ми місяців

166Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?
A *З 6 місяців, овочеве пюре
B З 5 місяців, сік фруктовий
C З 4 місяців, овочеве пюре
D З 6-ти місяців, кефір
E З 6-ти місяців, 20% манна каша

167Дитина 7-ми років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання можна виявити під час обстеження?
A *Експіраторну задишку
B Інспіраторну задишку
C Апноє
D Брадіпноє
E Тахіпноє

168При огляді новонародженої дитини на 3-ю добу життя виявлено зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов'язана дана проблема?
A *Фізіологічна втрата маси тіла
B Транзиторний дисбактеріоз
C Токсична еритема
D Сечокислий інфаркт нирок
E Статева криза

169Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?
A *З додаванням морської солі
B З додаванням відвару ромашки
C З додаванням відвару дубової кори
D З додаванням крохмалю
E З додаванням відвару череди

170Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорм введений своєчасно. Мати запитує: "До якого віку бажано годувати груддю?"
A *До 2-х років
B До 1 року
C До 9 місяців
D До 6 місяців
E До 7 місяців

171В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "Гостра кишкова інфекція". Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?
A *Бактеріологічне дослідження калу
B Копрограма
C Колоноскопія

D Зіскріб на ентеробіоз
E Аналіз калу на яйця гельмінтів

172Призначте обстеження дитині 5-ти років, у якої протягом двох тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападоподібного характеру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк:
A *Бактеріологічне обстеження слизу
B Аналіз крові на біохімічне дослідження
C Загальний аналіз сечі
D Взяти змиви із носоглотки на вірусологічне дослідження
E Рентгенологічне обстеження

173Дитині п’ять років. При огляді на долонях спостерігається пластинчате лущення. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A *Скарлатина
B Вітряна віспа
C Краснуха
D Кір
E Паротит та інфекція

174Дитина 6-ти років хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при кору:
A *Пневмонія
B Ураження печінки
C Ангіна
D Міокардит
E Орхіт

175Назвіть термін проведення вакцинації поліомієлітною вакциною:
A *3, 4, 5 місяці
B 4, 5, 6 місяці
C 1 рік
D 18 місяців
E 8 місяців

176При диагностике каких заболеваний применяется проба Манту?
A *Туберкулез
B Дизентерия
C Коклюш
D Корь
E Краснуха

177Ребенку необходимо провести первую вакцинацию против туберкулеза. Когда и где проводится первая вакцинация БЦЖ?
A *На третий день жизни, в роддоме, всем здоровым новорожденным детям
B На второй день жизни
C На первый день жизни
D В два месяца

E В три месяца

178У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. З яких ділянок необхідно провести мазок?
A *Із зіва та носа
B З-під язика
C Із носогорла
D Із зіва
E Із задньої стінки горла

179До акушерки ФАПУ звернулася мати дівчинки 8-ми років зі скаргами на погіршення загального стану дитини, відмову від їжі. Одноразове блювання. Часті випорожнення. Об'єктивно: підвищення температури тіла до 38,5°*C*; біль у животі, зі слів матері, випорожнення рідинні, з домішками слизу, з прожилками крові. При пальпації живота: сигмоподібна кишка болюча і спазмована. Вкажіть лікарській засіб, який використовують для лікування дитини:
A *Ніфуроксазид
B Лактобактерин
C Димедрол
D Пеніцилін
E Еуфілін

180 До акушерки звернулась мати з 1,5 річною дитиною, зі скаргами незвичайні зміни в кінцівках, неспокій дитини. При огляді: дитина неспокійна, плаче. Нижні кінцівки зігнуті в колінних та кульшових суглобах, стопи в стані різкого плантарного згинання, пальці кистей рук тонічно напружені, рука нагадує "руку акушера". Про яке захворювання треба думати?
A *Спазмофілія, карпопедальний спазм
B Спазмофілія, ларингоспазм
C Спазмофілія, еклампсія
D Латентна форма спазмофілії
E Рахіт, період розпалу

Внутрішня медицина

1В гінекологічному відділенні у вагітної 24 тижня скарги на підвищення температури до 39°*С*, біль у грудній клітці, вологий кашель з іржавим харкотинням. Об'єктивно: слабкість, гіперемія щік, ЧД- 28/хв.; перкуторно - в нижніх відділах лівої легені притуплення звуку; аускультативно - дрібнопухирчасті вологі хрипи. Після початку лікування протягом 3-х годин температура тіла знизилася з 39°*С* до 36°*С*. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яке ускладнення виникло?
A *Гостра судинна недостатність
B Хронічна судинна недостатність
C Гостра серцева недостатність
D Хронічна серцева недостатність
E Гостра дихальна недостатність

2До акушерки в гінекологічному відділенні звернулась вагітна терміном 12 тижнів зі скаргою на відчуття серцебиття. Після дослідження пульсу акушерка заспокоїла вагітну, пояснюючи, що все в нормі. Які властивості має пульс в нормі?
A *Частота - 70/хв., ритмічний, доброго наповнення і задовільного напруження
B Частота - 70/хв., ритмічний, напружений
C Частота - 90/хв., аритмічний, м'який
D Частота - 50/хв., ритмічний, високий
E Частота - 80/хв., аритмічний, слабкого наповнення

3До акушерки ФАПу, у відсутності фельдшера звернулась хвора зі скаргами на слабкість, підвищення *t*° тіла, боль у колінному суглобі. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому хворіла ангіною. Встановлено діагноз - ревматизм. Які заходи належать до первинної профілактики ревматизму?
A *Санація хронічних вогнищ інфекції
B Додержання дієти №10
C Прийом аспірину протягом 1-го місяця
D Обмеження фізичної активності
E Введення біциліну-5

4Пацієнтка 39-ти років знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні з діагнозом ендометрит. У неї з'явся біль в епігастрії , що виникає через 3-4 години після прийому їжі, турбують голодні нічні болі, нудота. Біль знімаються прийомом їжі. Для встановлення діагнозу призначено проведення ФГДС. Яка підготовка пацієнтки до дослідження?
A *Попередити прийти натще, принести рушник
B Виконати очисну клізму ввечері та вранці
C Виконати сифонну клізму
D Дати проносне
E Ввести газовідвідну трубку

5Ви акушерка ФАПу. На вашій дільниці мешкає вагітна жінка, яка скаржиться на зміну смаку (потреба їсти крейду), появу болючих тріщин у куточках роту, ламкість нігтів та випадіння волосся. Встановлено діагноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба порадити збільшити у раціоні вагітної?
A *М'ясо
B Гарбуз
C Горіхи
D Сир
E Мед

6Пацієнтка 23-х років лікується у гінекологічному відділенні. Після введення антибіотику у хворої раптово виникло запаморочення, біль в грудній клітці, задишка, зниження АТ, ниткоподібний пульс. Ускладнення, яке виникло у пацієнтки:
A *Анафілактичний шок
B Інфаркт міокарда
C Набряк легень
D Серцева астма
E Колапс

7Вагітна жінка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого пієлонефриту. Після в/м'язевого введеня антибіотику погіршився стан: з'явилася слабкість, тремтіння тіла, свербіж шкіри, нудота. Через декілька хвилин вона знепритомніла. Шкіра бліда, пульс - 102/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Яка невідкладна долікарська допомога?
A *Холод на місце ін'єкції, обколоти місце ін'єкції адреналіном
B Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт
C Горизонтальне положення, дати зволожений кисень

D Напівсидяче положення, гірчичники на грудну клітку
E Горизонтальне положення, грілку до ніг

8Пацієнтка 30-ти років скаржиться на інтенсивний нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що протягом 2-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Яке ускладнення виникло?
A *Печінкова коліка
B Ниркова коліка
C Печінкова недостатність
D Гостра ниркова недостатність
E Хронічна ниркова недостатність

9До акушерки ФАПу звернувся чоловік зі скаргами на напади стискаючого болю за грудиною під час ходьби та психоемоційних стресів, з ірадіацією у ліву руку, під ліву лопатку. Біль минає в стані спокою через 5-7 хв. Яка найбільш доцільна невідкладна долікарська допомога у даному випадку?
A *Призначити нітрогліцерин 0,0005 мг під язик
B Призначити аспірин 80 мг розжувати
C Призначити но-шпу 2% - 2 мл в/м
D Призначити папаверин 2% - 2 мл в/м
E Призначити анаприлін 20-40 мг перорально
10До акушерки звернулась пацієнтка 30-ти років, яка скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Яке дослідження треба провести для встановлення діагнозу?
A *Загальний аналіз крові
B Стернальну пункцію
C Аналіз крові на глюкозу
D Аналіз крові на реакцію Васермана
E Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію

11З метою проведення протирецидивного лікування ревматичної хвороби пацієнтам слід вводити:
A *Біцилін
B Преднізолон
C Інсулін
D Папаверин
E Аналгін

12При обстеженні у пацієнтки виявлені: запаморочення, миготіння "мушок" перед очима, задишка при незначному фізичному навантаженні, блідість шкіри, тахікардія, АТ- 110/70 мм рт.ст. Про виникнення якого патологічного стану повинна подумати акушерка?
A *Анемія
B Набряк легень
C Напад бронхіальної астми
D Тиреотиксична криза
E -

13Які рекомендації щодо дієтичного харчування надасть акушерка вагітній з великим ризиком розвитку анемії?
A *Вживання яловичини, печінки
B Обмеження жирів та вуглеводів
C Збільшення калорійності їжі
D Обмеження в раціоні овочів та фруктів
E Обмеження вживання рідини

14При обстеженні пацієнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційну лабільність. Звернула увагу на витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?
A *Тиреотоксикоз
B Гіпотиреоз
C Ішемічна хвороба серця
D Ревматизм
E Гіпертонічна хвороба

15У пацієнтки, що лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря?
A *Дибазол
B Вікасол
C Аспірин
D Аналгін
E Дицинон

16Жінка 61 рік, поскаржилася на раптове утруднення дихання, біль, відчуття стискання у загрудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Виникнення якого невідкладного стану можна запідозрити?
A *Напад стенокардії
B Напад бронхіальної астми
C Геморагічний синдром
D Колапс
E Гіпертермічний синдром

17Під час диспансерного огляду вагітної, що страждає на бронхіальну астму, у пацієнтки виник напад ядухи. Який медикаментозний засіб протипоказаний вагітним при наданні допомоги?
A *Адреналін
B Астмопент
C Ефедрин
D Еуфілін
E Алупент

18У хворої 68-ми років, що страждає на ІХС раптово виник напад ядухи. Під час огляду: хвора сидить, дихання клекочуче, утруднене, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД- 34/хв., Ps- 100/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану найбільш вірогідне у даному випадку?

A *Набряк легень
B Гіпертензивна криза
C Легенева кровотеча
D Напад бронхіальної астми
E Гіперглікемічна кома

19Акушерка здійснює диспансерне спостереження за вагітною, що має вроджену ваду серця у стадії компенсації. Де, в першу чергу, можуть з'явитися набряки на початковій стадії серцевої недостатності?
A *На стопах і гомілках
B На обличчі
C У черевній порожнині
D В ділянці попереку
E У порожнині плеври

20Під час звернення до акушерки вагітна жінка 30-ти років, що страждає на цукровий діабет, раптово поскаржилася на різку слабкість, пітливість, запаморочення, головний біль, тремтіння кінцівок. Які першочергові дії акушерки щодо надання невідкладної допомоги?
A *Напоїти солодким чаєм
B Госпіталізувати до відділення патології вагітності
C Виписати направлення для дослідження крові на глюкозу
D Надати рекомендації з дієтичного харчування
E -

21У породіллі на другий день після пологів погіршився стан. Лікарем встановлені симптоми гострої пневмонії. Призначення якого антибіотика протипоказане під час вагітності і після пологів?
A *Стрептоміцин
B Кефзол
C Цепорин
D Клафоран
E Ампіцилін

22Жінка звернулася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, періодично відмічає відходження калу чорного кольору. Назвіть найбільш ймовірне ускладнення захворювання:
A *Шлункова кровотеча
B Гострий гастрит
C Стеноз воротаря
D Перфорація виразки
E Печінкова колька

23Пацієнт 62-х років хворіє на хронічний бронхіт. Назвіть метод обстеження, що має особливе значення для визначення обструктивних порушень легеневої вентиляції:
A *Спірографічне дослідження
B Рентгенологічне дослідження
C Бронхоскопія

D Аускультація легень
E Визначення бронхофонії

24У хворого, що хворіє на туберкульоз, почалась легенева кровотеча з ознаками гострої судинної недостатності. Назвіть симптом найбільш характерний для колапсу:
A *Різке зниження АТ
B Збереження реакції зіниць на світло
C Глибоке шумне дихання
D Зниження чутливості
E Підвищення АТ

25Пацієнт 62-х років скаржиться на слабкість, спрагу, запаморочення. Об'єктивно: шкіра суха, тонус м'язів знижений, язик сухий,запах ацетону з рота. Відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет. Яку допомогу слід надати пацієнту на догоспітальному етапі?
A *Ввести інсулін короткої дії 20 ОД п/ш
B Ввести 5% розчин глюкози
C Ввести 0,9% розчин хлориду натрію 500 мл
D Ввести 0,45% розчин хлориду натрію 300 мл
E Ввести колоїдні плазмозамінники

26Пацієнтка 51-го року, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, відчула раптове сильне відчуття голоду, неспокій, тремтіння тіла. Втратила свідомість. Об'єктивно: АТ- 75/35 мм рт.ст., тони серця приглушені, тахікардія. Шкіра бліда, волога на дотик. Глюкоза крові - 2,2 ммоль/л. Виберіть препарат для надання невідкладної допомоги:
A *40% розчин глюкози
B Інсулін короткої дії
C 0,1% розчин адреналіну
D 60 мг преднізолону
E 2,4% розчин еуфіліну

27Хвора скаржиться на біль у правому під ребер'ї, що віддає у лопатку, гіркоту та сухість у роті. Ці ознаки з'являються протягом двох років після вживання жирної, смаженої, гострої їжі. Стан задовільний, шкіра звичайного забарвлення, живіт м'який, помірно болючий в ділянці проекції жовчного міхура. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Хронічний холецистит в стадії загострення
B Хронічний панкреатит
C Хронічний коліт
D Хронічний гепатит в стадії загострення
E Цироз печінки

28Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці зліва, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 39,0°*C*. Захворіла раптово, після переохолодження. Живіт м'який, болючий в лівій половині. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Визначить імовірний діагноз:
A *Гострий пієлонефрит

B Гострий панкреатит
C Сечокам'яна хвороба
D Гострий гломерулонефрит
E Гострий коліт

29Чоловік протягом останніх 2-3 років скаржиться на слабкість, сонливість, мерзлякуватість, апатію, погіршення пам'яті, збільшення ваги, постійні закрепи. Хворий адинамічний, шкіра бліда, холодна, суха, волосся рідке. Щитоподібна залоза не збільшена. Рівень ТТГ, Т3, Т4 в крові знижений. Які лікарські засоби буде призначено хворому для проведення замісної терапії?
A *L-тироксин, трийодтиронін
B Строфантин, кордіамін
C Мерказоліл, панангін
D Поліглюкін, ізотонічний розчин натрію хлориду
E Гідрокортизон, преднізолон

30У хворого 53-х років після психічного перенапруження, виник напад пекучого болю у ділянці серця, який віддає у нижню щелепу зліва, ліву лопатку, руку. Після прийому нітрогліцерину з'явились побічні явища. Який побічний ефект найчастіше викликає нітрогліцерин?
A *Головний біль
B Алергічну реакцію
C Тахікардію
D Брадикардію
E Порушення ритму серця

31У хворого, який страждає на виразкову хворобу шлунка, з'явилися кинджальний біль у верхній половині живота, різка слабкість. Стан хворого середньої тяжкості, ноги притягнуті до живота. Шкіра і видимі слизові бліді, вологі. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт напружений, не бере участі у диханні, різко болючий у верхній половині. Яке ускладнення виникло?
A *Перфорація шлунка
B Шлункова кровотеча
C Пенетрація шлунка
D Кровотеча з вен стравоходу
E Кровотеча з гемороїдальних вен

32Пацієнт без свідомості. Шкіра бліда, суха, дихання Куссмауля, в повітрі відчувається запах ацетону. Очні яблука м'які, рефлекси відсутні. Родичі хворого розповіли, що страждає на цукровий діабет. Що трапилось з хворим?
A *Гіперглікемічна кома
B Запаморочення
C Гіпоглікемічна кома
D Уремічна кома
E Печінкова кома

33Хвора скаржиться на високу температуру, біль в грудній клітці праворуч, кашель із "іржавим" харкотинням. При вислуховуванні легень на бокових

поверхнях праворуч визначається бронхіальне дихання, при перкусії - різко притулений звук. На рентгенограмі легенів - ознаки плевропневмонії. Її турбує наявність болю у грудній клітці. Чим зумовлений біль у грудній клітці?
A *Ураженням плеври
B Обструкцією бронхіального дерева
C Ураженням альвеол
D Підвищенням тиску в малому колі кровообігу під час кашлю
E -

34Пацієнтка скаржиться на запаморочення, задишку, серцебиття, ламкість нігтів і випадання волосся. Відзначає спотворення смаку: любить їсти крейду. Шкіра бліда, суха, злущується. В аналізі крові - ознаки анемії. Що треба визначити для уточнення виду анемії?
A *Рівень заліза сироватки крові
B Час згортання крові
C Лейкоцитарну формулу
D Осмотичну резистентность еритроцитів
E Кількість ретикулоцитів

35Пацієнт, хворий на ревматичну хворобу звернувся до ревматолога за поясненням - яким препаратом слід проводити сезонну профілактику загострення захворювання. Який лікарський засіб для цього застосовується?
A *Біцилін-5
B Бензилпеніцилін
C Аспірин
D Цефазолін
E Ампіокс

36Хворий звернувся зі скаргами на біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, що виникає щодня під час підйому на 2-3 поверх. Хворіє протягом 2-х років. Діяльність серця ритмічна. АТ- 140/90 мм рт.ст., ЧСС- 90/хв. Які препарати призначають для зменшення больового синдрому?
A *Нітрати
B Інгібітори АПФ
C Пероральні антикоагулянти
D Статини
E Седативні препарати

37Пацієнтку 25-ти років турбують біль у ділянці серця, серцебиття, підвищення температури тіла, біль у колінних суглобах. В анамнезі часті ангіни. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці серця, колінні суглоби болісні, припухлі, гарячі на дотик, функція їх порушена. За допомогою яких препаратів здійснюється етіотропна терапія даної пацієнтки?
A *Антибіотиків
B Препаратів, що покращують метаболічні процеси в міокарді
C Глюкокортикостероїдних препаратів
D Нестероїдних протизапальних препаратів
E Серцевих глікозидів

38У пацієнта 35-ти років з цукровим діабетом, виникла гіперглікемічна кома. При наданні невідкладної допомоги необхідно ввести?
A *Інсулін
B Атропін
C Глюкозу
D Дибазол
E Метазон

39У пацієнта 70-ти років виник нестерпний пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, відчуття страху смерті. Біль триває 40 хвилин. Не знявся після прийому нітрогліцерину. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:
A *Інфарк міокарда
B Набряк легень
C Стенокардія
D Серцева астма
E Міокардит

40До вас звернувся пацієнт 54 роки, у якого після отримання неприємного повідомлення, з'явився стискаючий біль за грудиною, з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Вкажіть препарат з якого в першу чергу надають невідкладну допомогу:
A *Нітрогліцерин
B Но-шпа
C Фуросемід
D Аспірин
E Гепарин

41Пацієнт хворіє декілька років сечокам'янаю хворобою. Після тряскої їзди з'явився раптовий біль в правій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Ниркова колька
B Хронічний пієлонефрит
C Хронічний гломерулонефрит
D Хронічний цистит
E Хронічний панкреатит

42Який дієтичний стіл призначають хворим з захворюваннями нирок?
A *Стіл №7
B Стіл №5
C Стіл №10
D Стіл №2
E Стіл №9

43Пацієнтка 19-ти років зі скаргами на біль в поперековій ділянці справа, часте сечовиділення, підвищення температури тіла до 39,5°*C*. Захворіла гостро після купання в річці. Яке захворювання можна запідозрити у хворої?
A *Гострий пієлонефрит
B Хронічний пієлонефрит
C Гострий цистит

D Сечокам'яна хвороба
E Ниркова колька

44Хворий, 68-ми років скаржиться на кровохаркання впродовж тривалого часу. Для якого захворювання найбільш вірогідний такий стан?
A *Рак легень
B Хронічний бронхіт
C Плеврит
D Крупозна пневмонія
E Пневмосклероз

45При лабораторному обстеженні харкотиння у хворого виявили спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A *Бронхіальна астма
B Гострий бронхіт
C Хронічний бронхіт
D Абсцес легень
E Плевропневмонія

46Хворий, 47-ми років звернувся зі скаргами на збільшення живота в розмірах, загальну слабкість, нудоту, нестійкі випорожнення. Хворіє протягом 2-х років. При огляді шкіри: шкірні покриви та видимі слизові жовтяничні, на шкірі обличчя та спини "судинні зірочки", живіт значно збільшений в розмірах, навколо пупка венозна сітка у вигляді "медузи". Про яке захворювання можна подумати?
A *Цироз печінки
B Хронічний гепатит
C Хронічний панкреатит
D Хронічний холецистит
E Жовчнокам'яна хвороба

47У хворого з виразковою хворобою шлунка блювання кавовою гущею та дьогтеподібні випорожнення. Для якого ускладнення це характерно?
A *Кровотечі з виразки
B Пенетрації виразки
C Перфорації виразки
D Пілоростенозу
E Малігнізації виразки

48У пацієнта гострий початок хвороби, біль у грудній клітці, виражена лихоманка, кашель з виділенням "ржавого" харкотиння, крепітація і бронхіальне дихання під час аускультації. Яке захворювання можна запідозріти?
A *Пневмонія
B Бронхіальна астма
C Хронічний бронхіт
D Абсцес легень
E Туберкульоз

49У хворого ревматична хвороба. Назвіть етіологічний чинник:

A *Бета-гемолітичний стрептокок групи А
B Стафілокок
C Паличка Коха
D Менінгокок
E Паличка Пфейфера

50Пацієнт 33 роки скаржиться на напади ядухи з утрудненим видихом. Наприкінці нападу тяжко відходить невелика кількість склоподібного мокротиння. Для якого захворювання це характерно?
A *Бронхіальна астма
B Туберкульоз легенів
C Гострий бронхіт
D Серцева астма
E Пневмонія

51У пацієнта гострий інфаркт міокарда. Який вид траспортування необхідно застосувати?
A *Спеціалізованою бригадою швидкої медичної допомоги на ношах
B Направити в плановому порядку
C Попутнім транспортом
D Міським транспортом
E Транспортною бригадою швидкої допомоги на ношах

52До ФАПу звернулась жінка 50-ти років, яка скаржиться на різкий біль за грудиною, що іррадіює у ліву руку. Напад триває більше 30 хвилин, застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Що можна запідозрити у хворої?
A *Інфаркт міокарда
B Гіпертонічний криз
C Напад стенокардії
D Серцева астма
E Вада серця

53У пацієнта з виразковою хворобою шлунка виникла перфорація. Назвіть характер болю у випадку даного ускладнення:
A *“Кинжальний”
B Ниючий
C Тиснучий
D Пекучий
E Оперізуючий

54Хвора 37-ми років звернулась зі скаргами на біль у правому підребер’ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювоту. Позитивний симптом Ортнера та Мерфі. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Гострий холецистит
B Хронічний панкреатит
C Гострий гастрит
D Сечокам’яна хвороба
E Гострий панкреатит

55Пацієнт з цукровим діабетом знаходиться на стаціонарному лікуванні. Яку дієту потрібно йому призначити?
A *Дієта №9
B Дієта №5
C Дієта №7
D Дієта №1
E Дієта №10

56 Хвора скаржиться на сонливість, загальмованість, мерзлякуватість, охриплий голос. Об'єктивно: брадикардія, набрякле обличчя з товстими губами, звужені очні щілини. Яке захворювання можна запідозрювати?
A *Гіпотиреоз
B Хронічний гломерулонефрит
C Гіпертиреоз
D Гіпертонічна хвороба
E Ендемічний зоб

57У хворої залізодефіцитна анемія. Які препарати застосовують для її лікування?
A *Ферумлек
B Гепарін
C Фурадонін
D Ампіокс
E Фуразолідон

58Хворій з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у неї з'явилися відчуття жару, блідість, утруднене дихання, пульс ниткоподібний, АТ- 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?
A *Анафілактичний шок
B Набряк Квінке
C Набряк легенів
D Колапс
E Серцева астма

59У пацієнтки на тлі гострого інфаркту міокарда з'явились кашель з виділенням пінистого харкотиння, клекочуче дихання. Яке ускладнення виникло?
A *Набряк легенів
B Напад бронхіальної астми
C Набряк Квінке
D Миготлива аритмія
E Кардіогенний шок

60У хворої годину тому раптово виник сильний пекучий біль за грудиною, який віддає в ліву руку та триває 35 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно: тони серця ослаблені, аритмічні, ЧСС- 110/хв., Який патологічний стан виник у хворої?
A *Гострий інфаркт міокарда
B Міокардит
C Мітральний стеноз
D Ревматична хвороба

E -

61У хворої на гострий інфаркт міокарду на фоні посилення больового синдрому з'явилась різка блідість шкіри, акроціаноз, АТ знизився до 80/40 мм рт.ст. Про розвиток якого ускладнення можна думати?
A *Кардіогенний шок
B Серцева астма
C Набряк легенів
D Непритомність
E Синдром Дресслера

62Хвора лікується в гематологічному відділенні з приводу лімфогранулематозу. До якого інструментального дослідження слід підготувати хвору?
A *Пункції лімфатичного вузла
B Люмбальної пункції
C Абдомінальної пункції
D Стернальної пункції
E Плевральної пункції

63У пацієнтки діагностований напад ниркової кольки. Який комплекс невідкладної допомоги слід застосувати?
A *Баралгін, папаверин
B Сульфат магнію, еуфілін
C Еуфілін, лазикс,
D Нітрогліцерин, но-шпа
E Лазикс, платифілін

64 У пацієнтки вперше виникли набряки під очима, підвищився артеріальний тиск та при дослідженні сечі виявлена гематурія та протеїнурія. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Гострий гломерулонефрит
B Хронічний пієлонефрит
C Гострий пієлонефрит
D Хронічний гломерулонефрит
E -

65У хворого хронічний панкреатит. Виберіть препарат замісної терапії:
A *Фестал
B Контрикал
C Холензим
D Но-шпу
E Папаверин

66У пацієнтки скарги на дратівливість, порушення сну, тремор кінцівок, серцебиття. Схудла на 6 кг. Об'єктивно: шкіра волога тепла; шия потовщена, збільшена щитоподібна залоза. Ps- 96/хв., АТ- 160/80 мм рт.ст. Для якого захворювання характерна ця симптоматика?
A *Дифузний токсичний зоб
B Цукровий діабет

C Гіпотиреоз
D Нецукровий діабет
E -

67У хворої підозрівають гіпотиреоз. Які лабораторні методи дослідження слід провести?
A *Визначення рівня гормонів Т3, Т4 в крові
B Визначення амілази сечі, амілази крові
C Визначення рівня глюкози в крові
D Аналіз сечі за методом Нечипоренка
E -

68До акушерки ФАПу звернулася жінка, 38-ми років, зі скаргами на головний біль, “мушки” перед очима, відчуття жару, сердцебиття, які виникли після сильного хвилювання. Об’єктивно: пацієнтка схвильована,тремтить. Шкіра обличчя гіперемована. АТ- 180/100 мм рт.ст., Ps- 88/хв. Аускультативно: серцеві тони приглушені, акцент ІІ-го тону над аортою. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гіпертонічна хвороба
B ІХС. Стенокардія напруження
C Миготлива аритмія
D Ревматична лихоманка
E -

69Жінка 44-х років скаржиться на болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку, які виникли після стресу. Об’єктивно: шкіра бліда. АТ- 110/60 мм рт.ст., Ps- 78/хв. Аускультативно: тони серця ритмічні, приглушені. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
A *Електрокардіографія
B УЗД органів черевної порожнини
C Флюорографія ОГК
D Бронхографія
E -

70На ФАП до акушерки звернулася вагітна зі скаргами на висипку із свербіжем,яка з’явилася після вживання апельсину. При огляді виявлено на шкірі верхніх кінцівок, живота дисеміновану уртикарну висипку червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Кропив’янка
B Набряк Квінке
C Анафілактичний шок
D Ревматична лихоманка
E -

71До акушерки на ФАП звернулась вагітна зі скаргами на спрагу, сухість в роті, слабкість.При огляді: жінка помірного харчування, шкіра бліда,суха на дотик. АТ- 130/70 мм рт.ст. Рівень глюкози крові - 9,7 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Цукровий діабет
B Тиреотоксикоз

C Ожиріння
D Гіповітаміноз
E Гіпотиреоз

72Під час взяття крові з вени жінка втратила свідомість. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ- 120/70 мм рт.ст., пульс - 68/хв., ритмічний, задовільних властивостей. Який стан найбільш вірогідно зумовлює таку картину?
A *Непритомність
B Колапс
C Еклампсія
D Геморагічний шок
E Кардіогенний шок

73До акушерки ФАПу звернулась пацієнтка, 38-ми років, зі скаргами на біль в поперековій ділянці, який іррадіює вздовж сечоводу в статеві органи. Який препарат найбільш доцільно застосувати в даному випадку?
A *Ввести баралгін
B Ввести лазикс
C Ввести р-н еуфіліну
D Ввести р-н магнія сульфату
E -

74У хворої 68-ми років, яка лікується з приводу пневмонії, погіршився стан: за дві години температура знизилася з 39,3°*C* до 35,7°*C*, відзначається різка слабкість, блідість шкіри, холодний піт, АТ- 80/50 мм рт.ст. Що стало найбільш вірогідною причиною погіршення стану пацієнтки?
A *Критичне зниження температури тіла
B Обмежене вживання рідини
C Порушення дієти
D Виражена інтоксикація
E Порушення рухового режиму

75При обстеженні у пацієнтки, яка зловживала алкоголем: свербіння шкіри, жовтяниця, судинні зірочки, асцит. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Цироз печінки
B Гепатит
C Хронічний коліт
D Панкреатит
E Холецистит

76Вкажіть хворобу, яка генетично успадковується за рецесивним типом:
A *Гемофілія
B Тромбоцитопенія
C Геморагічній васкуліт
D Лімфолейкоз
E Мієлолейкоз

77У пацієнтки 39-ти років гострий інфаркт міокарда, перший день. Вкажіть, який режим фізичної активності призначите їй:

A *Суворий постільний
B Постільний
C Напівпостільний
D Палатний
E Загальний

78Пацієнтку 23-х років протягом місяця турбує слабкість, кашель, схуднення, пітливість, особливо вночі, субфебрильна температура. Об'єктивно: *t*° - 37,2°*C*, шкіра бліда, АТ- 100/70 мм рт.ст. Дихання ослаблене справа над верхівкою. Тони ритмічні, пульс - 98/хв, ритмічний. Визначте захворювання, яке можна запідозрити:
A *Туберкульоз легенів
B Рак легенів
C Пневмонію
D Бронхіт
E Плеврит

79Пацієнтка 30-ти років, скаржиться на надмірну дратливість, серцебиття, схуднення при підвищеному апетиті. Об'єктивно: витрішкуватість, тремор рук, підвищення систолічного артеріального тиску, позитивний симптом Грефе. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Тиреотоксикоз
B Невроз
C Мікседему
D Гіпертонічну хворобу
E Цукровий діабет

80Жінку 35-ти років вжалила бджола. Розвився анафілактичний шок.Який препарат необхідно зразу ввести?
A *Гідрокортизон
B Кордіамін
C Корглікон
D Анальгін
E Папаверин

81У пацієнтки 47-ми років, відмічається кашель з виділенням великої кількості (300 мл) харкотиння "повним ротом" з неприємним запахом. Про яке захворювання можна подумати?
A *Абсцес легені
B Рак легенів
C Пневмонію
D Бронхіальну астму
E Туберкульоз легенів

82У пацієнтки 25-ти років при лабораторному дослідженні виявлено: загальний аналіз крові - еозинофілія, в харкотинні - спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні ці ознаки?
A *Бронхіальної астми
B Хронічного бронхіту
C Раку легенів

D Пневмонії
E Абсцесу легені

83Пациентка 22-х лет обратилась на ФАП с жалобами на приступы удушья с утрудненным выдохом, которые возникают во время цветения амброзии. Ваш предположительный диагноз:
A *Бронхиальная астма
B Хронический бронхит
C Екссудативный плеврит
D Туберкулёз лёгких
E Внегоспитальная пневмония

84Беременной женщине 25-ти лет, поступившей на лечение в пульмонологическое отделение по поводу внегоспитальной пневмонии, назначено лечение, включающее антибиотик. Что нужно сделать, прежде чем вводить антибактериальный препарат внутримышечно?
A *Провести пробу на чувствительность к антибиотику
B Подсчитать частоту дыхательных движений за 1 минуту
C Измерить АД
D Произвести спирографию
E Информировать больную о возможных побочных действиях

85Пациентка 42-х лет, состоящая на диспансерном учёте по поводу гипертонической болезни в течение 10-ти лет, обратилась на ФАП с жалобами на новые симптомы, которые развились постепенно: одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиение, отёки на ногах. Какое осложнение развилось у больной?
A *Хроническая недостаточность кровообращения
B Острая сердечная недостаточность
C Порок сердца
D Острая сосудистая недостаточность
E Гипертонический криз

86При обследовании у пациентки 30-ти лет выявлена недостаточность митрального клапана. Ранее патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не было. Укажите ведущую причину приобретённых пороков сердца:
A *Ревматическая болезнь
B ИБС. Стенокардия напряжения
C Гипертоническая болезнь
D Хроническая сердечная недостаточность
E Инфаркт миокарда

87Беременная 28-ми лет обратилась к акушерке с жалобами на слабость, головную боль, сердцебиение при физической нагрузке. В анамнезе обильные длительные месячные, с детства употребляет в пищу мел. Объективно: кожа бледная, ногти ломкие. Общий анализ крови: гемоглобин - 60 г/л, цветовой показатель - 0,6, микроцитоз, СОЭ- 18 мм/час. О каком заболевании можно думать?
A *Железодефицитная анемия

B Гипопластическая анемия
C Гемолитическая анемия
D Острая постгеморрагическая анемия
E B_{12}-дефицитная анемия

88Акушерке поручено провести беседу с беременными женщинами по поводу профилактики острого пиелонефрита. На какие элементы профилактики следует обратить внимание женщин?
A *Санация очагов инфекции
B Приём мочегонных трав
C Избегание пребывания на солнце
D Ограничение физической активности
E Профилактический приём витаминов

89Больная 38-ми лет обратилась на ФАП с жалобами на очень сильные боли в левой половине поясницы с иррадиацией в паховую область, отмечает позывы к мочеиспусканию, но мочи выходит незначительное количество. Пациентка возбуждена, симптом Пастернацкого слева резко положительный. Температура тела - 36,5°*С*. Предположительный диагноз:
A *Мочекаменная болезнь.
B Острый пиелонефрит
C Острый гломерулонефрит
D Хронический гломерулонефрит
E -

90У пациента язвенная болезнь желудка. Назовите особенности диетотерапии:
A *Частое, дробное питание, механически, термически и химически щадящая пища
B Разгрузочная диета
C Исключение молочных продуктов из пищевого рациона
D Увеличение количества белка
E Ограничение приема жидкости

91Пациентку беспокоят сердцебиение и одышка при физической нагрузке, отеки нижних конечностей к концу дня. Для какого состояния характерны данные симптомы?
A *Хроническая сердечная недостаточность
B Анафилактический шок
C Острая сердечная недостаточность
D Коллапс
E -

92У пациентки подозрение на туберкулез легких. Какой препарат используют для пробы Манту?
A *Туберкулин
B Вакцина БЦЖ
C Изониазид
D Этамбутол
E Рифампицин

93Пациентке, страдающей ревматической болезнью, назначена вторичная профилактика заболевания. Какой из препаратов Вы используете?
A *Бицилин-5
B Анальгин
C Пенициллин
D Преднизолон
E Ортофен

94Пациентка 40-а лет жалуется на боль сжимающего характера за грудиной с иррадиацией в левую руку. После приема нитроглицерина приступ прекратился. Для какого заболевания характерны эти признаки?
A *Стенокардии
B Инфаркта миокарда
C Порока сердца
D Гипертонической болезни
E Ревматической болезни

95Беременная 14 недель. Поступила в терапевтическое отделение с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, кашель с выделением “ржавой мокроты”, общую слабость, температуру тела - 39°*C*. Заболела 3 дня назад. Заболевание связывает с переохлождением. Перкуторно: притупление легочного звука, аускультативно: крепитация справа под. лопаткой. Какой наиболее вероятный диагноз?
A *Внегоспитальная пневмония
B Госпитальная пневмония
C Рак легких
D Бронхит
E Туберулез легких

96Пациетка 56-ти лет, жалуется на кашель с выделением гнойной мокроты неприятного запаха до 250 мл в сутки, преимущественно утром. Из анамнеза - курит 20 лет. Объективно: пальцы на руках в виде “барабанних палочек”, ногти в виде “часових стекол”. Какое заболевание наиболее вероятно?
A *Бронхоэктатическая болезнь
B Абсцесс легких
C Пневмония
D Хронический бронхит
E Рак легких

97У пациентки на запах краски внезапно возникло удушье. В детстве болела бронхиальной астмой. При аускультации в легких масса сухих свистящих хрипов. Какая неотложная доврачебная помощь необходима в данной ситуации?
A *Ингаляция сальбутамола
B Оксигенотерапия
C Горчичники на грудную клетку
D Горячие ножные ванны
E Банки на грудную клетку

98 Пациентка 58-ми лет, поступила в кардиологическое отделение с жалобами на сжимающую боль за грудиной, иррадиирующую в левое плечо, левую лопатку. Боль длится в течение часа, не снимается нитроглицерином. Объективно: кожа бледная, пульс слабый, частый, АД- 90/60 мм рт.ст. Какое заболевание можно заподозрить у пациентки?
A *Острый инфаркт миокарда
B Отек легких
C Сердечную астму
D Нарушение ритма сердца
E Миокардит

99Пациентка 63-х лет, состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка. Во время профилактического осмотра предъявляет жалобы на быструю утомляемость, выраженную общую слабость, потерю аппетита, отвращение к мясной пище. Объективно: пониженного питания, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Какое осложнение наиболее вероятно возникло у пациентки?
A *Рак желудка
B Желудочное кровотечение
C Пенетрация
D Перфорация
E Стеноз привратника

100У пациетки с алкогольным циррозом печени возникла рвота цвета “кофейной гущи” и кал черного цвета. При осмотре: бледность кожи и слизистых оболочек, слабый, частый пульс. АД- 100/60 мм рт.ст. Какие лекарственные препараты необходимо использовать в данной ситуации?
A *Хлористый кальций
B Пентамин
C Гепарин
D Феррум-лек
E Атропин

101У пациенки 25-ти лет жалобы на повышение температуры тела до 39°*C*, проливной пот, боль в горле. Считает себя больной в течение нескольких месяцев. В полости рта некротические изменения: язвочки (некротическая ангина, стоматит). В общем анализе крови найдены бластные клетки. Какой диагноз наиболее вероятен?
A *Острый лейкоз
B Острая постгеморрагическая анемия
C Гемофилия
D B_{12}-фолиеводефицитная анемия
E Железодефицитная анемия

102Беременная 23-х лет лечится в отделении патологи беременных с диагнозом: “Острый пиелонефрит”. Какие настои трав рекомендуется употреблять пациентке по назначению врача после виписки из стационара?
A *Полевой хвощ
B Мать-мачеха

C Зверобой
D Подорожник
E Чебрец

103Пациентка 27-ми лет, страдающая сахарным диабетом, предъявляет жалобы на головную боль, головокружение, жажду, тошноту. Постепенно появилась сонливость, апатия потеря сознания. При осмотре: кожа сухая, запах ацетона. Выберите препарат для оказания неотложной помощи:
A *Инсулин простой
B Эуфиллин
C 40% раствор глюкозы
D 20% раствор глюкозы
E 4% раствор гидрокарбоната натрия

10450-летняя пациентка предъявляет жалобы на зябкость, общую слабость, сонливость, отечность лица и конечностей. В анамнезе заболевание щитовидной железы. Объективно: кожа сухая, шелушащаяся. АД- 110/70 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены, брадикардия. Какой лекарственный препарат пациентка должна принимать постоянко в качестве профилактики осложнений?
A *L-тироксин
B Мерказолил
C Инсулин
D Нитроглицерин
E Корвалол

105Пацієнт з'явився на прийом до лікаря зі скаргами на підйом *t*° тіла до 38°*C*, підвищену пітливість вночі, сухий кашель, біль у грудях, періодичне кровохаркання. Такі симптоми характерні для:
A *Туберкульозу легенів
B Раку легень
C Плевриту
D Гангрени легень
E Пневмонії

106Пацієнтка 40-ка років, знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом бронхіальна астма. Зненацька в неї виник приступ ядухи. Що в першу чергу необхідно застосувати?
A *Аерозоль з беротеком
B Дихальну гімнастику
C Содові інгаляції
D Масаж грудної клітки
E Кисневу терапію

107У пацієнта, який скаржиться на болі у грудній клітці з правого боку, що посилюються при диханні, встановлено діагноз сухий плеврит. Що визначається аускультативно при об'єктивному обстеженні?
A *Шум тертя плеври
B Крепітація
C Сухі свистячі хрипи

D Вологі хрипи
E Посилення везикулярного дихання

108Пацієнт 47-ми років, в стаціонарі при швидкому підйомі по сходах відчув раптовий стискаючий біль за грудиною, який віддає у ліву руку. Що в першу чергу необхідно зробити?
A *Дати таблетку нітрогліцерину
B Дати таблетку анальгіну
C Дати краплі корвалолу
D Дати таблетку адельфана
E -

109У пацієнта з інфарктом міокарда виник приступ ядухи, кашель з виділенням пінистого рожевого харкотиння. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
A *Набряк легенів
B Кардіогенний шок
C Плеврит
D Пневмонія
E Перикардит

110Пацієнтка 64-х років, скаржиться на головний біль, “миготіння мушок” перед очима, запаморочення, біль у ділянці серця, серцебиття. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, Ps- 95/хв., АТ- 175/100 мм рт.ст. Аускультативно: тони серця звучні, акцент ІІ-го тону над аортою. Який ваш діагноз?
A *Гіпертонічна хвороба
B Ішемічна хвороба серця
C Ревматична хвороба
D Гострий міокардит
E Недостатність мітрального клапану

111Пацієнт скаржиться на періодичні сезонні болі у епігастральній ділянці, які виникають через 15-20 хв. після вживання їжі. При якому захворюванні біль має такий характер?
A *Виразкова хвороба шлунка
B Виразкова хвороба 12-палої кишки
C Дискінезія жовчовивідних шляхів
D Жовчокам’яна хвороба
E Хронічний гепатит
112У пацієнта при обстеженні виявлено: біль у правому підребер’ї, асцит, “голова медузи”, диспепсичні явища. Такий симптомокомплекс характерний для:
A *Портального цирозу печінки
B Хронічного гепатиту
C Жовчокамяної хвороби
D Хронічного холециститу
E Раку шлунка

113Пацієнт 30-ти років, скаржиться на остуду, біль у поперековій ділянці тупого характеру, дизуричні явища, слабість, головний біль. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. У сечі: піурія, протеїнурія, бактеріурія. Ці симптоми

характерні для:
A *Гострого пієлонефриту
B Гострого гломерулонефриту
C Хронічного гломерулонефриту
D Хронічного пієлонефриту
E Сечокам'яної хвороби

114Жінка 48-ми років, скаржиться на слабість, підвищену втомлюваність, задишку, серцебиття, сухість і пекучість язика, відчуття оніміння кінчиків пальців, повзання мурашок. Об'єктивно: шкіра лимонно-жовтяничного відтінку, Ps- 96/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Про яку анемію можна подумати?
A *B_{12}-дефіцитну анемію
B Залізодефіцитну анемію
C Апластичну анемію
D Гемолітичну анемію
E Постгеморагічну анемію

115Пацієнтка 20-ти років, в анамнезі з проявами харчової алергії, поступила на стаціонарне лікування з пневмонією. При введенні антибіотика цефамізину розвинулись ознаки алергічної реакції: загальна слабість, блідість шкіри, головокружіння, утруднене дихання, зниження АТ. Яке ускладнення розвинулось?
A *Анафілактичний шок
B Кардіогенний шок
C Гемотрансфузійний шок
D Больовий шок
E Колапс

116У пацієнтки з бронхіальною астмою виник приступ експіраторної задишки. Виберіть препарат для зняття приступу:
A *Сальбутамол
B Супрастин
C Но-шпа
D Дімедрол
E Кордіамін

117На територіях, де поширений ендемічний зоб, проводиться його профілактика. Який препарат для цього застосовується?
A *Антиструмін
B Мерказоліл
C Тироксин
D Інсулін
E Гідрокортизон

118Пацієнт скаржиться на біль оперізуючого характеру вище пупка, слабкість, блювання. Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A *Панкреатиту
B Хронічного гепатиту
C Виразкової хвороби шлунка
D Цирозу печінки

E Холециститу

119У пацієнтки, 32 роки, після в/м ін'єкції ампіциліну через кілька хвилин з'явилася різка слабість, відчуття стиснення в грудній клітці, жар у тілі, потемніння в очах. Шкіра бліда, вкрита липким холодним потом, пульс ниткоподібний, частий, АТ- 60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?
A *Анафілактичний шок
B Ангіоневротичний набряк
C Кардіогенний шок
D Бронхоспазм
E Набряк легенів

120При дослідженні сечі пацієнтки виявлені бактеріурія, лейкоцитурія, протеїнурія. Для якого захворювання це характерно?
A *Гострого пієлонефриту
B Гострого гломерулонефриту
C Хронічного гломерулонефриту
D Сечокам'яної хвороби
E Гострої ниркової недостатності

121У пацієнта 25-ти років з сечокам'яною хворобою виник сильний приступоподібний біль в поперековій ділянці з іррадіацією в калитку, по ходу сечовода та статеві органи. Виберіть заходи для зняття приступу:
A *Покласти теплу грілку на поперекову ділянку
B Покласти міхур з льодом на живіт
C Дати випити заспокійливі засоби
D Покласти теплу грілку на живіт
E -

122На ФАП звернулася пацієнтка 45-ти років зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, оніміння 4 та 5 пальців лівої руки. Біль виникає після підняття по сходах на 3 поверх. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
A *Стенокардії напруги
B Бронхіальної астми
C Стенокардії спокою
D Гіпертонічної кризи
E Ревматичної хвороби

123Пацієнтка, 32 роки, звернулася на ФАП зі скаргами на ниючий "голодний" біль в епігастральній ділянці, відрижку кислим, печію, схильність до закрепів. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?
A *Виразкової хвороби 12-палої кишки
B Хронічного панкреатиту
C Хронічного холециститу
D Виразкової хвороби шлунка
E Хронічного коліту

124У хворої 45-ти років з виразковим анамнезом під час підняття меблів в квартирі виник "кинжальний" біль в епігастрії, виражена слабкість, блювота. Шкірні

покриви покриті холодним липким потом, АТ- 90/50 мм рт.ст. Для якого стану це характерно?
A *Перфорації виразки шлунка
B Гострого панкреатиту
C Гострого холециститу
D Пенетрації виразки шлунка
E Малігнізації виразки шлунка

125Вагітна жінка 32-х років знаходиться в гастроентерологічному відділенні зі скаргами на гіркоту в роті, ниючий біль в правому підребер'ї, нудоту, здуття живота. В анамнезі: хронічний холецистит. Яка дієта небхідна хворій?
A *Дієта №5
B Дієта №7
C Дієта №10
D Дієта №1а
E Дієта №15

126Пацієнтка 32-х років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5°*C*, біль у поперековій ділянці з обох сторін, часте й болісне сечовипускання. Об'єктивно: шкіра бліда, волога. Пульс - 88/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. В аналізі сечі: сеча мутна, протеїнурія, лейкоцитурія,бактеріурія. Вкажіть захворювання, яке виникло у пацієнтки:
A *Гострий пієлонефрит
B Гострий гломерулонефрит
C Сечокам'яна хвороба
D Хронічна ниркова недостатність
E Хронічний гломерулонефрит

127Пацієнтка 40-а років скаржиться на зниження пам'яті та працездатності, сонливість, випадіння волосся. Об'єктивно: сповільнена мова, голос низький, хриплий, Температура тіла - 35,1°*C*. Набряки локалізовані на обличчі, шиї. Риси обличчя грубі, набряклі повіки, звужені очні щілини, товсті ніс та губи. Пульс - 60/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. Вкажіть захворювання, яке виникло у пацієнтки:
A *Гіпотиреоз
B Тиреотоксикоз
C Ендемічний зоб
D Гломерулонефрит
E Набряк Квінке

128Пацієнтці 52-х років надана невідкладна допомога: холод на надчеревну ділянку, введення вікасолу і дицинону, приймання всередину амінокапронової кислоти, антацидів, адсорбентів. Вкажіть ускладнення, при якому надається така невідкладна допомога:
A *Шлункова кровотеча
B Пілоростеноз
C Малігнізація виразки шлунка
D Пенетрація виразки шлунка
E Перфорація виразки шлунка

129У пацієнтки 45-ти років з жовчнокам'яною хворобою після фізичного навантаження раптово виникли сильний ріжучий біль в проекції жовчного міхура з іррадіацією у праве плече, шию, під праву лопатку, нудота, блювання. Об'єктивно: живіт здутий, при пальпації напруження передньої черевної стінки та болісність м'язів у ділянці правого підребер'я. Назвіть препарат, який застосовують для зняття болю:
A *Баралгін
B Холензим
C Оксафенамід
D Ензистал
E Урсофальк

130У пацієнтки 65-ти років, яка лікується з приводу раку легенів, виник кашель з виділенням пінистої крові світло-червоного забарвлення. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним липким потом. Пульс - 96/хв. АТ- 90/60 мм рт.ст. Назвіть препарат, який необхідно призначити пацієнтці для надання невідкладної допомоги:
A *Хлорид кальцію
B Баралгін
C Еуфілін
D Солутан
E Теофілін

131Пацієнтка 34-х років скаржиться на підвищену збудливість, дратівливість, пітливість, відчуття жару, випадіння волосся, втрату маси тіла до 10 кг. Об'єктивно: екзофтальм, позитивний симптом Грефе. Щитоподібна залоза збільшена. Пульс - 110/хв. Тремор рук. Назвіть тиреостатичний препарат для лікування пацієнтки:
A *Мерказоліл
B Дийодтирозин
C Тиреоїдин
D Трийодтиронін
E Тироксин

132У пацієнтки 22-х років, яка перебуває на диспансерному обліку з приводу ревматичної лихоманки, з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання. Вкажіть препарат, який необхідно призначити для вторинної поточної профілактики ревматизму:
A *Пеніцилін
B Бісептол
C Фуразолідон
D Фталазол
E Нітроксолін

133Пацієнтці 38-ми років, яка перебувала у контакті з хворим на туберкульоз легенів, призначена хіміопрофілактика. Назвіть препарат, який призначають для специфічної профілактики туберкульозу:
A *Ізоніазид

B Стрептоміцин
C Етіонамід
D Етамбутол
E Циклосерин

134Жінка, 52-х років ,знаходиться в приймальному відділенні зі скаргами на гострий біль у ділянці серця тиснучого характеру, який віддає в ліву руку і триває понад 30 хвилин. Зі слів пацієнтки: приймала нітрогліцерин під язик тричі, але біль не вщухав. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Інфаркт міокарда
B Набряк легень
C Стенокардія
D Серцева астма
E Бронхіальна астма

135Пацієнт, 45-ти років, скаржиться на біль стискаючого характеру за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Після прийому нітрогліцерину напад припинився. Для якого захворювання характерні такі ознаки?
A *Стенокардії
B Інфаркту міокарда
C Гіпертонічної хвороби
D Ревматизму
E Вади серця

136У хворої 18-ти років, через два тижні після перенесеної ангіни, раптово виникли скарги на головний біль, набряк обличчя, зменшення виділення і кров'янисте забарвлення сечі. Об'єктивно: температура тіла - 37,4°*C*, шкіра бліда, набряк повік. АТ- 180/100 мм рт.ст. Аналіз сечі: білок - 2 г/л, еритроцити - 100 в полі зору. Про яке захворювання можна подумати?
A *Гострий гломерулонефрит
B Гострий пієлонефрит
C Хронічний гломерулонефрит
D Хронічний пієлонефрит
E Гострий цистит

137Пацієнтка 46-ти років скаржиться на частий головний біль, шум у вухах, інколи - запаморочення, нудоту. Акушерка виявила, що артеріальний тиск при вимірюванні складає 160/100 мм рт.ст. Дані симптоми є характерними для:
A *Артеріальної гіпертензії
B Ішемічної хвороби серця
C Серцевої недостатності
D Судинної недостатності
E Залізодефіцитної анемії

138У чоловіка 32-х років, скарги на кашель з виділенням харкотиння слизового характеру, підвищення температури тіла до 37,3°*C*, слабкість, пітливість. Хворіє 3 дні. Під час перкусії грудної клітки над легенями ясний легеневий звук. При аускультації: жорстке дихання, сухі хрипи. Ro-дослідження легень: паталогічних змін не виявлено. Про яке захворювання можна подумати?

A *Гострий бронхіт
B Хронічний бронхіт
C Бронхіальна астма
D Сухий плеврит
E Пневмонія

139У хворої 30-ти років періодично повторюються напади експіраторної задишки. Під час мікроскопічного дослідження в харкотинні виявлені спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Про яке захворювання можна подумати?
A *Бронхіальну астму
B Гострий бронхіт
C Хронічний бронхіт
D Рак легенів
E Ексудативний плеврит

140Пацієнт скаржиться на тупий біль в поперековій ділянці справа, болючість під час сечовипускання, гарячку, загальну слабкість. Об'єктивно: температура тіла - 38,8°*C*; симптом Пастернацького позитивний справа. Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A *Пієлонефриту
B Гломерулонефриту
C Циститу
D Холециститу
E Сечокам'яної хвороби

141Хвора 35-ти років скаржиться на сильний біль у правому підребер'ї, що іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту і блювання. Об'єктивно: живіт здутий, пальпаторно - напруженість передньої черевної стінки в ділянці правого підребер'я. Позитивний симптом Ортнера. УЗД - наявність конкрементів в жовчному міхурі. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?
A *Жовчнокам'яної хвороби
B Гострого холециститу
C Виразкової хвороби 12-палої кишки
D Гострого панкреатиту
E Гострого гастриту

142У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Який препарат необхідно використати для обколювання місця введення ліків при наданні невідкладної допомоги?
A *Адреналін
B Анальгін
C Дібазол
D Но-шпу
E Дицинон

143Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, гіпертонус м'язів. АТ- 120/80 мм рт.ст. Яке

ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперосмолярна кома
C Молочнокисла кома
D Гіперглікемічна кома
E Церебральна кома

144У пацієнтки 40-а років, виникли інтенсивний біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Позитивні симптоми Ортнера, Мерфі. Про яке захворювання свідчать дані ознаки?
A *Гострий холецистит
B Сечокам'яну хворобу
C Гострий панкреатит
D Виразкову хворобу шлунка
E Виразкову хворобу 12-палої кишки

145У хворої на бронхіальну астму почався сухий кашель, виникла гостра нестача повітря, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути на віддалі. Які препарати використаєте для надання невідкладної допомоги?
A *10 мл 2,4% розчину еуфіліну
B 1 мл 0,05% розчину строфантину
C 1 мл 0,06% розчину корглікону
D 4 мл 1% розчину дибазолу
E 10 мл 40% розчину глюкози

146У пацієнтки 43-х років з гіпертонічною хворобою виник сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння "мушок" перед очима, АТ- 195/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат використаєте для надання невідкладної допомоги?
A *25% розчину магнію сульфату
B 0,05% розчину строфантину
C 3% розчину преднізолону
D 1% розчину мезатону
E 1% розчину димедролу

147На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на напад сильного головного болю, серцебиття, нудоту, блювання. Гіперемія шкіри обличчя, тремтіння всього тіла. Ps- 100/хв., АТ- 240/120 мм рт.ст., межі серця розширені, тони ослаблені, акцент II-го тону над аортою. Вкажіть, яке ускладнення виникло:
A *Гіпертензивна криза
B Серцева астма
C Набряк легень
D Гостра судинна недостатність
E -

148У хворої, 50-ти років, раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює на внутрішню поверхню стегна і в статеві органи, біль при сечовипусканні. Дані симптоми, характерні для:
A *Ниркової кольки

B Печінкової кольки
C Гострого апендициту
D Гострого холециститу
E Гострого панкреатиту

149На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на слабкість, пітливість вночі, сухий кашель, t° - 37,4-37,6°*C*. Хворіє 4 тиждні. В анамнезі - контакт із хворим на туберкульоз легенів. На яке дослідження Ви направите пацієнтку в першу чергу?
A *Рентгенологічне дослідження легенів
B Спірометрію
C Загальний аналіз крові
D Біохімічний аналіз крові
E Електрокардіографію

150До Вас звернулась пацієнтка зі скаргами на задишку з утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною. При огляді грудна клітка у положенні максимального вдиху, жінці важко відповідати на запитання. При перкусії над грудною кліткою визначається коробковий звук, аускультативно - дихання послаблене, сухі розсіяні свистячі хрипи. Ваш діагноз:
A *Бронхіальна астма
B Гострий бронхіт
C Пневмонія
D Серцева астма
E Стенокардія

151Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернулась пацієнтка 48-ми років, яка протягом 15-ти років хворіє жовчнокам'яною хворобою. Який метод дослідження підтверджує дане захворювання?
A *УЗД органів черевної порожнини
B Дуоденальне зондування
C Шлункове зондування
D Колоноскопія
E Іригоскопія

152У пацієнта з інфарктом міокарда з'явилися ознаки гострої лівошлуночкової недостатності. Яке положення тіла слід надати пацієнту?
A *Сидяче з опущеними ногами
B Горизонтальне
C Горизонтальне з припіднятими нижніми кінцівками
D Горизонтальне на правому боці
E Горизонтальне на лівому боці

153У терапевтичному відділенні знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого відділяється мокротиння у великій кількості. Яке положення необхідно надати хворому для поліпшення виділення мокротиння?
A *Дренажне
B Вимушене
C Горизонтальне
D Пасивне

E -

154У хворого задишка при фізичному навантаженні, серцебиття. При обстеженні: акроціаноз, над легенями вологі хрипи, діяльність серця аритмічна, тони послаблені, пульс - 100/хв., АТ- 170/95 мм рт.ст. Який патологічний стан у хворого?
A *Хронічна серцева недостатність
B Серцева астма
C Набряк легенів
D Непритомність
E Колапс

155У хворого раптово виникли: блювання “кавовою гущею”, блідість. АТ- 90/70 мм рт.ст., холодний липкий піт. Який попередній діагноз?
A *Шлункова кровотеча
B Проривна виразка
C Пенетрація
D Малігнізація
E Стеноз воротаря

156Ви проводите санітарно-освітню бесіду з питань онкології серед населення. Яке з питань найбільш актуальне для профілактики раку легенів?
A *Боротьба з курінням
B Раціональне харчування
C Боротьба з ожирінням
D Боротьба з гіподинамією
E Запобігання алергії

157До Вас на ФАП звернулася пацієнтка, яку непокоїть важкість у правому підребір’ї, втомлюваність. При об’єктивному обстеженні виявили жовтяницю, на шкірі “судинні зірочки”, гепатомегалію. Вкажіть попередній діагноз:
A *Цироз печінки
B Хронічний гепатит
C Хронічний панкреатит
D Хронічний холецистит
E Хронічний гастрит

158Ви - акушерка ФАПу надаєте допомогу вагітній 35-ти років, яка страждає на гіпертонічну хворобу. Вкажіть препарат, який слід ввести вагітній жінці при гіпертонічній кризі:
A *Розчин сульфату магнію
B Розчин аміназіну
C Розчин строфантину К
D Розчин еуфіліну
E Розчин атропіну сульфату

159До вас на ФАП звернулася пацієнтка 52-х років зі скаргами на кашель з кровохарканням. Для надання невідкладної допомоги необхідно використати:
A *Міхур з льодом
B Грілку

C Гірчичники
D Банки
E Кишеньковий інгалятор

160Ви - акушерка ФАПу. До вас звернулась вагітна жінка 25-ти років яка страждає на залізодефіцитну анемію. Дайте пораду, які продукти повинні обов'язково входити в раціон вагітної з анемією:
A *М'ясо, риба
B Фрукти, морозиво
C Солодощі, копчене
D Молочні, бобові
E Пшеничні висівки, чай

161Під час обстеження пацієнтки запідозрено розвиток сухого плевриту. Яка аускультативна ознака підтвердить його діагноз?
A *Шум тертя листків плеври
B Крепітація
C Амфоричне дихання
D Бронхіальне дихання
E Сухі хрипи
162У пацієнтки 27-ми років напад бронхіальної астми триває вже протягом доби і не купірується еуфіліном і платифіліном, які раніше були ефективними. Яке найбільш вірогідне ускладнення розвинулось у пацієнтки?
A *Астматичний статус
B Гостра судинна недостатність
C Гостра дихальна недостатність
D Гостра серцева недостатність
E -

163У пацієнтки з пневмонією, на фоні лікування антибіотиками розвинулась криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40,3°*C* до 36,2°*C*. При цьому самопочуття погіршилось; пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржиться на слабкість, потемніння в очах, АТ- 70/40 мм рт.ст., Р-ниткоподібний - 100/хв. Яке ускладнення найбільш вірогідне в даному випадку?
A *Колапс
B Непритомність
C Кардіогенний шок
D Гостра серцева недостатність
E -

164Жінці 36-ти років, що знаходиться на диспансерному обліку, проводиться цілорічна профілактика ревматизму. "Біцилін-5" їй треба вводити внутрішньом'язово:
A *1 раз на місяць по 1,5 млн. ОД
B 2 рази на місяць по 1 млн. ОД
C 3 рази на місяць по 600 тис. ОД
D 1 раз на тиждень по 500 тис. ОД
E 2 раз на тиждень по 300 тис. ОД

165Акушерку покликали до вагітної жінки, яка в задушливому приміщенні знепритомніла. Надайте долікарську допомогу:
A *Укласти горизонтально з припіднятими ногами
B Укласти горизонтально з припіднятою головою
C Накласти джгути на кінцівки
D Зробити штучне дихання
E Зробити непрямий масаж серця

166Пацієнтку 56-ти років, турбує головний біль в ділянці потилиці, нудоту. Об'єктивно: гіперемія обличчя, ЧД- 20/хв., Ps- 98/хв., ритмічний, АТ- 200/105 мм рт.ст. З чого почати невідкладну допомогу?
A *Клофеліну
B Анальгіну
C Нітрогліцерину
D Кордіаміну
E Строфантину

167Робітниця фабрики зі скаргами на нудоту, блювання, болі переймистого характеру в животі, слабкість. Стан погіршився через 3 години після обіду у фабричній їдальні. Надайте невідкладну долікарську допомогу:
A *Промити шлунок
B Викликати швидку допомогу
C Відправити додому
D Зробити ін'єкцію лазіксу
E Міхур з льодом на ділянку епігастрія

168Хвороий 43-х років, який 7-ми років хворіє на виразкову хворобу шлунка. Щорічно виникають рецидиви. Консервативне лікування не ефективне. Втрачає масу тіла. Скарги на стискаючий біль в епігастральній ділянці після їди, постійну нудоту, відрижку тухлим, часте блювання неперетравленою їжею. Яке ускладнення виразкової хвороби?
A *Пілоростеноз
B Перфорація
C Пенетрація
D Малігнізація
E -

169Пацієнт 38-ми років, скаржиться на блювання, блювотні маси у вигляді "кавової гущі". Хворий кволий, блідий, вкритий холодним потом. З анамнезу відомо, що восени і навесні періодично з'являються болі в епігастральній ділянці тісно пов'язані з вживанням їжі. Ваш найбільш вірогідний діагноз:
A *Виразкова хвороба шлунка ускладнена кровотечею
B Виразкова хвороба шлунка ускладнена перфорацією
C Хронічний холецистит
D Хронічний гастрит
E Рак шлунка, ускладнений кровотечею

170У вагітної жінки з'явились скарги на зниження працездатності, запаморочення,

задишку, печію та біль в язиці, біль в ногах. Об'єктивно: блідо-рожевий колір шкіри, "лакований" язик з атрофією сосочків. Чим ви порадите жінці збагатити раціон?
A *Печінкою
B Макаронними виробами
C Смородиною
D Молочними продуктами
E Солодощами

171Пацієнтці, хворій на інсулінозалежний цукровий діабет, було введено інсулін. Через деякий час вона втратила свідомість, посилилось потовиділення, з'явились судоми. Яка кома виникла у пацієнтки?
A *Гіпоглікемічна
B Гіперглікемічна
C Кетоацидотична
D Гіперосмолярна
E Тиреоїдна
172На ФАП звернулась вагітна, яка 4 роки тому прооперована з приводу дифузного токсичного зобу. Скаржиться на загальну слабкість, сонливість, погіршення пам'яті, мерзлякуватість. При обстеженні: обличчя набрякле, очні щілини звужені, шкіра на дотик суха, холодна, волосся рідке, щитоподібна залоза не пальпується. Який ймовірний діагноз в даному випадку?
A *Гіпотиреоз
B Дифузний токсичний зоб
C Хвороба Аддісона
D Цукровий діабет
E Хронічний пієлонефрит

173Ви акушерка ФАПу. Через два тижні після перенесеної ангіни до вас звернулася пацієнтка із скаргами на ранкові набряки обличчя, головний біль розпираючого характеру. Сеча кольору "м'ясних помиїв", підвищення АТ до 170/100 мм рт.ст. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:
A *Гострий дифузний гломерулонефрит
B Артеріальна гіпертензія
C Гострий пієлонефрит
D Сечокам'яна хвороба
E Хронічний пієлонефрит

174На ФАП звернулася вагітна, терміном вагітності 22 тижнів, протягом двох днів турбує підвищена температура тіла до 37,2°*C* та сухий кашель. Вкажіть ймовірний діагноз:
A *Гострий бронхіт
B Хронічний бронхіт
C Пневмонія
D Бронхіальна астма
E Плеврит

175До акушерки звернулась жінка 36-ти років, яка скаржиться на серцебиття, дратівливість, поганий сон, пітливість. Об'єктивно: пацієнтка робить багато зайвих рухів, мова швидка, очі блищать, екзофтальм, руки тремтять. Щитоподібна залоза

збільшена. Пульс - 120/хв., АТ- 150/70 мм рт.ст. Найімовірніший попередній діагноз:
A *Дифузний токсичний зоб
B Ендемічний зоб
C Цукровий діабет
D Гіпертонічна хвороба
E Гіпотиреоз

176До акушерки звернулась жінка 57-ми років, яка скаржиться на спрагу, сухість в роті, часте сечовиділення, схуднення. Хворіє майже рік. Об'єктивно: зріст - 160 см, маса тіла - 88 кг. Шкіра суха. Пульс - 74/хв., АТ- 150/80 мм рт.ст. Глюкоза у крові - 9,6 ммоль/л. Найімовірніший попередній діагноз:
A *Цукровий діабет
B Ендемічний зоб
C Гіпертонічна хвороба
D Мікседема
E Тиреотоксикоз

177До акушерки звернулась жінка 28-ми років, яка скаржиться на загальну слабкість, кровотечі з ясен, крововиливи на шкірі. Хворіє 8 років. Об'єктивно: шкіра бліда. На шкірі грудної клітки крововиливи різного розміру та кольору (темно-червоного, синього, зеленого, жовтого). Лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не збільшена. Найімовірніший попередній діагноз?
A *Тромбоцитопенічна пурпура
B Гемофілія
C Геморагічний васкуліт
D Хронічний лімфолейкоз
E Хронічний мієлолейкоз

178Хвора 31 рік, звернулась до ФАПу зі скаргами на сильний біль в лівій половині попереку з іррадіацією в пахову ділянку, відмічає часті позиви до сечовипускання. Хвора збуджена, симптом Пастернацього зліва різко позитивний. Який стан розвинувся у пацієнтки?
A *Ниркова колька
B Гострий пієлонефрит
C Гострий гломерулонефрит
D Хронічний пієлонефрит
E Хронічний гломерулонефрит

179Ви акушерка, берете участь у лікуванні пацієнтки на хронічний ентероколіт. Який дієтичний стіл Ви будете рекомендувати пацієнтці із кишковими розладами?
A *Стіл №4
B Стіл №1
C Стіл №5
D Стіл №7
E Стіл №11

180В стаціонар поступила жінка з інтенсивним оперізуючим болем у надчеревній ділянці, нудотою, блюванням. Погіршення стану пов'язує з вживанням алкоголю

та жирної, гострої їжі. В аналізі сечі підвищена діастаза. Який препарат ви підготуєте за призначенням лікаря?
A *Контрикал
B Сульфат магнію
C Альмагель
D Лазикс
E Ціанокобаламін

Загальний догляд за хворими

1У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Вкажіть, яка дієта доцільна при даній патології:
A *7
B 10
C 11
D 9
E 8

2Вкажіть,який із методів дослідження не відноситься до ендоскопічних:
A *Іригоскопія
B Цистоскопія
C Бронхоскопія
D Ректороманоскопія
E Колоноскопія

3До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Вкажіть, який документ повинна заповнити акушерка:
A *Медична картка стаціонарного хворого
B Історія пологів
C Обмінна карта вагітності
D Статистичний талон
E Листок лікарських призначень

4Акушерка проводить туалет зовнішніх статевих органів породіллі за допомогою (корнцанга із серветкою). Вкажіть, який із антисептичних розчинів вона використає:
A *Розчин калію перманганату 1:10000
B 40% етилового спирту
C 3% розчин пероксиду водню
D Перевареною водою
E Дистильованю водою

5Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію повітряним методом:
A *180° - 60 хв.

B 180º - 30 хв.
C 160º - 130 хв.
D 180º - 45 хв.
E 160º - 60 хв.

6У породіллі протягом тижня відмічались добові коливання температури в межах 4-5°*C*. Визначте тип гарячки:
A *Гектична
B Постійна
C Хвилеподібна
D Поворотна
E Інтермітуюча
7У приймальне відділення поступила вагітна з педикульозом. Вкажіть, який протипедикульозний засіб ви застосуєте:
A *Механічний метод
B Карбофос
C Мильно-сольвентова емульсія
D Сірчана мазь
E Оцтова кислота

8Після введненя антибіотика у пацієнтки відмічається свербіж, почервоніння, набряк в місці ін'єкції. Вкажіть, який стан виник в пацієнтки:
A *Алергічна реакція
B Медикаминтозна емболія
C Інфільтрат
D Некроз тканин
E Пірогенна реакція

9В пацієнтки, яка знаходиться на ліжковому режимі, спостерігається стійка гіперемія та часткове відшарування шкіри попереково-крижової ділянки. Дайте оцінку пролежня:
A *II-й ступінь
B I-й ступінь
C V-й ступінь
D IV-й ступінь
E III-й ступінь

10За наявності в пацієнтки алергічних реакцій для стимуляції секреції шлунка необхідно призначити такий засіб:
A *Пентагастрин
B Дімедрол
C Гістамін
D Кофеїн
E Магнію сульфат

11Акушерка жіночої консультації роз'яснює жінці правила вимірювання базальної температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?
A *3-4 см
B 5-6 см

C 7-8 см
D 1-2 см
E 4-5 см

12В пологовому будинку знаходиться жінка після кесарського розтину на ліжковому режимі. Одягати сорочку пацієнтці треба в такій послідовності:
A *Одягати спочатку на руки, потім на голову
B Одягати спочатку на голову, потім на руки
C По бажанню пацієнтки
D Як зручніше медперсоналу
E Одночасне одягання рук і голови

13В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі?
A *Міхур з льодом
B Холодний компрес
C Холодну примочку
D Грілку
E Сухе тепло

14Породіллі акушерка приклала на живіт міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?
A *Через 20-30 хв.
B Через 10-15 хв.
C Через годину
D Доти, поки не розтане лід
E Через 5-10 хв.

15У породіллі, 25-ти років, після кесарського розтину виникла затримка сечі понад 6 годин. Які заходи слід застосувати в першу чергу?
A *Рефлекторно викликати акт сечовиділення
B Промити сечовий міхур
C Ввести лікарські засоби у сечовий міхур
D Поставити гірчичники на гомілки
E Поставити холодний компрес на гомілки

16Ви акушерка ФАПу, вночі Вас покликали до пацієнтки з бронхіальною астмою у якої виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Об’єктивно: положення сидяче, опираючись руками на стілець. Вкажіть шлях введення 5 мл 2% розчину еуфіліну:
A *Внутрішньовенно
B Внутрішньом’язово
C Внутрішньоартеріально
D Підшкірно
E Внутрішньошкірно

17Акушерка жіночої консультації пояснює вагітній жінці, що після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вона повинна зібрати середню порцію сечі в чисту, суху банку. Вкажіть метод дослідження сечі:

A *За методом Нечипоренко
B Сеча на цукор
C Сеча на діастазу
D За методом Зимницького
E За методом Амбурже

18Пацієнтці, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу “загрози переривання вагітності”, лікар призначив дослідження сечі за методом Зимницького. Вкажіть мету даного дослідження:
A *Дослідження видільної і концентраційної функції нирок
B Визначення кількості форменних елементів в осаді сечі
C Визначення амілази
D Визначення цукру в сечі
E Визначення добового діурезу

19Породіллі з цукровим діабетом призначено введення 20 ОД інсуліну. У вас флакони по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл?
A *0,2 мл
B 0,5 мл
C 0,4 мл
D 1 мл
E 2 мл

20Ви акушерка гінекологічного відділення. Хворій 45-ти років після операції з приводу фіброміоми матки призначено підшкірне введення 1 мл 1% розчину промедолу. В якому документі реєструється введення призначеного препарату?
A *Журналі обліку наркотичних засобів
B Журналі передачі чергування
C Стаціонарному журналі
D Медичній карті стаціонарного хворого
E Журналі поступаючих хворих

21У породіллі, в післяопераційному періоді виник закреп. Лікар призначив пацієнтці олійну клізму. Вкажіть кількість олійного розчину та температуру:
A *150-200 мл, 37-38°*C*
B 50-100 мл, 40-42°*C*
C 100-150 мл, 30-35°*C*
D 150 мл, 34-35°*C*
E 500 мл, 20-30°*C*

22Породілля не може здійснити акт сечовиділення протягом 12-ти годин. Рефлекторні дії не дали бажаного єфекту. Яку першочергову допомогу необхідно надати жінці?
A *Здійснити катетеризацію сечового міхура
B Покласти грілку на низ живота
C Дати тепле питво
D Ввести постійний катетер
E Ввести спазмолітики

23Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно застосувати для проведення обробки?
A *0,25% емульсія декрезилу
B Шампунь “Педикулін”
C Лосьйон “Ланцид”
D Оцтова кислота
E 0,15% емульсія карбофосу

24Під час приймання пологів в око акушерці потрапила навколоплідна вода. Які подальші дії акушерки?
A *Промити око проточною водою
B Закрапати око розчином борної кислоти
C Промити око дистильованою водою
D Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату
E Закрапати око відваром ромашки

25Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Вкажіть, протягом якого часу зберігається стерильність матеріалу в даному біксі?
A *6 годин
B 10 годин
C 12 годин
D 24 години
E 48 годин

26Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Вкажіть, який інструмент повинна підготувати акушерка:
A *Корнцанг
B Голкоутримувач
C Затискач Кохера
D Цапки для білизни
E Жолобоподібний зонд

27Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних термометрів. Вкажіть, який дезінфікуючий розчин використає акушерка:
A *0,2% дезактин
B 5% розчин хлорного вапна
C 33% розчин перекису водню
D 0,3% хлораміну
E 0,5% хлоргекседин

28Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка?
A *Частоту, ритм, наповнення, напруження
B Частоту, напруження, висоту
C Пульсові коливання, наповнення
D Ритм, швидкість, висоту,
E Швидкість, наповнення

29Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?
A *Через 30 хв.
B Доки, поки не розтане лід
C Через 10 хв.
D Через годину
E Через 20 хв.

30У вагітної 36 неділь після вимірювання артеріального тиску, акушерка ФАПу, відмічає зміни показників артеріального тиску. Вкажіть показники артеріальної гіпертензії:
A *140/90 мм рт.ст.
B 100/50 мм рт.ст.
C 110/60 мм рт.ст.
D 120/70 мм рт.ст.
E 130/80 мм рт.ст.

31Вагітній з набряковим синдромом лікар призначив визначення водного балансу.Що необхідно врахувати для цього акушерці?
A *Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу
B Кількість виділеної сечі за добу
C Кількість виділеної сечі за день
D Кількість виділеної сечі за ніч
E Кількість виділеної сечі за кожні 3 години

32Хворій на цукровий діабет потрібно ввести за допомогою шприца ємкістю 2 мл 24 МО інсуліну (1 мл інсуліну містить 40 МО). Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц?
A *0,6 мл
B 0,1 мл
C 0,2 мл
D 0,3 мл
E 0,5 мл

33Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину повинна ввести акушерка під час промивання?
A *200-300 мл
B 100-200 мл
C 400-500 мл
D 500-600 мл
E 900-1000 мл

34Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катетеризацію сечового міхура. Чим повинна обробити катетер акушерка перед введенням його в сечівник?
A *Стерильним гліцерином
B Розчином фурациліну
C Розчином натрію хлориду

D Антисептичним розчином
E Рідким вазеліном

35У пацієнтки 30-ти років, яка знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні, гостра затримка сечі. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть подальші дії акушерки:
A *Здійснити катетеризацію сечового міхура
B Промити сечовий міхур
C Дати тепле пиття
D Покласти грілку на низ живота
E Ввести постійний катетер

36Породіллі після пологів лікар призначив внутрішньом'язові ін'єкції олійного розчину. Акушерка перед набиранням розчину в шприц не підігріла його. На 3-й день в місці ін'єкції утворилось ущільнення і біль при пальпації. Вкажіть, яке ускладнення виникло після ін'єкції:
A *Інфільтрат
B Некроз
C Медикаментозна емболія
D Алергійна реакція
E Гематома

37У жінки після пологів виник стійкий закреп. Вкажіть, яку клізму використає акушерка за призначенням лікаря?
A *Олійну
B Очисну
C Сифонну
D Живильну
E Краплинну

38У пацієнтки з вадою серця, лікар призначив акушерці підрахувати кількість дихальних рухів. Частота дихання становить 30/хв. Вкажіть, що спострерігається у пацієнтки:
A *Тахіпное
B Брадипное
C Апное
D Диспное
E Ядуха

39В приймальне відділення лікарні прибула вагітна для планової госпіталізації. Пацієнтка потребує санітарної обробки. Вкажіть, вид санітарної обробки:
A *Повна (душ)
B Повна (гігієнічна ванна)
C Часткова(обтирання)
D Спеціальна
E Відмова від санітарної обробки

40Пацієнтка 26-ти років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з загостренням ревматизму скаржиться на приступи серцебиття. Лікар призначив

контролювати пульс. Вкажіть судину, яку найчастіше використовують для дослідження пульсу:
A *Променева артерія
B Стегнову артерія
C Скроневу артерія
D Підколінна артерія
E Сонна артерія

41Підчас внутрішньовенної ін'єкції акушерка випадково ввела 10% розчин хлористого кальцію під шкіру. Які подальші дії акушерки?
A *Припинити введення, обколоти місце ін'єкції 0,1% розчином адреналіну
B Накласти джгут вище місця ін'єкції
C В місце ін'єкції ввести 0,9% розчин натрію хлориду 5-8 мл
D Покласти грілку
E Продовжити введення 10% розчину кальцію хлориду

42Метод дезінфекції, який включає в себе використання дії високих і низьких температур, променевих засобів та механічний вплив називається:
A *Фізичний
B Хімічний
C Механічний
D Спеціальний
E Загальний

43Для якого рентгенологічного дослідження готують контрастну суміш, яка складається із сульфату барію (із розрахунку 400 г порошку на 1,6 л води) і 10 г таніну?
A *Іригоскопії
B Урографії ретроградна
C Холецистографії
D Бронхографії
E Урографії екскреторна

44При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994 р. "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Вкажіть номер чинного наказу:
A *38
B 120
C 365
D 408
E 720

45Окремо в скількох примірниках старша акушерка виписує готові, екстемпоральні лікарські форми, перев'язувальний матеріал та предмети догляду за хворими?
A *В трьох
B В одному
C В двох
D В чотирьох

E В п’яти

46Після припинення внутрішньовенного уведення розчину, акушерка накладає на місце ін’єкції стерильний ватний тампон, видаляє голку із вени, місце ін’єкції притискає на 5 хв. Для попередження, якого ускладнення виконуються дані дії акушеркою?
A *Гематоми
B Інфільтрату
C Повітряної емболії
D Непритомності
E Пірогенної реакції

47В якій кількості закрапують в око розчин антибіотика другого розведення для проведення кон’юктивальної проби?
A *1-2 краплі
B 3-4 краплі
C 4-5 краплі
D 5-6 крапель
E 6-8 крапель

48 Пацієнтці з підозрою на шлункову-кишкову кровотечу призначено дослідження калу на приховану кров. Вкажіть, яку кількість калу необхідно взяти для дослідження:
A *5-10 г калу
B 1-3 г калу
C 3-4 г калу
D 11-15 г калу
E 15-20 г калу

49Перед набиранням олійного розчину у шприц, акушерка підігріває на водяній бані ампулу до температури:
A *36-37°*C*
B 39-40°*C*
C 34-36°*C*
D 25-30°*C*
E 20-25°*C*

50Для приготування 1 л 0,2% розчину дезактину необхідно взяти сухої речовини:
A *2 г
B 10 г
C 15 г
D 20 г
E 50 г

51Зазначте тривалість стерилізації під тиском 2 атм при температурі 132°*C*:
A *20 хв.
B 15 хв.
C 45 хв.
D 60 хв.

E 120 хв.

52Пацієнтці з підозрою на туберкульоз, лікар призначив дослідження харкотиння на мікобактерії. Вкажіть, протягом якого часу необхідно збирати харкотиння:
A *1-3 доби
B 10 діб
C Будь-який час
D За 3 год
E Одноразово вранці

53Пацієнтці для знеболення призначені наркотичні анальгетики. Вкажіть, як часто старша акушерка виписує наркотичні препарати:
A *1 раз на 3 дні
B Щодня
C 1 раз на тиждень
D 1 раз на 10 днів
E 1 раз на місяць

54Для графічного запису показників артеріального тиску акушерка використовує температурний листок.Вкажіть ціну поділки артеріального тиску:
A *5 мм рт.ст.
B 1 мм рт.ст.
C 2 мм рт.ст.
D 3 мм рт.ст.
E 4 мм рт.ст.

55В приймальне відділення лікарні доправленно пацієнтку з блюванням “кавовою гущею”. Вкажіть вид транспортування у відділення:
A *На каталці-ношах
B На кріслі-каталці
C Ліфтом
D Сомостійною ходою
E Пішки з медсестрою

56У пацієнта з туберкульозом легень було виявлено кровохаркання. Вкажіть, яке положення найбільш доцільно надати пацієнту:
A *Напівсидяче
B Лежаче
C Лежаче на правому боці
D Лежаче на лівому боці
E Лежаче на спині

57Який дезінфікуючий розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?
A *0,2% розчин Бланідас
B 0,5% розчин мийного засобу
C 5% хлорного вапна
D 6% розчин перекису водню
E 10% хлорного вапна

58Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?
A *Через кожні 3 дні
B 1 раз на тиждень
C Кожен день
D 2 рази на тиждень
E Через кожні 5 днів

59Як часто слід проводити генеральне прибирання у пологовому будинку в індивідуальних пологових залах?
A *Щоразу після пологів
B 1 раз на тиждень
C 2 рази на тиждень
D 1 раз на 3 дні
E 2 рази на добу

60Як часто слід проводити вологе прибирання палат у пологовому будинку?
A *Не менше 2-х разів в день
B Щоденно
C По мірі необхідності
D 1 раз на тиждень
E 3 рази на тиждень

61Вкажіть який розчин є протипоказаним для проведення санітарної оборбки при педикульозі вагітних та дітей до 5 років:
A *0,15% водно-емульсійний розчин карбофосу
B Мильно-порошкова емульсія
C 5% борна мазь + 0,25% емульсія дикрезилу + 10% розчин оцтової кислоти
D 4% розчин соди + 10% розчин оцтової кислоти
E 0,5% розчин метилацетафосу

62Акушерка проводить предстерелізаційну очистку медичного інструментарію. Вкажіть, яку пробу повинна вона провести на залишки миючих засобів:
A *Фенолфталеїнову
B Ортотолуїдинову
C Бензидинову
D Амідопиринову
E Азопірамову

63Пацієнтці призначений загальний аналіз сечі. Вкажіть необхідну кількість сечі для даного дослідження:
A *100-200 мл
B 5-10 мл
C 15-20 мл
D 30-50 мл
E 50-100 мл

64Пацієнтці призначено катетеризацію сечового міхура м’яким катетером.

Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:
A *Занесення інфекції у сечовивідні шляхи
B Гематурія
C Розрив уретри
D Обтурація сечовивідного каналу
E Поява алергійної реакції

65Вкажіть найбільш доцільний метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання:
A *Паровий метод
B Кип'ятіння
C Хімічний метод
D Повітряний метод
E Іонізуюче опромінення

66Вкажіть температуру та час стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі:
A *180° - 60 хв.
B 180° - 55 хв.
C 180° - 45 хв.
D 160° - 50 хв.
E 160° - 60 хв.

67Пацієнтці 50-ти років лікар призначив лікувальну клізму з 50 мл обліпихової олії. Що потрібно зробити перед даною маніпуляцією?
A *Очисну клізму
B Краплинну клізму
C Гіпертонічну клізму
D Сифонну клізму
E Олійну клізму

68Пацієнтці призначено введення цефтріаксону по 300000 ОД. У флаконі 500000 ОД. Як виконати розведення антибіотика та скільки мл розчину набрати в шприц?
A *Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 3 мл розчину
B Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 7 мл розчину
C Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 6 мл розчину
D Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 5 мл розчину
E Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 4 мл розчину

69Назвіть розчин, який можна використати для розведення антибіотику для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість:
A *0,9% розчин натрію хлориду
B 0,25% розчин новокаїну
C 0,5% розчин новокаїну
D 2% розчин новокаїну
E 40% розчин глюкози

70Пацієнтка з цукровим діабетом І-го типу тривалий час вводить собі інсулін

тільки в зовнішню поверхню стегна. Яке ускладнення може виникнути?
A *Ліподистрофія
B Алергічна реакція
C Некроз тканини
D Тромбофлебіт
E Інфільтрат

71Після проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?
A *Прокол обох стінок вени
B Алергічна реакція
C Ушкодження нервового стовбура
D Прокол м'язів
E Дуже щільно накладений джгут

72Пацієнтка через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, здуття, не відходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?
A *Ввести газовідвідну трубку
B Ввести спазмолітики
C Покласти міхур з льодом на живіт
D Ввести знеболюючі
E Прикласти грілку

73Вагітній, яка страждає на хронічний холецистит, призначено дієту №5. Як акушерка повинна пояснити жінці та її родичам мету цієї дієти?
A *Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення
B Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності
C Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу
D Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування
E Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

74При дослідженні пульсу у вагітної жінки, акушерка визначила, що частота пульсу складає 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?
A *Брадикардія
B Аритмія
C Тахікардія
D Пароксизмальна тахікардія
E Ниткоподібний

75Пацієнтці , яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?
A *Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
B Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику
C Нормалізація обміну пуринів
D Зменшення набряків
E Покращення кровообігу

76Акушерка проводить санітарну обробку вагітній жінці з педикульозом. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?
A *5% борну мазь
B 0,15% водно-емульсійний р-н карбофосу
C 1% р-н хлораміну
D 5% р-н перманганату калію
E 3% р-н оцтової кислоти

77Акушерка, здійснючи догляд за породіллями, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?
A *Дотримання тиші
B Прибирання приміщень
C Дієтичне харчування
D Виконання призначень лікаря
E Провітрювання палат

78Якою повинна бути температура повітря у палатах полового відділення для породіль?
A *21-22°*C*
B 14-16°*C*
C 16-18°*C*
D 27-29°*C*
E 30-32°*C*

79Акушерка проводить контроль якості перед стерилізаційної очистки інструментів. З якою метою вона проводить фенолфталеїнову пробу?
A *Для виявлення залишків миючого засобу
B Для виявлення залишків крові
C Для виявлення дезінфікуючого засобу
D Для оцінки придатності інструментів до використання
E Для оцінки правильності проведення автоклавування

80Внаслідок проведеної акушеркою внутрішньом’язевої ін’єкції породіллі у місці ін’єкції з’явилась сильна біль, яка віддає в стегновий і литковий м’яз. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?
A *Ушкодження нервового стовбура
B Прокол м’язів
C Ушкодження окістя
D Прокол вени
E Утворення інфільтрату

81Лікувальне харчування базується на трьох основних принципах. Що передбачає щадний режим харчування?
A *Оберігання хворого органа чи системи органів від механічних, хімічних та термічних чинників
B Базується на зменшенні чи збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту
C У харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває нестачу

D Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами
E Дотримання режиму харчування

82У приймальному відділенні пологового будинку в процесі приймання та саноброблки у роділлі розпочалися потуги та виникла кровотеча. Які першочергові дії акушерки?
A *Викликати чергового лікаря
B Поставити очисну клізму
C Зголити волосяний покрив із зовнішніх статевих органів
D Застосувати міхур з льодом
E Виміряти артеріальний тиск

83У пологовому відділенні провели пологи у жінки 25-ти років, яка хвора на СНІД. Яку дезінфекцію необхідно провести після виписування хворої?
A *Заключну
B Профілактичну
C Поточну
D Вогнищеву
E Осередкову

84Акушерка провела туалет породіллі зі швами на промежині. Який розчин використає акушерка для догляду за швами?
A *1% розчин діамантового зеленого
B 70% розчин етилового спирту
C 2% розчин борної кислоти
D 5% розчин йоду
E 2% розчин натрію гідрокарбонату

85Акушерка проводить санітарну обробку породіллі,зрізаючи нігті на руках і ногах. Нігтьові ложа обробила 5% розчином йоду. Вкажіть, яку дезінфекцію ножиць повинна здійснити акушерка після використання:
A *Занурити у 70% р-н етилового спирту на 6 год. з наступним промиванням проточною водою
B Занурити на 15 хв. у 3% р-н пероксиду водню з наступним промиванням проточною водою
C Занурити в хлоргексидин на 45 хв з наступним промиванням проточною водою
D Занурити на 15 хв. у 30° р-н етилового спирту з наступним промиванням проточною водою
E Занурити на 15 хв. у 2% р-н соди з наступним промиванням проточною водою

86Після ускладнених пологів акушерка за призначенням лікаря здійснює повторну катетеризацію сечового міхура. Який розчин використає акушерка з метою профілактики цистіту у роділлі?
A *10 мл теплого розчину фурациліну
B 5 мл р-ну калію перманганату
C 10 мл 70° етилового спирту
D 15 мл 2 % р-ну натрію гідрокарбонату
E 10 мл 5% р-ну борної кислоти

87Жінці 32-х років, яка знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні було призначено в/м 5 мл 5% р-ну кальцію глюконат. Під час повторного виконання процедури, жінка поскаржилась на різкий, пекучий біль. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика акушерки в даному випадку?
A *Припинити ін'єкцію і перевірити етикетку ампули з-під ліків
B Ввести ліки і прикласти грілку
C Зробити йодну сітку на місці ін'єкції
D Місце ін'єкції обколоти 5% р-ном новокаїну
E Ввести ліки і виконати УФ-опромінення місця ін'єкції

88В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25-ти років зі скаргами на біль, ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло?
A *Інфільтрат
B Алергічна реакція
C Тромбофлебіт
D Абсцес
E Некроз тканини

89Жінці 28-ми років, акушерка за призначенням лікаря ввела роділлі з нефропатією в/м 5 мл 25% р-ну магнію сульфат. Що повинна далі зробити акушерка з використаним шприцом?
A *Продезінфікувати, використовуючи правило двох ємкостей
B У зібраному вигляді опустити в дез. розчин
C Віддати старшій мед. сестрі
D Передати в ЦСВ
E Викинути в сміттєзбірник

90Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Відповідний запис про негативний чи позитивний результат вона записує:
A *У листку лікарських призначень
B На окремому аркуші
C У листку спостережень
D На титульну сторінку історії пологів
E В амбулаторній картці

91Жінці 25-ти років, яка знаходиться в пологовому будинку із загрозою внутрішньоутробної асфіксії плода призначено в/в введення 40% р-ну глюкози + 5% р-н аскорбінової кислоти 10 мл. Які вена найчастіше використовується для в/в ін'єкцій?
A *Вени ліктьового згіну
B Вени передпліччя
C Вени нижніх кінцівок
D Вени кістей
E Вени голови

92Акушерка ввела породілля за призначенням лікаря в/м 5,0 мл баралгіна. Вказати, на який час повинна занурити акушерка використаний шприц в

дезінфікуючий розчин:
A *60 хв.
B 40 хв.
C 15 хв.
D 20 хв.
E 30 хв.

93Вагітній жінці, 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?
A *За 24 години
B За 12 годин
C За 10 годин
D За 8 годин
E За 7 годин

94Вагітній жінці, 31-го року, яка хворіє на неспецифічний виразковий коліт, лікарем призначено аналіз калу на приховану кров. Які медикаменти потрібно виключити з призначень перед збиранням калу на приховану кров?
A *Які містять йод, бром, залізо
B Які містять вітаміни групи В
C Які містять вісмут, кальцій
D Які містять кальцій, магній
E Які містять бром, йод

95Акушерці під час забору крові на біохімічне дослідження кров потрапила у око. Які подальші дії акушерки?
A *Промити око водопровідною водою
B Промити дистильованою водою
C Промити р-ном фурациліну 1:5000
D Промити перекисом водню
E Промити 5% р-ном калію перманганату

96Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 літру 3% розчину хлораміну?
A *30 г
B 5 г
C 10 г
D 15 г
E 100 г

97Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом’язово одноразово?
A *10 мл
B 2 мл
C 5 мл
D 15 мл
E 20 мл

98Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?
A *Наказ №955
B Наказ №450
C Наказ №460
D Наказ №410
E Наказ №408

99Яке положення слід надати пацієнту, у якого розвинувся набряк легень після чергової гіпертонічної кризи?
A *Напівсидяче положення у ліжку
B Сидяче в кріслі
C Горизонтальне на спині
D З опущеним головним кінцем
E На провому боці в ліжку

100Які дії передбачає знезараження шприців та голок після їх використання?
A *Занурення в 0,2% розчин дезактину на 1 годину
B Занурення в 0,5% миючий розчин на 1 годину
C Занурення в 3% розчин перекису водню на 1 годину
D Занурення в 70% розчин етилового спирту на 1 годину
E Занурення в 96% розчин етилового спирту на 1 годину

101При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказане?
A *І-й період гарячки
B Кровотеча
C ІІ-й період гарячки
D Травми в перші години
E Після пологів в перші 2 години

102Який термін часу затримки сечовиділення є показанням для катетеризації сечового міхура?
A *10-12 годин
B 9-15 годин
C 12-18 годин
D 12-24 години
E 3-6 годин

103У пацієнтки, 55-ти років під час обєктивногообстеження виявлено дефіцит пульсу. Що входить в поняття дефіцит пульсу?
A *Різниця між частотою серцевих скорочень та частотою пульсу
B Сума частоти серцевих скорочень та частоти пульсу
C Різниця між частотою пульсу та частотою серцевих скорочень
D Різниця між частотою пульсу та частотою дихання
E Сума частоти пульсу та частоти дихання

104Яка дієта показана при захворюваннях серцево-судинної системи?
A *Стіл №10
B Стіл №8
C Стіл №7

D Стіл №5
E Стіл №3

105В приемном отделении родильного дома акушерка проводит обследование роженицы, 28-ми лет, подсчитывает частоту дыхания. Какой должна быть в норме частота дыхания?
A *16-20/мин.
B 10-12/мин.
C 12-16/мин.
D 20-24/мин.
E 24-28/мин.

106В послеродовой палате акушерка проводит исследование пульса у родильницы, 23-х лет. Какие характеристики пульса она должна определить?
A *Ритм, частота, наполнение, напряжение
B Частота, высота, наполнение
C Величина, наполнение, напряжение
D Ритм, скорость, высота
E Напряжение, скорость, величина

107В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 32-х лет, с диагнозом хронический пиелонефрит. Лечащий врач назначил исследование мочи по Зимницкому. Как часто на протяжении суток нужно собирать мочу у пациентки?
A *Каждые 3 часа
B Каждые 2 часа
C Каждые 4 часа
D Каждые 6 часов
E Каждые 8 часов

108В послеоперационной палате находится пациентка, 27-ми лет после операции кессарева сечения. Ей назначен постельный режим. Медсестра проводит мероприятия по профилактике пролежней. Какой раствор она должна использовать для обработки кожи в местах возможного образования пролежней?
A *10% раствор камфорного спирта
B 1% раствор калия перманганата
C 3% раствор перекиси водорода
D 2% раствор гидрокарбоната натрия
E 1:5000 раствор фурацилина

109В отделении патологии беременных находится пациентка, 32-х лет, страдающая митральным пороком сердца, хронической недостаточностью кровообращения. Лечащий врач назначил контроль водного баланса. Что следует учитывать, выполняя данное назначение?
A *Соотношение введенной в организм жидкости и суточного диуреза
B Соотношение дневного и ночного диуреза
C Количество введенной в организм жидкости за сутки
D Суточное количество мочи
E Разницу между утренними и вечерними показателями массы тела

110В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 30-ти лет, с диагнозом язвенная болезнь. Лечащий врач назначил анализ кала на скрытую кровь. Какую диету должна соблюдать пациентка в течении 3-х дней?
A *Безгемоглобиновую
B С ограничением соли
C Бесшлаковую
D Калийсберегающую
E С ограничением жидкости

111В гинекологическом отделении находится на обследовании пациентка, 32-х лет, которая имеет сопутствующий диагноз хронический колит. В связи с наличием запора, лечащий врач назначил очистительную клизму. Какое положение должна занять пациентка при проведении манипуляции?
A *На левом боку
B На правом боку
C На животе
D На спине
E Коленно-локтевое

112В отделении патологии беременных находится пациентка, 28-ми лет, страдающая хроническим холециститом. По назначению врача ей проводят 3-х фазное дуоденальное зондирование. Медсестра зондового кабинета получила первую порцию желчи, затем ввела в зонд 50 мл теплого раствора 33% раствора сульфата магния, наложила зажим на зонд на 10 минут, а затем из зонда стала выделяться вязкая жидкость темно-оливкового цвета. Как называется эта порция?
A *Пузырная желчь
B Дуоденальная желчь
C Желчь из внутрипеченочных протоков
D Панкреатический сок
E Желудочный сок

113В отделении патологии беременных находится пациентка, 25-ти лет, с диагнозом сахарный диабет I-го типа. Медсестра процедурного кабинета готовит пациентке инъекцию инсулина. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц емкостью 2 мл, если назначена доза 16 ЕД (1 мл инсулина - 40 ЕД)?
A *0,4 мл
B 0,6 мл
C 0,5 мл
D 0,3 мл
E 0,2 мл

114Акушерка родильного зала в начале рабочего дня вскрыла стерильный бикс с перевязочным материалом. В течении какого времени можно использовать материалы из данного бикса?
A *24 часов
B 48 часов
C 12 часов

D 10 часов
E 6 часов

115В отделении патологии беременных медсестра процедурного кабинета утром взяла кровь из вены у 3-х пациенток на ВИЧ-инфекцию. Какой приказ МЗ Украины требует доставки пробирок с кровью в закрытых контейнерах?
A *№955
B №408
C №228
D №59
E №38

116Акушерка открыла бикс с перевязочным материалом и выявила, что индикатор стерильности не разплавился. Какие дальнейшие действия акушерки?
A *Отправить бикс на повторную стерилизацию
B Отослать материал на бактериологическое исследование
C Написать докладную записку главному врачу
D Получить подтверждение записи в “Журнале учета стерилизации” в ЦСО
E Использовать перевязочный материал для работы

117Укажите время стерилизации в автоклаве под давлением 2 атм, Т- 132°*С*:
A *20 мин.
B 15 мин.
C 45 мин.
D 60 мин.
E 120 мин.

118Ви акушеркаполгвого відділення. Вас викликала пацієнта, в якої виникло блювання “кавової гущі”. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги?
A *Етамзілат натрію
B Кетанов
C Но-шпа
D Мезатон
E Фізіологічний розчин

119За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Вкажіть, яку кількість крові необхідно набрати у пробірку:
A *9 мл
B 2 мл
C 3 мл
D 5 мл
E 7 мл

120Пацієнтці з хронічним ентероколітом, лікар призначив іригосокпію. Вкажіть, воду якої оптимальної температури ви застосуєте для постановки очисної клізми:

A *28-32°*C*
B 35-36°*C*
C 35-37°*C*
D 37-38°*C*
E 38-39°*C*

Хірургія

1Хворий 25-ти років доставлений в операційну для виконання операції з приводу варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Коли можна починати хірургічне втручання?
A *На 2-му рівні III-ї стадії наркозу
B На II-й стадії наркозу
C На 3-му рівні III-ї стадії наркозу
D На 4-му рівні III-ї стадії наркозу
E На I-й стадії наркозу

2Хворому 32-х років, з ознаками шлунково-дуоденальної кровотечі почали переливання одногрупної крові. Під час проведення біологічної проби з'явились такі скарги на біль у попереку, загальну слабість, неспокій. Об'єктивно: обличчя червоне, тремтіння, прискорення пульсу і дихання, задишка. Що трапилось?
A *Гемотрансфузійний шок
B Цитратний шок
C Пострансфузійна реакція
D Гемолітичний шок
E Дихальна недостатність

3Хворий 72-х років звернувся до поліклініки з приводу наявності крові в сечі. Під час опитування з'ясувалось, що у нього ніколи не було нападів ниркової коліки. Під час пальпації нирок визначається утворення в поперековій ділянці. Який метод дослідження першочерговий для з'ясування діагнозу?
A *Комп'ютерна томографія

B Ультразвукове дослідження
C Рентгенологічне дослідження
D Загальний аналіз сечі
E Ректальне дослідження

4Хвору 38-ми роки госпіталізовано в травматологічне відділення після дорожньо-транспортної пригоди з переломом та зміщенням шийних хребців. Який ви застосуєте метод витягнення?
A *Петлею Гліссона
B Лямками
C Спіральною клемою
D Хребтове витягнення
E Рамами Брауна

5У медпункт заводу звернулась жінка 43-х років, зі скаргами на різкий біль, свербіння, відчуття жару в лівій гомілці. Температура тіла - 38,3°*C*, хворіє два дні. Об'єктивно: в ділянці гомілки виражений набряк, розлите почервоніння з чіткими фестончастими краями, є окремі пухирі, наповнені жовтуватим вмістом. Ваш попередній діагноз:
A *Бешиха
B Сибірка
C Опік
D Газова гангрена
E Правець

6До вас звернулася жінка 38-ми років зі скаргами на біль у лівій гомілці. Страждає варикозним розширенням вен нижніх кінцівок протягом 3-х років після пологів. Об'єктивно: температура тіла - 38°*C*. У ділянці лівої гомілки по ходу варикозно розширених вен пальпуються болючі тяжі, шкіра над ними гіперемована, набрякла. Який попередній діагноз?
A *Тромбофлебіт
B Ендартеріїт
C Атеросклероз
D Варикоз
E Недостатність кровообігу

7У результаті падіння при аварії в мотоцикліста, поранення правої гомілки. Об'єктивно: стан середньої важкості. Блідість шкірних покривів виражена. Стогне від болю в нозі. Пульс - 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Свідомість не втрачав. У рані уламки, кровотеча незначна. Який ступінь шоку?
A *II
B I
C Ia
D III
E IV

8У хірургічний кабінет поліклініки звернулась жінка 45-ти років, яка хворіє варикозним розширенням вен 8 років. Об'єктивно: гігіантська виразка, що охоплює всю нижню третину лівої гомілки, з в'ялими грануляціями.Шкіра навколо неї туга,

має темні плями. Ваш попередній діагноз:
A *Трофічна виразка
B Атеросклеротична виразка
C Променева виразка
D Туберкульозна виразка
E Сифілітична виразка

9Ви акушерка приймально-діагностичного відділення оглядаєте жінку, 35-ти років,після кримінального аборту. Ви повинні провести специфічну профілактику проти якої хірургічної інфекції:
A *Правця
B Бешихи
C Сказу
D Гангрени
E Сепсису

10Ви акушерка гінекологічного відділення доглядаєте за прооперованою жінкою, 36-ти років, після видалення яєчника та апендектомії з дренажами черевної порожнини. Назвіть вид застосованої антисептики:
A *Фізичної
B Біологічної
C Механічної
D Хімічної
E Екологічної

11Ви акушерка пологового будинку при огляді новонародженої дитини виявили набряк та деформацію правої ключиці. Яке доцільно провести спеціальне обстеження для уточнення діагнозу?
A *Рентгенологічне
B УЗД
C КТ
D МРТ
E Радіоізотопне

12Ви працюєте акушеркою на здоровпункті. До Вас доставили робітницю, яка з необачності пролила на нижні кінцівки акумуляторну рідину. Визначте характер опікової травми:
A *Хімічний
B Термічний
C Променевий
D Гіпотермічний
E Електричний

13Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до потерпілого чоловіка тваринницької ферми, який щойно отримав проникаюче поранення грудної клітки. При огляді із рани виділяється піниста кров. Ваша першочергова дія при наданні невідкладної допомоги:
A *Накласти герметичну пов’язку
B Ввести протишокові препарати

C Надати напівсидяче положення
D Провести знеболювання
E Транспортування до лікарні

14Ви акушерка ФАПу. До Вас привезли чоловіка, 40-ка років, в тяжкому стані, покритий холодним потом, пульс слабкий, АТ - знижений, ноги підтягує до живота. При загальному обстежені, який достовірний симптом проривної виразки шлунку:
A *Спіжарного
B Щьоткіна-Блюмберга
C Сітковського
D Пастернацького
E Ортнера

15Ви акушерка відділення патології вагітності доглядаєте за жінкою 36-ти років, у якої виявили ознаки гострого панкреатиту. Яку необхідно провести лабораторну діагностичну процедуру для підтвердження діагнозу?
A *Аналіз сечі на діастазу
B УЗД
C Аналіз сечі загальний
D Аналіз крові загальний
E Коагулограму

16При патронажному обстеженні вагітної жінки ознаки гострого холецистита. Який об'єм невідкладної долікарської допомоги?
A *Міхур з льодом, госпіталізація до лікарні
B Спазмолітики, кровозупинні засоби
C Аналгетики та спазмолітичні засоби
D Знеболюючі засоби, госпіталізація до лікарні
E Залишити вдома, викликати лікаря

17Ви працюєте в хірургічному відділенні. За призначенням лікаря готуєте пацієнтку до оперативного втручання з приводу гострого апендициту. Вкажіть термін підготовки до ургентної операції:
A *2 години
B 12 годин
C 6 годин
D Негайно
E 4 години

18Ви акушерка гінекологічного відділення доглядаєте за жінкою, 42-х років, з запаленням жіночих статевих органів, у якої виникло ускладнення-перитоніт. Ваші дії перед транспортуванням пацієнтки до операційної:
A *Премедикація
B Система потрійного катетеру
C Назогостральний зонд
D Катетеризація периферійної вени
E Катетеризація сечового міхура

19Ви акушерка гінекологічного відділення при огляді жінки, 32-х років, після в/м

ін'єкції сірчано-кислої магнезії виявили в ділянці правої сідниці обмежений болісний інфільтрат без флюктуації. Який приорітетний метод лікуванні на даній стадії?
A *Консервативний
B Оперативний
C Комбінований
D Загальний
E Місцевий

20При огляді хворого стан тяжкий. Діагностовано відкритий пневмоторакс. Лікар доручив накласти повязку. Якого типу вона повинна бути?
A *Оклюзійна
B Давляча
C Спіральна
D Черепашача
E Косинкова

21Який засіб іммобілізації для транспортування в травматологічне відділення треба надати чоловіку з деформацією в ділянці лівого стегна, який потратив під обвал?
A *Шина пневматична
B Шина Беллера
C Шина Ентіна
D Шина Єланського
E Шпиці Кіршнера

22Лікар призначив накласти герметичну пов'язку потерпілому з відкритим пневмотораксом. Яка з пов'язок буде герметична?
A *Оклюзійна
B Колосоподібна
C Вельпо
D Дезо
E Спіральна

23Яке втручання є доцільним на догоспітальному етапі, якщо чоловік отримав опік крутим окропом лівої кисті та передпліччя, скаржиться на сильний біль. При огляді: на тильній поверхні лівої кисті та передпліччя пухирі:
A *Охолодити, накласти асептичну пов'язку
B Накласти мазеву пов'язку
C Накласти оцтовий компрес
D Порадити прикласти грілку
E Підсікти пухирі та накласти пов'язку

24У пацієнта 28-ми років скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з'ясування діагнозу?
A *Ректороманоскопія
B Гастроскопія
C Фіброгастроезофагоскопія

D Ультразвукове обстеження
E Рентгеноскопія

25Який метод хірургічної обробки рук використовують при відсутності води?
A *Бруна
B Альфельда
C Гроссіха-Філончикова
D Спасокукоцького-Кочергіна
E Фюрбрінгера

26При визначенні групи крові за допомогою стандартних сироваток хворій 30-ти років, аглютинація з'явилась в I і III лунках. Яка група крові у пацієнтки?
A *А(II)
B 0(I)
C АВ(IV)
D В(III)
E Помилка при визначенні

27Акушерка виконує функцію операційної сестри. Який вид прибирання операційної застосувати перед початком кожного операційного дня?
A *Попереднє
B Заключне
C Поточне
D Генеральне
E Післяопераційне

28Який із перерахованих препаратів має бути обов'язково введений при підготовці до операції?
A *Холінолітик - атропіну сульфат
B Нейролептик - аміназин
C Транквілізатор - діазепам
D Снодійне - фенобарбітал
E Антигістамінний засіб - димедрол

29 Що характерно для злоякісної пухлини?
A *Пухлина проростає в сусідні органи
B Пухлина не дає метастазів
C Пухлина не здавлює сусідні органи
D Пухлина відокремлена капсулою
E Пухлина не проростає в сусідні органи

30Яку пробу слід провести для виявлення залишків крові при проведенні передстерилізаційної обробки інструментарію?
A *Азопірамову
B Сулемову
C Тимолову
D Фенолфталеїнову
E Пробу на сахарозу

31На ФАП звернулась дівчина 18-ти років зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 38°*С*. живіт болісний при пальпації, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Що з переліченого повинна зробити акушерка?
A *Викликати швидку допомогу
B Промити шлунок
C Відпустити додому
D Викликати батьків
E Спостерігати

32Яке з перелічених трансфузійних середовищ є найкращим для переливання хворій з крововтратою?
A *Еритроцитарна маса
B Плазма
C Лейкоцитарна маса
D Гемодез
E Реополіглюкін

33Що потрібно зробити, якщо перед транспортуванням до лікарні потерпілому наклали джгут, але термін накладання закінчився раніше госпіталізації?
A *Джгут послабити, пальцеве притискання, повторно накласти джгут
B Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби
C Ввести серцеві засоби та продовжити транспортування
D Продовжити транспортування з накладеним джгутом
E Джгут зняти, накласти давлючу пов'язку

34Яка Ваша тактика, якщо у хворого 50-ти років 3 години тому виникло защемлення пахової грижі?
A *Холод на живіт та транспортування до лікарні
B Ввести знеболюючі засоби
C Зрошення грижового випинання хлоретилом
D Ручне вправлення грижі
E Консервативні заходи розраховані на самовправлення грижі

35Жінці 32-х років, що оперована з приводу позаматкової вагітності, із замісною метою переливалася еритроцитарна маса. Під час проведення гемотрансфузії в неї виникла різка слабкість, сильний біль в поперековій ділянці, тахікардія - 110/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. Перша допомога полягає у:
A *Припинити переливання
B Спостерігати за хворою
C Ввести знеболюючі засоби
D Провести замінне переливання
E Продовжувати переливання

36Жінка 22-х років з вагітністю 30-ти тижнів скаржиться на біль внизу живота, більше справа, який з'явився 5-ти годин тому, нудоту, одноразове блювання. При пальпації живота відмічається біль у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. В аналізі крові лейкоцитоз - $15 \cdot 10^9$/л Який

найбільш імовірний діагноз?
A *Апендицит та вагітність
B Загроза переривання вагітності
C Передчасне відшарування плаценти
D Ниркова коліка та вагітність
E Холецистит та вагітність

37Породілля скаржиться на біль в правій грудній залозі. В ділянці болю інфільтрат 3х4 см, з розм'якшенням у центрі. Температура - 38,5°*C*. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Гнійний мастит
B Пневмонія
C Плеврит
D Гострий лактостаз
E Мастопатія

38До акушерки жіночої консультації звернулася жінка, 12 тижнів вагітності, зі скаргами на болючий конусовидної форми інфільтрат з некротичним стрижнем у ділянці підборіддя. Шкіра над ним червона, напружена. Назвіть найбільш вирогідний діагноз:
A *Фурункул
B Туберкульоз
C Карбункул
D Третичний сифіліс
E Глибока трихофітія

39До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 45-ти років, яка скаржиться на сильний біль у ділянці промежини, який посилюється під час рухів та дефекації. Хворіє 5 діб. Під час огляду в періанальній ділянці інфільтрат до 2х3 см різко болючий при пальпації, в центрі - розм'ягчення. Ваш діагноз:
A *Гострий парапроктит
B Рак прямої кишки
C Гострий геморой
D Хронічний геморой
E Гострий проктит

40Ви акушерка малої операційної, допомагаєте лікарю підготувати все необхідне до переривання вагітності за медичними показниками у терміні 8 тижнів. Який препарат Ви приготуєте для обробки операційного поля?
A *1% розчин йодонату
B 3% розчин хлораміну
C 0,5% розчин аміаку
D 3% розчин лізоформіну
E 0,1% розчин діамантового зеленого

41Ви акушерка пологової зали. Яким розчином проводиться дезінфекція використаного інструментарію?
A *0,5% розчин дезактину
B 95% етиловий спирт

C 0,5% розчин хлораміну
D 1% розчин Люголя
E 0,5% розчин аміаку

42На 9-у добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 38°*C*, скаржиться на біль у правій молочній залозі. При огляді встановлено: в правій молочній залозі пальпується інфільтрат, різко болючий, шкіра над ним гіперемована, субареолярна частина і сосок набряклі, болючі. Визначити, яке ускладнення післяпологового періоду у породіллі?
A *Лактаційний мастит
B Лактостаз
C Лакторрея
D Мастопатія
E Тріщини сосків

43Ви працюєте акушеркою ФАПу. У жінки травма зовнішніх статевих органів - невелика гематома, яка не збільшується. Ваші першочергові дії:
A *Прикласти холод і госпіталізувати
B Ввести спазмолітичні засоби
C Ввести знеболюючі засоби
D Прикласти компрес
E Ввести гемостатичні засоби

44Ви працюєте в операційній. Необхідно простерилізувати інструмент хімічним способом в 6% розчині пероксиду водню. Який час тримає стерилізація при кімнатній температурі?
A *6 годин
B 2 години
C 4 години
D 8 годин
E 3 години

45У жінки 50-ти років, хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок, внаслідок поранення виникла кровотеча. Кров темного кольору. Як зупинити кровотечу в даному випадку?
A *Накласти давлючу пов’язку
B Накласти джгут
C Виконати тампонаду рани
D Ввести кровоспинні препарати
E Надати підвищеного положення

46При масивних переливаннях крові необхідно проводити профілактику цитратного шоку. Який препарат застосовується при цьому?
A *10% розчин кальцію хлориду
B 10% розчин натрію хлориду
C 0.9% розчин натрію хлориду
D 25% розчин сульфату магнію
E 40% розчин глюкози

47У пацієнта різана рана тильної поверхні кисті з гнійним ексудатом, отримана 3 дні тому. Для перев'язки Ви приготували лікарю 1% р-н йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні для цієї перев'язки?
A *3% водню пероксиду та 10% натрію хлориду
B 1% хлораміну та 10% натрію хлориду
C 0,02% фурациліну та 0,9% натрію хлориду
D 6% водню пероксиду та 0,02% фурациліну
E 3% водню пероксиду та 0,9% натрію хлориду

48Через 6 діб після ін'єкції у породіллі утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла - 37,8°*C*. Що у пацієнтки?
A *Пост'єкційний абсцес
B Карбункул
C Флегмона
D Панарицій
E Бешихове запалення

49При проведенні огляду 25-річної жінки у відділенні профілактики ви виявили щільний вузол діаметром до 2 см в правій молочній залозі. Ваші незалежні втручання:
A *Направити до хірурга або мамолога
B Провести масаж молочної залози
C Порадити компреси з димексидом
D Запропонувати фізіопроцедури
E Направити на ангіографію

50Пацієнтка готується до гінекологічної операції. Якими інструментами фіксують білизну навколо операційної рани?
A *Цапками
B Корнцангами
C Голками
D Затискачами Люера
E Затискачами Федорова

51Невідомий спричинив чоловікові удар ножем у живіт. При обстеженні на передній черевній стінці рана довжиною 5 см, яка помірно кровоточить, в її отвір випала петля кишківника. Турбують біль у животі і спрага. Що необхідно виконати на місці в першу чергу?
A *Накласти вологу серветку на петлі, зафіксувати їх, знеболити
B Вправити петлі кишківника в черевну порожнину.
C Обробити петлі кишківника дез.розчином, вправити
D Ввести кровозупинні, знеболюючі, госпіталізувати
E Запропонувати холодне питво, знеболити.

52Жінка в терміні 16 тижнів вагітності захворіла 8 годин тому, коли відчула біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину

живота. Було одноразове блювання. При пальпації різкий біль в правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:
A *Гострий апендицит
B Гострий холецистит
C Гострий гастрит
D Кишкову непрохідність
E Гострий панкреатит

53У пацієнта закритий перелом кісток гомілки. Що необхідно приготувати для транспортної іммобілізації?
A *Шини Крамера
B Бинт для пов'язки Дезо
C Шину Дітеріхса
D Косинку для пов'язки
E Шину Белера

54Пацієнтку готують до ургентної операції - кесаревого розтину. За призначенням лікаря Вам необхідно підготувати препарати для премедикації. Який препарат є обов'язковим для її проведення ?
A *Атропін
B Анальгін
C Аміназин
D Клофелін
E Листенон

55У пацієнта поранення черепа з вибуханням головного мозку. Шкіру навколо рани обробили йодонатом, на вибухання наклали стерильну серветку з ізотонічним розчином. Що ще необхідно накласти, щоб не відбулося стискання головного мозку?
A *Стерильний ватно-марлевий бублик
B Шину Крамера
C Стерильний ватно-марлевий тампон
D Шину Єланського
E Шину Бакшеєва

56Потерпілий збитий вантажівкою. На передній поверхні правого передпліччя є глибока рана, у глибині якої уламки обох кісток. Що необхідно зробити в першу чергу при наданні невідкладної допомоги?
A *Зупинити кровотечу
B Накласти асептичну пов'язку
C Накласти транспортну шину
D Зігріти потерпілого
E Ввести анальгетики

57До акушерки звернулася жінка 38-ми років. Після четвертої вагітності варикозне розширення підшкірних вен обох гомілок. Дайте рекомендації:
A *Носити еластичні панчохи

B Накладати зігріваючий компрес
C Приймати антикоагулянти
D Застосовувати мазі
E Дотримуватись режиму

58Пацієнтці планується оперативне втручання - ампутація нижньої кінцівки. Яке втручання потрібно виконати за 30 хвилин до початку операції?
A *Виконати премедикацію
B Виконати очисну клізму
C Дати гіпотензивні ліки
D Поголити операційне поле
E Промивання шлунку

59У пацієнта після проведення біологічної проби при переливанні крові з'явилися занепокоєння, загрудинний стискаючий біль, страх, холодний піт, блідість шкірних покривів. Які першочергові втручання необхідно виконати?
A *Негайно припинити переливання крові
B Ввести хворому антигістамінні препарати
C Негайно ввести протишокові препарати
D Негайно ввести серцево-судинні засоби
E Дати зволожений кисень пацієнту

60Яка тактика акушерки, якщо у флаконі з кров'ю Ви помітили пластивці?
A *Непридатна до використання
B Перевірити групу крові
C Придатна до використання
D Збовтати кров
E Профільтрувати кров

61У хворого раптово виник біль в ділянці попереку, який іррадіює вниз живота і статеві органи, посилюється при рухах, сечопуск утруднений, болючий. Це характерно для:
A *Ниркової кольки
B Перфоративної виразки шлунку
C Апендициту
D Гострого холециститу
E Гострого панкреатиту

62Для різаної рани характерні краї:
A *Рівні
B Злиплі
C Нерівні
D Обпалені
E Укушені

63Вражаючі фактори блискавки:
A *Електричний струм
B Світлова енергія
C Звукова енергія

D Проникаюча радіація
E Радіоактивне зараження

64У пацієнта облітеруючий ендартеріїт обох нижніх кінцівок. Яку найхарактернішу проблему Ви виявите у хворого?
A *Переміжна кульгавість
B Біль у суглобах
C Синюшність стоп
D Набряк гомілок
E Гіперемія стегна

65У жінки під час четвертої вагітності скарги на набряк гомілок, стоп, гіперпігментацію шкіри, варикозне розширення підшкірних вен обох гомілок. Ваші рекомендації:
A *Носити еластичні панчохи
B Змазувати тетрацикліновою маззю
C Накладати зігріваючий компрес
D Приймати антикоагулянти
E Провести флебектомію

66У хірургічному відділенні знаходиться хворий після операції резекції шлунку. Що необхідно зробити в першу чергу для профілактики застійної пневмонії?
A *Проводити дихальну гімнастику
B Надати сидячого положення
C Дотримуватись суворого ліжкового режиму
D Вводити сечогінні
E Часто провітрювати палату

67У хворого діагностований закритий перелом гомілки Виберіть абсолютну ознаку перелому:
A *Крепітація
B Сильний біль
C Кровотеча
D Порушення функції
E Набряк в ділянці травми

68У потерпілої відкритий перелом кісток гомілки з артеріальною кровотечею. Яка послідовність дій при наданні першої допомоги?
A *Зупинка кровотечі, знеболювання, асептична пов’язка, іммобілізація
B Пов’язка, зупинка кровотечі, іммобілізація, знеболювання
C Іммобілізація, пов’язка, зупинка кровотечі, знеболювання
D Пов’язка, іммобілізація, зупинка кровотечі, знеболювання
E Іммобілізація, зупинка кровотечі, пов’язка, знеболювання

69Хвора 25-ти років скаржиться на біль по всьому животі, який з’явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Живіт болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Ваші подальші дії:
A *Терміново госпіталізувати

B Спостерігати
C Сповістити маму
D Відпустити додому
E Промити шлунок

70Ендоскопічним методом дослідження являється:
A *Лапароскопія
B Біопсія
C УЗД
D Метросальпінгографія
E Зондування порожнини матки

71Які методи необхідно застосувати для профілактики розходження країв рани у післяопераційному періоді?
A *Бандаж
B Міхур з льодом
C Мішочок з піском
D Фізичні вправи
E Активне положення в ліжку

72У травмованого чоловіка 35-ти років різка болючість у ділянці кісток тазу внаслідок падіння з висоти. В якому положенні транспортувати хворого?
A *На дерев'яному щиті в положенні "жаби"
B На дерев'яних ношах
C Накласти шину Дітеріхса
D Накласти 3 шини Крамера
E Підкласти під таз валик

73У пацієнта різана рана II-го пальця правої кисті з кровотечею. Який з перелічених препаратів застосовують для місцевої зупинки кровотечі?
A *Гемостатичну марлю
B Тромбін
C Желатинову губки
D Фібриноген
E Кріопреципітат

74На ФАП звернулася жінка 30-ти років, яку покусав собака. Який першочерговий захід потрібно зробити?
A *Промити рану мильним розчином
B Промити рану перекисом водню
C Промити рану розчином йодонату
D Накласти асептичну пов'язку
E Промити рану гіпертонічним розчином

75 Коли знімають шви з післяопераційної рани на животі?
A *На 6-7 день
B На 4-5 день
C На 8 день

D На 20 день
E На 3-4 день

76До Вас звернувся хворий з розтягненням зв'язок гомілково-ступневого суглобу. Яку пов'язку Ви накладете?
A *Тугу хрестоподібну
B Черепашкову
C Тугу колову
D Хрестоподібну
E Тугу спіральну

77Чоловік отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначайте площу опікової поверхні:
A *36%
B 16%
C 25%
D 56%
E 42%

78Чоловіка 35-ти років уразило струмом. Об'єктивно: потерпілий блідий, дихання немає, пульс відсутній, АТ не визначається. Які ваші першочергові дії?
A *Серцево-легенева реанімація
B Ввести серцеві засобм
C Ввести дихальні аналептики
D Ввести глюкокортикоїди
E Терміново транспортувати до лікарні

79На ФАП доставлено потерпілого з кровотечею з променевої артерії. Який метод тимчасової зупинки артеріальної кровотечі слід застосувати?
A *Пальцеве притиснення артерії
B Накладання давлячої пов'язки
C Туга тампонада рани
D Застосувати гемостатичну губку
E Холод на рану

80Назвіть біологічні препарати місцевої дії, які використовують для остаточної зупинки капілярної кровотечі:
A *Гемостатична губка
B Амінокапронова кислота
C Вікасол
D Свіжозаморожена плазма
E Перекись водню

81При огляді виявлено кровотечу пульсуючим струменем в середній третині плеча. Який найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі?
A Джгут "закрутка"
B Підвищене положення кінцівки
C Давляча пов'язка
D Холод на рану

E Максимальне згинання кінцівки

82Шоковий індекс дорівнює 1. Яка кількість крові втрачена хворим?
A *1000 мл
B До 300 мл
C До 500 мл
D Більше 2000 мл
E 1500-2000 мл

83Для провідникової анестезії акушерка застосує розчин новокаїну:
A *1%
B 0,01%
C 10%
D 0,1%
E 5%

84Для транспортної імобілізації при переломі гомілки застосовують:
A *Шину Крамера
B Шину Дітеріхса
C Шину Белера
D Шину Єланского
E Шину Ентіна

85Для якого ступеня відмороження характерно відшарування епідермісу та утворення пухирів, наповнених прозорим ексудатом?
A *II
B I
C III-А
D IV
E III-Б

86Назвіть метод дослідження, який застосовується для виявлення захворювань молочної залози:
A *Мамографія
B Кольпоскопія
C Фіброгастроскопія
D Цистоскопія
E Езофагоскопія

87Назвіть основний метод лікування гідраденіту в фазі абсцедування:
A *Розтин гнояка
B Вітамінотерапія
C Пов’язки з фурациліном
D УВЧ
E Променева терапія

88У 60-річної жінки раптово виникла кровотеча з варикозно розширеної вени правої нижньої кінцівки.Який метод тимчасової зупинки кровотечі потрібно

застосувати у даному випадку?
A *Накладання давлячої пов'язки
B Максимальне згинання кінцівки
C Накладання оклюзійної пов'язки
D Накладання джгута
E Накладання джгута-закрутки

89З метою екстренної профілактики правця нещепленим вводять ППС (протиправцеву сироватку) в дозі:
A *3000 МО
B 300 МО
C 2500 МО
D 3 МО
E 25 МО

90На ФАП звернулась жінка зі скаргами на часте болісне сечовипускання незначними порціями, наприкінці сечовипускання біль посилюється. Встановіть попередній діагноз:
A *Гострий цистит
B Сечокам'яна хвороба
C Гідронефроз
D Паранефрит
E Піонефроз

91Для обробки рук перед операцією акушерка використає розчин первомура:
A *2,4%
B 24%
C 4,8%
D 48%
E 0,24

92До приймального відділення ЦРЛ доставлено пацієнта 37-ми років з артеріальною кровотечею із середньої третини плеча. Які із кровозупинних затискачів необхідно відібрати?
A *Кохера, Більрота, Пеана
B Мікуліча, Люера, Федорова
C Шапі, Пайра, Пеана
D Більрота, Люера, Мікуліча
E Пайра, Кохера, Шапі

93До ФАПу на перев'язку звернулась пацієнтка із різаною раною на лівому передпліччі. Що можна використати для зняття бинтової пов'язки?
A *Ножиці Лістера
B Листова пила
C Пилка Джиглі
D Дугова пила
E Ампутаційний ніж

94Пацієнту 39-ти років здійснюють ампутацію лівої нижньої кінцівки в нижній

третині стегна. Який спеціальний хірургічний інструмент можна використати?
A *Кусачки Лістона
B Затискач Мікуліча
C Зонд Кохера
D Пластинка Ревердена
E Гудзиковий зонд

95Хірургічна операція, яка проводиться негайно або протягом кількох годин за життєвими показами:
A *Екстрена
B Розширена
C Планова
D Радикальна
E Одномоментна

96Шина, яка використовується для скелетного витяжіння:
A *Бєлєра
B Крамера
C Ентіна
D Фільберга
E Еланського

97Назвіть режим стерилізації хірургічного інструментарію повітряним методом:
A *Температура - 180°*C*, час - 60 хв.
B Температура - 120°*C*, час - 45 хв.
C Температура - 132°*C*, час - 20 хв.
D Температура - 160°*C*, час - 60 хв.
E Температура - 150°*C*, час - 160 хв.

98Назвіть розчин, який використовують для обробки рук хірурга за методом Спасокукоцького-Кочергіна:
A *Нашатирний спирт
B Етиловий спирт
C Стериліум
D Перекис водню
E Мурашина кислота

99Назвіть хірургічні інструменти для операцій на прямій кишці:
A *Дзеркало ректальне, щипці для біопсії, затискач Люера
B Канюля Люера, гачок Фолькмана, ранорозширювач Труссо
C Цистоскоп, затискач Федорова, катетер
D Ретрактор, распатор, рашпіль
E Троакар, голка Дюфо, скальпель

100Назвіть хірургічний інструмент для перепилювання кісток при трепанації черепа:
A *Дротяна пилка
B Листова пилка
C Дугова пилка

D Резекційний ніж
E Ампутаційний ніж

101При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із першою та четвертою стандартними сироватками. Якої групи досліджувана кров?
A *Групу визначити неможливо
B 0(I)
C A(II)
D B(III)
E AB0(IV)

102При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із цоліклонами анти-А та анти-В. Якої групи досліджувана кров?
A *AB0(IV)
B 0(I)
C A(II)
D B(III)
E Групу визначити неможливо

103Назвіть групи крові, з якими цоліклон анти-А дає аглютинацію:
A *A(II) та AB0(IV)
B B(III) та AB0(IV)
C 0(I) та A(II)
D 0(I) та AB0(IV)
E A(II) та B(III)

104Назвіть групи крові, з якими цоліклон анти-В дає аглютинацію:
A *B(III) та AB0(IV)
B A(II) та AB0(IV)
C 0(I) та A(II)
D 0(I) та AB0(IV)
E A(II) та B(III)

105Назвіть співвідношення кількості стандартної сироватки та крові при визначенні групи крові:
A *10:1
B 1:10
C 5:1
D 1:5
E 2:1

106При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із другою та третьою стандартними сироватками. Якої групи досліджувана кров?
A *Групу визначити неможливо
B 0(I)
C A(II)
D B(III)
E AB0(IV)

107Для профілактики розвитку цитратного шоку при переливанні крові на кожні 500 мл влитої крові внутрішньовенно ввести:
A *10 мл 10%-го розчину хлориду кальцію
B 40 мл 0,9%-го розчину хлориду кальцію
C 10 мл 40%-го розчину глюкози
D 10 мл 4%-го розчину натрію гідрокарбонату
E 1 мл 1%-го розчину дімедролу

108При переливанні крові проба на індивідуальну сумісність за системою АВ0 проводиться з?
A *Кров'ю донора і сироваткою реципієнта
B Кров'ю донора і кров'ю реципієнта
C Кров'ю реципієнта і сироваткою крові донора
D Сироваткою крові донора і реципієнта
E Кров'ю донора і стандартними сироватками

109Потерпілий, 30-ти років 10 хвилин тому випадково вилив на ліву китицю розчин соляної кислоти. Скарги на пекучі болі у ділянці китиці. Об'єктивно: на тильній поверхні лівої китиці гіперемія шкіри, набряк. Вкажіть першочергову дію при наданні першої медичної допомоги:
A *Промити рану на протязі 5-15 хв. уменем холодної води
B Промити рану на протязі 5-15 хв. 2%-им розчином соди
C Промити рану на протязі 15 хв. струменем 3%-им розчином перекесу водню
D Накласти на рану асептичну пов'язку
E Накласти на рану пов'язку з 20%-им розчином глюкохи

110У потерпілого на стопі різана рана. Профілактику якого захворювання необхідно проводити?
A *Правця
B Газової гангрени
C Дифтерії рани
D Сепсису
E Бешихи

111У хворого 20-ти років на стопі рана з гнійним вмістом. Який розчин застосують для очищення рани від гнійного вмісту?
A *10%-й розчин хлориду натрію
B 10%-й розчин хлориду кальцію
C 3%-й розчин перекису водню
D 5%-й розчин хлориду натрію
E 0,45% розчин хлориду натрію

112У потерпілої на гомілці кусана рана, нанесена лисицею. Яким розчином необхідно промити рану?
A *20% мильним розчином
B 3% розчином перекису водню
C 3% розчином пермагенату калію водню
D Дистильваною водою
E 3% розчином хлориду натрію

113На ФАП доставлена хвора з різкими болями в животі, нудотою, блюванням. Хворій діагностовано “Гострий живіт”. Надайте першу медичну допомогу:
A *Прикласти холод на живіт
B Ввести знеболюючі та спазмолітики
C Ввести тільки знеболюючі
D Ввести тільки спазмолітики
E Провести очисну клізму

114Що робити з хворим з защемленою грижею, якщо під час транспортування хворого у медичний заклад грижа самостійно вправилась?
A *Транспортувати в медичний заклад
B Відправити хворого додому
C Ввести знеболюючі
D Ввести спазмолітини
E Ввести антибіотики

115Потерпілий 25-ти років доставлений після автодорожньої пригоди. Скарги на різкі болі в ділянці тазу, неможливість рухати кінцівками. При пальпації тазу різкі болі в ділянці лобкових кісток. Активні рухи в нижніх кінцівках обмежені, позитивний симптом “прилиплої” п’яти. Як необхідно виконати транспортну імобілізацію?
A *Укласти на тверді ноші у положенні “жаби”
B Укласти на тверді ноші на живіт
C Укласти на звичайні ноші на спину
D Накласти шину Дітеріхса
E Накласти шину Крамера

116У потерпілого діагностовано рану на грудної клітки. При диханні в рані чути присмоктування повітря. Під час видиху з рани з кров’ю виділяються бульбашки газу. На стороні ушкодження дихання не вислуховується. Надайте першу медичну допомогу:
A *Накласти на рану оклюзійну пов’язку
B Накласти на рану асептичну пов’язку
C Накласти на рану стискальну пов’зку
D Накласти на рану пов’язку з 10%-м розчином натрію хлориду
E Накласти на рану хрестовину пов’язку

117Потерпілому надається перша медична допомога на місці події. Об’єктивно: в нижній частині лівого стегна по зовнішній поверхні рана з якої струменем витікає кров темного кольору. Який метод тимчасової зупинки кровотечі оберете?
A *Давляча пов’язка
B Накладання джгута
C Згинання кінцівок в суглобі
D Пальцеве притиснення артерії
E Тампонада рани

118Потерпілий 24 роки впав на витягнуту руку. Скарги на болі, обмеження рухів в лівому стегновому суглобі. Об’єктивно: ліва верхня кінцівка в вимушеному

положенні, плечовий суглоб деформований. При пальпації визначається вільна від головки плеча суглобова впадина. Активні рухи в суглобі відсутні, пасивні - болючі. Встановіть попередній діагноз:
A *Вивих плеча
B Вивих ключиці
C Забій плеча
D Перелом плеча
E Розрив зв'язок плеча

119Жінка 35-ти років скаржиться на розпираючий біль в рані правої стопи, яку отримала 5 днів тому, підвищення температури тіла. Об'єктивно: тильна поверхня правої стопи різко набрякла. Шкіра багряного кольору з множинними гематомами. При пальпації: навколо рани крепітація. Про яка ускладнення можна подумати?
A *Газова гангрена
B Правець
C Нагноєння рани
D Сепсис
E Дифтерія рани

120Чоловік 25-ти років скаржиться на головну біль, нудоту, блювання. Зі слів 12 годин тому отримав травму голови, була короткочасна втрата свідомості, після чого почував себе задовільно. Об'єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви бліді, ліва зіниця дещо ширша, носогубна складка зліва згладжена, кінчик язика відхиляється вліво. Встановіть попередній діагноз:
A *Стиснення головного мозку
B Забій головного мозку
C Струс головного мозку
D Перелом кісток основи черепа
E Перелом кісток склепіння черепа

121Жінка 40-ка років скаржиться на часте і болюче сечевипускання, часті позиви на сечопуск, біль в низу живота, підвищення температури тіла. Захворіла раптово після переохолодження. Об'єктивно: при пальпації живота біль в надлобковій ділянці. Сеча візуально мутна, містить кров. Пульс - 88/хв., температура тіла - 38,6°*C*. Встановіть попередній діагноз:
A *Гострий цистит
B Гострий коліт
C Загострення хронічного пієлонефриту
D Приступ ниркової коліки
E Гострий уритрит

122Жінка 40-а років скаржиться на біль в правому підребір'ї з іррадіацією в праве плече, лопатку, нудоту, часте блювання жовчю. Захворіла після надмірного вживання жирної їжі. При пальпації живота напруження м'язів, різка болючість в правому підребір'ї. Різко болюче постукування по правій реберній дузі. Встановіть попередній діагноз:
A *Гострий холецистит
B Гострий панкреатит
C Гострий аднексит

D Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки
E Правобічна ниркова коліка

123Ви - акушерка ФАПу. Вас викликали додому до жінки 58-ми років, яка страждає на варикозну хворобу. При обстеженні: на внутрішній поверхні обох гомілок і стегон під шкірою визначаються синього кольору вузлувато розширені вени. В нижній третині правої гомілки - рана, з якої витікає кров темним безперервним струменем. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Венозна кровотеча
B Артеріальна кровотеча
C Паренхіматозна кровотеча
D Капілярна кровотеча
E Дифузне просочування кров'ю тканин

124Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернувся чоловік 63-х років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, щільний інфільтрат діаметром до 5 см, шкіра над ним яскраво-червона, в центрі інфільтрату є декілька отворів,з яких виділяється густий зелений гній. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Карбункул
B Фурункул
C Бешиха
D Флегмона
E Абсцес

125Ви акушерка пологового відділення, за призначенням лікаря, жінці 24-х років, після пологів провели переливання 1200 мл одногрупної, консервованої цитратом натрію, крові. Під час переливання жінка скаржилась на похолодання кінцівок, після переливання виникли загальні судоми, жінка втратила свідомість. Що стало найбільш вірогідною причиною даного ускладнення?
A *Цитратний шок
B Гемотрансфузійний шок
C Гемотрансфузійна реакція
D Алергічна реакція
E Пірогенна реакція

126Жінці 34-х років, після пологів провели переливання 500 мл одногрупної, консервованої цитратом натрію, еритроцитарної маси. Під час переливання жінка скаржилась на похолодання кінцівок, після переливання виникли загальні судоми. Встановлений діагноз: цитратний шок. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?
A *Ввести 10 мл 10% р-ну кальцію хлориду
B Ввести 10 мл 10% р-ну калію хлориду
C Ввести 20 мл 10% р-ну кальцію хлориду
D Ввести 1 мл 1% р-ну димедролу
E Ввести 20 мл 40% р-ну глюкози

127Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернулась жінка 45-ти років зі скаргами на сильний біль у правому підребер'ї, що має іррадіацію у праву лопатку та праве плече. Пальпаторно:відмічається болючість у правому підребер'ї,визначається

позитивний симптом Ортнера праворуч та Образцова. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гострий холецистит
B Гострий панкреатит
C Гострий апендицит
D Гостра кишкова непрохідність
E Перитоніт

128До ФАПу звернувся постраждалий хлопчик 14-ти років, який отримав хімічний опік кисті лугами. Об'єктивно: ушкоджена поверхня має м'який, пухкий, з нечіткими контурами струп, при спробі його усунути кровотечі немає. Яка найбільш доцільна тактика при наданні долікарської допомоги?
A *Промити струменем холодної води
B Накласти асептичну пов'язку
C Ввести знеболюючі
D Накласти пов'язку з маззю
E Промити розчином 2% лимонної кислоти

129Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернувся чоловік із скаргами на біль у правому плечі, передпліччі, передній поверхні правого стегна. З анамнезу відомо, що близько 30 хвилин тому чоловік перекинув на себе відро з окропом. Опікові поверхні вкриті пухирями із рідким, серозним вмістом, світло-жовтого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Опік II ступеня
B Опік I ступеня
C Опік III А ступеня
D Опік III Б ступеня
E Опік IV ступеня

130Ви надаєте допомогу постраждалому з електротравмою. Постраждалий без свідомості, тримає в руках електричний дріт. З чого Ви почнете надання невідкладної допомоги?
A *Звільнити від дії електричного струму
B Викликати швидку допомогу
C Розпочати ШВЛ
D Провести непрямий масаж серця
E Дати понюхати ватку з 10% розчином аміаку

131Ви оглядаєте чоловіка 42-х років з приводу поранення у грудну клітку. Хворий займає вимушене напівсидяче положення, дихання поверхневе, утруднене, з участю допоміжних м'язів. В п'ятому міжребер'ї праворуч знайдена лінійна рана довжиною - 2,5 см. При вдиху повітря з характерним свистом засмоктується у грудну клітину, на видиху - повітря не виходить з плевральної порожнини. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Клапанний пневмоторакс
B Закритий пневмоторакс
C Відкритий пневмоторакс
D Гемоторакс
E Гемопневмоторакс

132Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернувся юнак 18-ти років зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання, *t*° - 38°*C*. Об'єктивно; в правій здухвинній ділянці відмічається напруження м'язів передньої черевної стінки, пальпація цієї області різко болюча, симптоми Ровзінга, Сітковського, Раздольського, Щьоткіна-Блюмберга позитивні. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гострий апендицит
B Гострий холецистит
C Гострий панкреатит
D Гостра кишкова непрохідність
E Гострий пієлонефрит

133У жінки 37-ми років після проведення кесарського січення, на другий день після операції в нижній частині живота визначається округле випинання. Пальпація його викликає біль та позиви до сечовипускання, при перкусії живота виявлено притуплення у нижній частині. Яке ускладнення виникло?
A *Гостра затримка сечі
B Защемлення грижі живота
C Гострий цистит
D Гострий ендометрит
E Розрив сечового міхура

134До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на болі в правій паховій ділянці, нудоту,блювання. Упродовж 2-х років має правобічну пахову килу. 6 годин тому грижове випячування збільшилось, самостійно не вправляється. Жінку турбують сильні болі в ділянці грижі, вона стала напружена, болюча. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Защемлена пахова грижа
B Гостре захворювання яєчника
C Неускладнена пахова грижа
D Ретроградна пахова грижа
E Невправима грижа

135Ви - акушерка ФАПу. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами на біль в ділянці відхідника, що посилюється при акті дефекації, підвищення *t*° - 37,8°*C*. вважає себе хворим у продовж 3-х днів. При обстеженні: навколо відхідника гіперемія шкіри, набряк, при пальпації визначається болісне ущільнення. При пальцевому ректальному обстеженні - болючість бокової стінки прямої кишки. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гострий парапроктит
B Геморой
C Тріщина заднього проходу
D Поліп прямої кишки
E Рак прямої кишки

136До акушерки на ФАП звернувся пацієнт, якому добу тому було накладено гіпсову пов'язку на праву нижню кінцівку. Скаржиться на посилення болю в кінцівці, заніміння пальців, набряк. Які втручання повинна здійснити акушерка?
A *Розрізати гіпсову пов'язку та тимчасово укріпити її бинтом

B Зняти гіпсову пов'язку та накласти спіральну бинтову
C Дати знеболюючі та сечогінні засоби
D Створити підвищене положення кінцівки
E Дати знеболюючі та заспокійливі засоби

137До акушерки на ФАП звернулась робітниця 50-ти років зі скаргами на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку та ключицю. Захворіла раптово. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу жовчокам'яної хвороби. Напередодні були порушення дієти. При догляді: живіт напружений, болючий в правому підребер'ї. Симптоми подразнення очеревини позитивні. Які дії акушерки є доцільними?
A *Прикласти міхур з льодом
B Порадити звернутися до терапевта
C Дати випити гарячого чаю
D Ввести спазмолітичні препарати
E Ввести знеболюючі препарати

138У пацієнта, 41 рік, хірургічного відділення, хворого на виразкову хворобу шлунку різко виникли слабкість, запаморочення, блювання "кавовою гущею". При огляді: шкірні покрови бліді, вологі, пульс - 120/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/60 мм рт.ст. Живіт м'який, болісний в епігастральній ділянці. Про яке ускладнення повинна думати чергова акушерка?
A *Шлункова кровотеча
B Кровотеча з нижнього відділу кишківника
C Перфорація виразки шлунку
D Пенетрація виразки шлунку
E Напад гострого холециститу

139До лікувального закладу транспортують потерпілого з черепно-мозковою травмою. З метою зниження набряку мозку застосують:
A *Дегідраційну терапію
B Наркотичні засоби
C Анальгетичні засоби
D Гіпотензивні засоби
E Судинорозширювальні засоби

140Хворий скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї, що іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, повторне блювання. Яка найбільш ймовірна патологія?
A *Гострий холецистит
B Перфорація виразки шлунка
C Гострий панкреатит
D Гострий апендицит
E Ниркова колька

141На 7-му добу, після операції з приводу перитоніту хворий скаржиться на переймоподібний біль в животі, блювання, здуття живота, затримку стільця протягом 7 діб. З чим пов'язані проблеми хворого?
A *Кишкова непрохідність

B Внутрішньочеревна кровотеча
C Абсцес черевної порожнини
D Гострий панкреатит
E Гострий холецистит

142Жінка 25-ти років звернулась до акушерки жіночого оглядового кабінету зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 38°*C*. Живіт болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Що з переліченого повинна здійснити акушерка?
A *Терміново госпіталізувати
B Спостерігати
C Викликати родичів
D Відпустити додому
E Промити шлунок

143Хворий, 30-ти років, поступив у хірургічне відділення зі скаргами на біль у ділянці рани і посмикуванням м'язів, набряк кінцівки, підвищення температури тіла. З рани виділяються пухирці газу з невеликою кількістю сукровичної рідини. Шкіра холодна на дотик, на ній темно-червоні плями. Під час пальпації кінцівки чути крепітацію. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A *Газова гангрена
B Правець
C Ангіна
D Флегмона
E Бешиха

144Хворий 27-ми років, поступив у лікарню після травми живота. Скарги на біль в животі, припинення виділення сечі, здуття живота. При пальпації живота відмічається напруження м'язів, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. У черевній порожнині є рідина, яка переміщується при зміні положення хворого. З чим пов'язана проблема пацієнта?
A *Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура
B Гострий цистит
C Гострий аппендицит
D Позачеревне ушкодження сечового міхура
E Гострий пієліт

145Пацієнту 32 роки. Кілька хвилин тому, працюючи в коморі, перекинув пляшку з азотною кислотою. При огляді: в ділянці гомілки жовтий струп, болючість. Який нейтралізуючий засіб слід застосувати?
A *2% розчин гідрокарбонату натрію
B Вапняне молоко
C Гліцерин
D 5% розчин міді сульфату
E 5% розчин натрію тіосульфату

146Ви з лікарем визначаєте групу крові хворому за допомогою цоліклонів анти-А

та анти-В. Аглютинація не відбулась. Яка у хворого група крові?
A *0(I)
B АВ(IV)
C В(III)
D А(II)
E Помилка при визначенні

147За допомогою чого проводять активно-пасивну профілактику правця за наявності ран у нещепленого пацієнта?
A *ППС 3000 МО+1,0 ПА
B ППС 3000 МО
C ПА 1,0
D ППС 1:100 МО+ПА
E ПА - 0,5 мл

148В хірургічне відділення доставлена хвора, яка скаржиться на біль і випинання в правій паховій ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій паховій ділянці болісне щільне випинання, яке не піддається вправленню. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?
A *Защемлена пахова грижа
B Гострий лімфаденіт
C Туберкульоз лімфатичних вузлів
D Абсцес правої пахвинної ділянки
E Ниркова колька

149На прийом звернулася жінка зі скаргами на переймоподібні болі в попереку зліва, які віддають в статеві органи, часте сечовипускання. При огляді: пацієнтка неспокійна, часто міняє положення внаслідок нестерпного болю. Який симптом найбільш інформативний для уточнення діагнозу?
A *Симптом Пастернацького
B Симптом Щьоткіна-Блюмберга
C Симптом Ровзінга
D Симптом Ситковського
E Симптом Воскресенського
150У хворої 40-а років з виразковою хворобою шлунку, після фізичного напруження раптово з'явився "кинджальний" біль у верхніх відділах живота, напруження м'язів передньої черевної стінки, притуплення перкуторного звуку у бокових фланках живота, швидке погіршення загального стану, позитивний симптом Щьоткина-Блюмберга. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку найбільш вірогідне?
A *Перфорація
B Шлункова кровотеча
C Перитоніт
D Евентрація
E Пенетрація

151У хворої 50-ти років після накладання трахеостоми навкруги трубки з'явились почервоніння шкіри, припухлість, болючість, місцями ерозії з незначними прозорими виділеннями. Який догляд за трахеостомою є найбільш доцільним в

даному випадку?
A *Обробити 1% розчином діамантового зеленого
B Під щиток трубки підкласти марлеву серветку
C Обробити камфорним спиртом
D Нанести пасту Лассара на шкіру
E Обробити 70% етиловим спиртом

152На ФАП обратился больной с вывихом ключицы. Какую повязку нужно наложить в качестве оказания ПМП с целью профилактики осложнений?
A *Дезо
B Спиральная
C Колосовидная
D Гипсовая
E Черепашья

153На ФАП обратился больной после операции с паховой грыжей. Какие рекомендации вы дадите больному с целью профилактики повторного появления грыжи?
A *Ограничить поднятие тяжести
B Срочная операция
C Экстренная I порядка
D Экстренная II порядка
E Операция не нужна

154На ФАП обратился больной с жалобами на боль в правой подключичной области. Во время работы упал, ударившись правым плечом. Объективно: движение в правом плечевом суставе резко ограничены, ключица в средней трети деформирована. При пальпации в месте деформации определяется крепитация. Предполагаемый диагноз:
A *Перелом ключицы
B Ушиб плеча
C Перелом плеча
D Ушиб ключицы
E Растяжение связок

155Акушерка вызвана на дом к больной с острым аппендицитом. Какая помощь должна быть оказана больной?
A *Положить пузырь со льдом
B Ввести анальгин
C Ввести спазмолитики
D Рекомендовать обратиться к гастроэнтерологу
E Оставить больного дома

156На ФАП обратился больной с переломом предплечья. Укажите уровень транспортной иммобилизации:
A *От кончиков пальцев кисти до в/3 плеча
B От кончиков пальцев кисти до локтевого сустава
C От локтевого сустава до плечевого сустава повреждённой конечности
D От с/3 предплечья до локтевого сустава

E От лучезапястного сустава до плечевого сустава

157На ФАП обратился больной 60-ти лет с жалобами на резкую потерю веса в течении 1,5 мес. В анамнезе: нерегулярное питание, слизисто-гнойное выделение из прямой кишки, чередующиеся с запорами, приступообразная боль в животе, боль при акте дефекации, ложные позывы. Какие рекомендации вы можете дать больному?
A *Обратиться к онкологу
B Обратиться к терапевту
C Обратиться к гастроэнтерологу
D Назначить диету
E Назначить анальгин

158На ФАП обратилась женщина, которая повредила голень в области средней третьей. При осмотре: рана 2х1 см, из раны непрерывной струей вытекает кровь темного цвета. Определите вид кровотечения?
A *Венозное
B Артериальное
C Паренхиматозное
D Капиллярное
E Смешанное

159На ФАПе проводилась обработка колотой раны стопы. Рану промыли, края обработали йодонатом и наложили асептическую повязку. Через неделю после травмы появилось подергивание жевательных и мимических мышц лица. Какие ошибки были допущены?
A *Не провели профилактику столбняка
B Не наложили герметическую повязку
C Не наложили повязку с мазью Вишневского
D Не наложили повязку с гипертоническим раствором
E Не провели обезболивание

160Какой путь распространения инфекции вы предупреждаете на ФАПе, одев стерильный халат, маску, колпачок при выполнении малых операций?
A *Воздушно-капельный
B Контактный
C Имплантационный
D Лимфогенный
E Гематогенный

161Как называется способ переливания крови, при котором женщине после Кесарева сечения переливают ее же заранее заготовленную кровь?
A *Аутогемотрансфузия
B Реинфузия
C Прямой
D Непрямой
E Обратный

162С помощью какой аппаратуры можно провести стерилизацию инструментов

на ФАПе?
A *Сухожарового шкафа
B Автоклава
C Ионизатора
D Газовой камеры
E Кипятильника

163Какой вид уборки должен быть проведен на ФАПе в конце рабочего дня?
A *Заключительная
B Текущая
C Предварительная
D Генеральная
E Влажная

164Каково наиболее опасное осложнение при повреждении вен шеи, а особенно яремной вены?
A *Воздушная эмболия
B Нагноение раны
C Эвентрация
D Развитие тромбообразование
E Болевой шок

165Школьник, который на перемене ударился головой об стенку на несколько секунд потерял сознание. Ваша тактика:
A *Госпитализация в нейрохирургическое отделение
B Холод на голову и отправите домой
C Пусть продолжает занятия в школе
D Необходима госпитализация в неврологию
E Отправите на рентгенографию

166К вам на ФАП обратилась беременная женщина с жалобами на болезненность и жгутообразное утолщение подкожных вен левой нижней конечности, повышение температуры тела. Ваша тактика:
A *Госпитализация в экстренную хирургию в горизонтальном положении
B Дать направление в городскую поликлинику
C Вызвать на себя сосудистого хирурга
D Положить компресс и отправить домой
E Дать антикоагулянты

167На ФАП доставлен пациент с ножевым ранением грудной клетки слева. Из раны на вдохе и выдохе слышны свистящие звуки. Ваша тактика:
A *Наложить окклюзионную повязку
B Обезболить и оставить под наблюдением на ФАПе
C Наложить асептическую повязку на рану
D Наложить шину Крамера и оставить на ФАПе
E Сделать ЭКГ и отправить в кардиологию

168Какие достоверные признаки необходимо проверить при подозрении на

перелом ребер?
A *Усиление боли при осевой нагрузке
B Симптом Кохера-Волковича
C Симптом лигатуры
D Наличие гематомы
E Симптом Мерфи

169Для какого заболевания характерны доскообразный живот, резкая кинжальная боль и положительный симптом Щеткина-Блюмберга?
A *Перфорация
B Пенетрация
C Стенозирование
D Малигнизирование
E Кровотечение

170Пациент на пятые сутки после ПХО раны бедра выписан из стационара для дальнейшего наблюдения на ФАПе. На какие сутки вы запланируете снятие швов?
A *На 6-7 сутки
B На 9-10 сутки
C На 10 день
D На 12 сутки
E На 20-е сутки

171На ФАПе пациенту был диагностирован открытый перелом голени. С чего начать неотложную помощь?
A *Остановки кровотечения
B Обезболивания
C Иммобилизации
D Фиксации
E Скелетного вытягивания

172В подмышечной области слева у пациента имеется гиперемия, отек, резкая боль. О каком заболевании следует думать?
A *Гидраденит
B Лимфаденит
C Рожистое воспаление
D Злокачественная опухоль
E Туберкулез легких

173Вы фельдшер скорой помощи. Осматривая пациента с ранением бедра вы заметили резкий нарастающий отек вокруг раны и крепитацию мягких тканей вокруг раны по типу звука лопающихся пузырей. Ваш предварительный диагноз:
A *Газовая гангрена
B Рожистое воспаление
C Тромбофлебит
D Инфицирование раны
E Лимфангит

174К вам обратился пациент с жалобами на боли в области мошонки, отек здесь же и повышение температуры тела до 38°*С*. Ваша тактика:
A *Срочно направить в урологическое отделение
B Направление на рентгенографию
C Направить к терапевту
D Дать антибиотики и отправить домой
E Направить к кожвенерологу

175У беременной женщины срок 20 недель появились резкие боли в пояснице с иррадиацией в пах, дизурические явления. При мочеиспускании признаки гематурии. Для какого заболевания характерна данная симптоматика?
A *Мочекаменная болезнь
B Угроза выкидыша
C Острый аппендицит
D Апоплексия яичника
E Внематочная беременность

176Вы работаете акушеркой в роддоме. При определении группы крови методом цоликлонов через 3 минуты наступила агглютинация с Цоликлоном анти-А, а с Цоликлоном анти-В не наступила агглютинация. Какая это группа крови?
A *Вторая группа
B Четвёртая группа
C Третья группа
D Сомнительная группа
E Первая группа

177Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулась на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та правій підреберній ділянках оперізуючого характеру, багаторазое блювання. Об'єктивно: пульс - 120/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт при пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Попередній діагноз:
A *Гострий панкреатит
B Гострий гастрит
C Загострення виразкової хвороби шлунка
D Гострий апендицит
E Гострий холецистит

178Ви працюєте акушеркою у гінекологічному відділенні. Хвора після операції з приводу фіброміоми матки, скаржиться на здуття живота, невідходження газів. Про що можна думати?
A *Парез кишківника
B Хворобу Крона
C Виразкову хворобу шлунку
D Гострий коліт
E Механічну кишкову непрохідність

179До акушерки звернулася пацієнтка 25-ти років зі скаргами на набряк і біль у II-III пальцях обох нижніх кінцівок (збільшуються під дією холоду). З анамнезу з'ясовано, що захворювання з'явилося рік тому і проявлялося зблідненням шкіри

пальців. Об'єктивно: пульсація артерій збережена. Шкіра на пальцях ціанотична, мало чутлива. Вкажіть діагноз, для якого характерні дані симптоми:
A *Хвороба Рейно
B Тромбофлебіт глибоких вен
C Тромбофлебіт поверхневих вен
D Облітеруючий ендартеріїт
E Облітеруючий атеросклероз

180До акушерки ФАПу звернувся чоловік 74-х років зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, який посилюється вночі, оніміння пальців стоп. Шкіра бліда, холодна, суха, виражена гіпертрофія м'язів обох гомілок, відсутня пульсація на підколінних артеріях. Яке захворювання ви запідозрите?
A *Облітеруючий атеросклероз
B Облітеруючий ендартериїт
C Хвороба Рейно
D Варикозна хвороба
E Посттромбофлебітичний синдром

Анестезіологія та реанімація

1У пацієнта 34-х років спостерігається загальна слабкість, запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, блідість шкірних покривів, сповільнення пульсу, зниження артеріального тиску, порушення свідомості. Для якого стану це характерно?
A *Колапсі
B Набряку легень
C Інфаркті міокарда
D Кардіогенному шоці
E Серцевій астмі

2На яку глибину потрібно притиснути грудину до хребта виконуючи непрямий масаж серця у дорослих?
A *4-5 см
B 1-2 см
C 3-4 см
D 2-3 см
E 5-6 см

3Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні серцево-легеневої реанімації:
A *2 вдихи - 30 компресій
B 5 вдихів - 2 компресії
C 1 вдих - 5 компресій
D 15 вдихів - 2 компресії

E 10 вдихів - 5 компресій

4Скільки часу проводиться серцево-легенева реанімація?
A *30-40 хвилин
B До 5 хвилин
C До 35 хвилин
D До 1 години
E 20 хвилин

5Дефібриляцію серця проводять:
A *До тих пір доки на ЕКГ реєструється фібриляція
B 3-5 разів
C Не більше 10 разів
D Не довше, ніж протягом 1 години
E До тих пір, поки на ЕКГ реєструється асистолія

6На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання, пульс та артеріальний тиск не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?
A *Клінічна смерть
B Передагональний стан
C Агонія
D Колапс
E Травматичний шок

7При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево-легеневу реанімацію. Яке співвідношення вдохів та натискань на грудину при проведенні серцево-легеневої реанімації?
A *2:30
B 2:5
C 3:5
D 2:15
E 10:15

8На ФАП доставили потерпілого після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені, відсутній пульс на сонних артеріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в першу чергу:
A *Негайно розпочати СЛР
B Зняти ЕКГ
C Виміряти АТ
D Транспортувати у ВАІТ
E Покликати на допомогу лікаря

9Яка Ваша першочергова дія, якщо потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення? В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання:
A *Розпочати серцево-легеневу реанімацію
B Викликати міліцію
C Ввести в/в 1 мл 0,05% розчину строфантину
D Викликати ШМД

E Нічого не робити, бо є ознаки смерті

10Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Народився живий доношений хлопчик масою - 3220 г, довжиною - 50 см, без дихання. ЧСС- 40/хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м'язів. Яка невідкладна допомога?
A *ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно - адреналін
B Закритий масаж серця, внутрішньвенно гідрокарбонат натрію
C ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію
D ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно - глюкозу
E Закритий масаж серця, внутрішньовенно - адреналін, глюкоза

11У потерпілого 19-ти років констатована клінічна смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?
A *Пульсація на сонній артерії
B Пасивні рухи грудної клітки
C Зниження температури тіла
D Відсутність свідомості
E Розширені зіниці
12Пацієнт 32 роки, скаржиться на напади ядухи з утрудненим видиханням. Наприкінці нападу тяжко відходить невелика кількість склистого мокротиння. Найімовірніший діагноз:
A *Астматичний статус
B Гемічна гіпоксія
C Серцева астма
D Гострий бронхіт
E Пневмонія

13Проводячи реанімаційні заходи протягом 15 хв., ви відзначили звуження зіниць, порожевіння шкіри, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?
A *Продовжувати реанімаційні заходи
B Припинити реанімацію
C Замінити метод "рот до рота" на ручні методи
D Припинити ШВЛ, продовжити масаж серця
E Припинити реанімаційні заходи до повторного розширення зіниць

14Виберіть метод виведення отрути з шлунково-кишкового тракту в умовах ФАПу:
A *Промивання шлунку
B Гемодіаліз
C Гемосорбція
D Плазмоферез
E Форсований діурез

15В разі отруєння якою речовиною антидотом є етиловий спирт:
A *Метиловим спиртом
B Фосфоро-рганічною речовиною
C Кислотами

D Лугами
E Грибами

16Акушерка ФАПу дагностувала клінічну смерть. Для звільнення верхніх дихальних шляхів у разі западання язика акушерка використовує потрійний прийом Сафара. Який із зазначених моментів відноситься до цього прийому?
A *Вивести нижню щелепу
B Повернути голову на бік
C Закрити ніс
D Використати язикотримач
E Ввести повітровод

17При гострому отруєнні фосфорорганічними речовинами, який треба використати антидот:
A *Атропін
B Унітіол
C Ліпоєву кислоту
D Налоксон
E Етиловий спирт

18У хворої після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явились різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворої важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії акушерки?
A *Обколоти 0,1% адреналіном
B Ввести еуфілін
C Ввести 20% розчин кофеїну
D Покласти грілку
E Ввести строфантин

19У пацієнтки 43-х років, через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна слабість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:
A *Стану гіпоглікемії
B Печінкової коми
C Гіперглікемічної коми
D Гіперосмолярної коми
E Гіперлактацедемічної коми

20Во время приема пищи у пациента 28-ми лет, внезапно возникла инспираторная одышка, приступообразный кашель, цианоз лица, осиплость голоса, пострадавший возбужден, судорожно обхватывает руками шею. Какое мероприятие неотложной помощи необходимо выполнить?
A *Прием Геймлиха
B Постуральный дренаж
C ИВЛ
D Тройной метод Сафара
E Трахеостомия

21У пациента 67-ми лет, после физической нагрузки возникла сильная боль за

грудиной с иррадиацией в левую руку. Боль длится более 30 мин. и не купируется нитроглицерином. На ЭКГ - дуга Парди. Ваш диагноз:
A *Острый инфаркт миокарда
B Стенокардия напряжения
C Кардиогенный шок
D Острая левожелудочковая недостаточность
E Острая правожелудочковая недостаточность

22Через какой промежуток времени следует проводить контроль реанимационных действий?
A *2 минуты
B 5 минут
C 7 минут
D 10 минут
E 1 минуту

23Какова клиническая картина отравления метанолом или “техническим спиртом”?
A *Двоение в глазах
B Слюнотечение
C Дисфагия
D Дизурия
E Диспепсия

24Після інтубації трахеї та переведення пацієнта на апаратну ШВЛ медсестра-анестезистка зауважила відставання в акті дихання лівої половини грудної клітки. В даному випадку кінець інтубаційної трубки розміщений в:
A *Правому головному бронху
B Лівому головному бронху
C Проміжному бронху
D Бронху нижньої частки справа
E Бронху нижньої частки зліва

25Мужчина 69-ти років готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:
A *Спинномозкова анестезія
B Нейролептаналгезія
C Внутрішньовенний наркоз
D Атаралгезія
E Ендотрахеальний наркоз

26Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до пацієнтки 32-х років з цукровим діабетом І-го типу, в якої з’явилась нудота, блювання, біль в животі, сонливість. Об’єктивно: Ps- 125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст., шкіра суха. Дихання Куссмауля. Язик сухий. Запах ацетону з рота. Поставте найімовірніший діагноз:
A *Кетоацидотична кома
B Анафілактичний шок
C Гіпоглікемічна кома

D Непритомність
E Гіперосмолярна кома

27Потерпілого витягли з води через 4 хвилини після утоплення. Об'єктивно: шкіра бліда, дихання відсутнє, зіниці розширені, не реагують на світло. Вкажіть місце, де необхідно перевірити пульс:
A *На сонних артеріях
B На ліктьових артеріях
C На підколінних артеріях
D На черевній аорті
E На променевих артеріях

28Електрик отримав удар електричним струмом 2 хвилини тому. Пацієнт без свідомості, дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Вкажіть першочергові дії медичного працівника:
A *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
B Дати понюхати ватну кульку, змочену нашатирним спиртом
C Розпочати непрямий масаж серця
D Розпочати штучну вентиляцію легень
E Чекати на прибуття реанімаційної бригади

29У пацієнтки 30-ти років, шлункова кровотеча. Призначено переливання крові A(II) групи, Rh(-) негативний в кількості 2 літрів. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку:
A *10% розчин кальцію хлориду
B 1% розчин кальцію хлориду
C 5% розчинглюкози
D 1% розчин димедролу
E 50% розчин анальгіну

30Ви акушерка ФАПУ. Потерпілий 40-ка років після дорожньо-транспортної пригоди в стані непритомності, не визначається пульс на сонних артеріях, дихання відсутнє, зіниці розширені, рефлекси відсутні, шкіра блідо-сірого кольору. Визначте стан тяжкості потерпілого:
A *Клінічна смерть
B Агонія
C Преагонія
D Дуже тяжкий
E Середньої тяжкості

Інфектологія

1У інфекційне відділення доставили пацієнта у тяжкому стані зі скаргами на тривалу гарячку, нічну пітливість, періодично виникаючий пронос, значне схуднення. З анамнезу відомо, що він - особа, що вживає ін'єкційні наркотики. Яке захворювання можна запідозрити?
A *ВІЛ-інфекцію
B Сепсис
C Черевний тиф
D Лихоманку неясного генезу
E Герпетичну хворобу

2Пацієнт госпіталізований в інфекційне відділення зі скаргами на гарячку (39 °*C*), загальну слабкість, багаторазове блювання, біль у животі, часті випорожнення із зеленкуватим відтінком. З анамнезу відомо, що вчора пацієнт вживав сирі яйця. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Сальмонельоз
B Черевний тиф
C Ботулізм
D Ешеріхіоз
E Шигельоз

3У пацієнта з'явилися розлади випорожнень, кал рідкий, слизово-кров'янистий, що супроводжується болем по ходу прямої кишки під час дефекації. Для якого захворювання це характерно?
A *Шигельоз
B Сальмонельоз
C Ботулізм
D Черевний тиф
E Харчову токсикоінфекцію

4У пацієнтки, що відпочивала на морі, з'явилися пронос у вигляді рисового відвару, блювання, виражена спрага. Ці ознаки не супроводжувалися болем, нудотою. Симптоми вказують на розвиток:
A *Холери
B Паратифу А
C Шигельозу

D Ешерихіозу
E Сальмонельозу

5У пацієнта скарги на біль в суглобах, м'язах. Два дні тому з'явилася жовтяниця, відчуття тяжкості у правому підребер'ї. Об'єктивно: суглоби без зовнішніх змін, збільшена печінка, іктеричність склер і жовтяниця шкіри, темнобурого кольору сеча. З епіданамнезу відомо, що 2 місяці тому перенесла операцію. Який діагноз найбільш вірогідний?
A *Вірусний гепатит В
B ВІЛ-інфекція
C Вірусний гепатит А
D Бруцельоз
E Лептоспіроз

6У пацієнта зі скаргами на біль у горлі при ковтанні при об'єктивному обстеженні виявлені запальні явища у ротоглотці, на мигдаликах щільний сірувато-білий фібринозний наліт, міцно спаяний з прилеглими тканинами, що тяжко знімається. Яке захворювання найбільш вірогідне?
A *Дифтерія
B Грип
C Ангіна
D Інфекційний мононуклеоз
E Туляремія

7На ФАПі акушерка обстежує пацієнтку з уродженим токсоплазмозом. Ураження яких органів найчастіше зустрічаються при уродженому токсоплазмозі?
A *Вади серця, ураження очей, ЦНС
B Ураження органів дихання
C Ураження органів травлення
D Ураження нирок, опорно-рухового апарату
E Ураження ендокринних заліз

8У пацієнта, хворого на холеру, виражені ознаки дегідратації з порушенням водно-сольового обміну. Вкажіть, що призвело до цього стану:
A *Пронос, блювання
B Тенезми
C Закріп
D Нудота, біль в животі
E Спрага, блювання

9На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на головний біль, двоїння в очах, порушення ковтання, серцебиття, м'язову слабкість. Скарги з'явились на другу добу після вживання м'ясних консервів. Про яке захворювання слід подумати в першу чергу?
A *Ботулізм
B Отруєння метиловим спиртом
C Вірусний гепатит
D Харчова токсикоінфекція
E Малярія

10На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на біль при відкриванні рота, жуванні та ковтанні, загальну слабкість, підвищену пітливість, короткочасні скорочення м'язів спини. Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A *Правець
B Сказ
C Менінгоенцефаліт
D Істерія
E Радикуліт
11У пацієнтки з черевним тифом через два тижні після початку захворювання раптово погіршився загальний стан, температура тіла - 36,2°*C*, пульс - 105/хв., у випорожненнях з'явилась кров. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?
A *Кишкова кровотеча
B Інфекційно-токсичний шок
C Перфорація кишок
D Ниркова недостатність
E Печінкова недостатність

12Акушерка пологового будинку повинна провести санітарно освітню бесіду з породіллями про шляхи передачі кишкових інфекцій. Про який шлях передачі буде розповідати акушерка?
A *Фекально-оральний
B Парентеральний
C Повітряно-краплинний
D Повітряно-пиловий
E Трансмісивний

13До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 28-ми років з вагітністю 20 тижнів. При огляді у неї виявлено незначну жовтяницю шкіри та склер очей. Пацієнтка помітила потемніння кольору сечі. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Вірусний гепатит
B Токсоплазмоз
C Нефропатію
D Залізодефіцитну анемію
E Жовчокам'яну хворобу

14Пацієнти з вірусним гепатитом для підтвердження діагнозу мають пройти цілий ряд лабораторних обстежень. Вкажіть основний метод специфічної діагностики вірусного
гепатиту В:
A *Серологічний
B Загальний аналіз крові
C Бактеріологічний
D Мікроскопічний
E Алергічний

15На ФАП поступив пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва, розлади випорожнень: 7-8 разів на добу з домішками слизу та крові. Сигмоподібна ободова кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна

запідозрити в даному випадку?
A *Шигельоз
B Ботулізм
C Сальмонельоз
D Вірусний гепатит
E Холера

16В інфекційний стаціонар поступив пацієнт з підозрою на холеру. Які симптоми виявляються у пацієнта, що мають значення в постановці діагнозу?
A *Гіпотермія, пронос, блювання, спрага, судоми
B Збільшення лімфовузлів, кашель, гарячка, коньюнктивіт
C Жовтяниця шкіри, гарячка, геморагічний синдром, ахолія калу
D Гарячка, порушення свідомості, ригідність потиличних мязів
E Гарячка, метеоризм, розеоли, гепатоспленомегалія

17На ФАП поступив пацієнт із харчовою токсикоінфекцією. Вкажіть першочергові заходи невідкладної допомоги пацієнту з таким захворюванням:
A *Промивання шлунку, клізма, ентеросорбенти
B Промивання шлунку, прийом антибіотиків
C Прийом ентеросорбентів, дезінтоксикаційних
D Парентеральне введення 5% розчину глюкози
E Клізма, прийом ферментних препаратів

18У пацієнта з черевним тифом значно виражені гарячка, метеоризм, закрепи. На який день у нього з'явиться висипка?
A *7-10 день
B 1-2 день
C 10-15 день
D 4-7 день
E 15-20 день

19Пацієнт скаржиться на біль у горлі. При огляді ротоглотки відзначається сіро-білий наліт на мигдаликах, після зняття якого слизова оболонка кровоточить. Для якого захворювання характерні ці ознаки?
A *Дифтерія
B Ангіни
C Стоматиту
D Інфекційного мононуклеозу
E Паратонзиліту

20У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт 36-ти років з діагнозом сальмонельоз. До якого методу лабораторної діагностики в першу чергу слід підготувати пацієнта?
A *Бактеріологічного
B Мікроскопічного
C Серологічного
D Імуноферментного
E Вірусологічного

21Пацієнтка 34-х років, поступила в інфекційний стаціонар на 4-й день хвороби зі скаргами на двоїння в очах, “сітку” перед очима, сухість у роті, утруднення при ковтанні, різку м’язову слабість. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Ботулізм
B Харчові токсикоінфекції
C Поліомієліт
D Інсульт
E Отруєння метиловим спиртом

22Захворювання у пацієнта почалося поступово з головного болю, симптомів інтоксикації, з’явилося жовтяничне забарвлення слизових оболонок та шкіри. Сеча набула темного кольору, кал став знебарвленим. Такий стан свідчить про:
A *Вірусний гепатит
B Лептоспіроз
C Жовчнокам’яну хворобу
D Панкреатит
E Інфекційний мононуклеоз

23До акушерки на ФАП звернулася пацієнтка, у якої було запідозрено ботулізм. Що потрібно зробити негайно хворій жінці з проявами ботулізму в умовах ФАПу?
A *Промити шлунок розчином таніну, сорбенти, поставити сифонну клізму
B Випити велику кількість рідини, поставити очисну клізму
C Дати сорбенти, ввести антибіотики
D здійснювати нагляд за хворим
E Вводити ботулінічну сироватку, антибіотики

24Мама звернулася до акушерки ФАПу з питанням щодо терміну проведення першого щеплення її дитині. Починаючи з якого віку проводяться профілактичні щеплення дітям першого року життя?
A *3 місяці
B 2 тижні
C 1 день життя
D 6 місяців
E 9 місяців

25Дитина народилася у ВІЛ-інфікованої матері. Вона дратівлива, млява, швидко втомлюється, не набирає вагу, температура тіла - субфебрильна. Які дослідження необхідно здійснити в першу чергу?
A *Кров на виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції
B Загальний аналіз крові
C Бактеріологічне дослідження калу
D Обстеження на туберкульоз
E Кров на глюкозу

26Пацієнту з підозрою на сибірку призначили внутрішньошкірну алергічну пробу для проведення якої використовують:
A *Антраксін
B Бруцелін

C Тулярін
D Туберкулін
E Токсоплазмін

27При обстеженні вагітної пацієнтки 22-х років виявлено шигельоз. Вкажіть медичний документ, який треба заповнити акушерці в першу чергу:
A *Термінове повідомлення про інфекційне захворювання
B Журнал реєстрації інфекційних захворювань
C Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги
D Медична карта стаціонарного хворого
E Медична карта амбулаторного хворого

28У вагітної, яка місяць тому повернулась з відрядження до Африки, кожного третього дня відмічається підвищення температури тіла до 39,2°*C*, що закінчуються рясним потовиділенням. Вкажіть метод діагностики, який треба використати для підтвердження діагнозу:
A *Паразитоскопічний
B Серологічний
C Бактеріологічний
D Біологічний
E Клінічний

29На ФАП до акушерки звернувся хворий зі скаргами на підвищення температури тіла 39,5°*C*, гострий початок хвороби, біль в попереку, литкових м'язах, різке зниження кількості сечі, іктеричність склер та шкіри. Про яке захворювання можна подумати:
A *Лептоспіроз
B Бруцельоз
C Вірусний гепатит
D Токсоплазмоз
E Лейшманіоз

30Акушерку викликали до хворої 38-ми років. Захворіла гостро: рясний водянистий стілець, одночасно почалось блювання. До звернення блювання - 3 рази, стілець - 6 разів. При огляді: стан середньої важкості. Скаржиться на слабкість, спрагу. Шкіра бліда, ціаноз губ, риси обличчя загострилися. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Судоми литкових м'язів. Тургор шкіри знижений. Голос ослаблений, температура тіла - 36°*C*. Пульс - 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Число подихів - 34. Живіт при пальпації безболісний. Вкажіть попередній діагноз:
A *Холерний гастрентерит
B Харчова токсикоінфекція, гіповолемічний шок
C Сальмонельоз
D Гостра кишкова інфекція
E Шигельоз

Дерматовенерологія

1Внаслідок перших фізіологічних пологів матір'ю, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації, народився хлопчик з висипкою на долонях і підошвах, що являє собою окремі пухирі до 1,5 см в діаметрі, наповнені серозною рідиною. При бактеріоскопічному обстеженні вмісту висипки виявлено бліду трепонему. Поставте попередній діагноз:
A *Сифілітична пухирчатка
B Вроджена герпетична інфекція
C Іхтіоз
D Звичайна пухирчатка
E Стафілококове імпетиго

2Пацієнт звернувся в шкірвендиспансер зі скаргами на сильний свербіж та наявність висипки. Лікарем поставлений діагноз короста. Назвіть найтиповіші симптоми корости:
A *Висипка в типових місцях, що супроводжується посиленням свербежу ввечері та вночі
B Загальне підвищення температури тіла на початку захворювання
C Місцеве підвищення температури тіла в ділянці висипки
D Посилена ламкість волосся в ділянці ураження
E Висівкоподібне лущення ураженої ділянки шкіри

3На прийом до лікаря звернулась вагітна жінка зі скаргами на свербіж шкіри, що посилюється вночі, виникнення червоних парних вузликів, розчухів. Діагноз "Короста" був підтверджений лабораторно. Який препарат слід використовувати вагітній?
A *Аерозоль "Спрегаль"
B Мазь "Нізорал"
C Мазь "Мірамістін"
D Розчин нітрату срібла
E Розчин перекису водню

4Новонароджена дитина має малу масу тіла, старечий вигляд, на долонях і підошвах пухирі на щільній основі. Про яку хворобу слід подумати?
A *Вроджений сифіліс
B Дерматит
C Вульгарна пухирчатка
D Герпетиформний дерматит Дюрінга
E Імпетіго

5Хворий скаржиться на появу висипу на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів, які покриті сріблястими лусочками з чіткими краями по периферії. Вузлики з'явилися після падіння (фізична травма). Загальний стан не порушений, суб'єктивних симптомів немає. Про яку хворобу слід думати?
A *Псоріаз
B Рожевий лишай Жибера
C Червоний вовчак

D Червоний плоский лишай
E Атопічний дерматит

6При огляді дітей у таборі на педикульоз, виявлено воші. Який препарат необхідно взяти для їх знищення?
A *Нітіфор
B Господарське мило
C Синафлан
D Борний спирт
E Звичайну сірчану мазь

7У дитини 4-х років розповсюджена стрептодермія. При догляді за дитиною необхідно:
A *Не мити
B Мити часто з милом
C Мити часто без мила
D Протирати все тіло розчином фурациліну
E -

8Хворий звернувся в шкірвендиспансер зі скаргами на висипку в ділянці гомілки. Поставлений діагноз глибока стрептококова піодермія. Яке захворювання відноситься до глибоких стрептококових уражень шкіри?
A *Ектима
B Стрептококове імпетиго
C Стрептококова заїда
D Навкололіктьова фліктема
E Вульгарне імпетиго

9Пацієнт хворіє псоріазом протягом 10-ти років. На яких ділянках шкіри найчастіше локалізується псоріаз?
A *На ліктях та колінах
B На обличчі
C На тильних поверхнях рук
D На тулубі
E На долонях і підошвах

10У пацієнтки 19-ти років при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на гіперемійованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:
A *Стрептококова заїда
B Мікробна екзема
C Простий герпес
D Простий лишай
E Кандидозний стоматит

11При огляді хворої акушерка виявила на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок мономорфний висип у вигляді рожево-червоних папул, покритих сріблястими лусочками. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A *Псоріазу
B Сухої себореї
C Червоного вовчака
D Нейродерміту
E Червоного плоского лишаю

12Хвора скаржиться на висип на верхній губі, який супроводжується печінням та свербежем. Об'єктивно: на червоній окрайці верхньої губи на фоні еритеми, набряку наявні везикули із прозорим вмістом. Про яке захворювання слід подумати?
A *Простий герпес
B Імпетиго
C Контактний дерматит
D Звичайну пухирчатку
E Екзему

13При гінекологічному обстеженні молодої жінки акушерка побачила висипання в ділянці великих статевих губ та перианальній ділянці у вигляді вузликів червоно-бурого кольору з чіткими краями, які значно підвищуються над рівнем шкіри, схильних до злиття. Вузлики на широкій основі, їх поверхня волога. Лабораторно: виявлено велику кількість блідих трепонем. Яке захворювання може запідозрити акушерка?
A *Вторинний сифіліс
B Первинний сифіліс
C Гострокінцеві кондиломи
D Контагіозний молюск
E Екзема

14У хворої підозрівають ранній прихований сифіліс. Який біологічний матеріал, на думку акушерки, необхідно взяти для лабораторного підтвердження сифілісу?
A *Кров на RW
B Лімфу
C Слину
D Сечу
E Кал

15До акушерки ФАПу звернулася жінка, 28-ти років, із скаргами на висипку і печіння в ділянці кистей рук, які з'явилися після необережної роботи з кислотами. Об'єктивно: шкіра обох кистей рук червона, набрякла, в осередку ураження наявні папули, везикули. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Простий контактний дерматит
B Червоний плоский лишай
C Екзема
D Короста
E Пухирчатка

16До акушерки ФАПу звернулася хвора, 28-ми років, зі скаргами на висипку і свербіж, який посилюється ввечері і вночі. Об'єктивно: на шкірі бокових поверхонь пальців кистей рук, живота і стегон виявляється велика кількість точкових,

попарного розташованих, червоного кольору папул, розчухи. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Короста
B Дерматит
C Мікроспорія
D Червоний вовчак
E Кропив'янка

17Пацієнтці 40-а років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений діагноз: піодермії. Який з морфологічних елементів поліморфної висипки є характерним?
A *Гноячок
B Вузлик
C Пляма
D Ерозія
E Пухирець

18Хвора звернулась на ФАП зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли зразу після того, як хвора використовувала порошок для прання "ЛОСК". Об'єктивно: шкіра кисті і передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикульозні елементи. Для якого захворювання це характерно?
A *Алергічно-контактний дерматит
B Псоріаз
C Нейродерміт
D Токсидермія
E Піодермія

19У пацієнтки, 23 роки, після пологів шляхом кесаревого розтину з'явився висип на обличчі та тулубі. Об'єктивно: еритематозні ураження на спинці носа і вилицях у формі метелика, підвищення температури тіла. В післяопераційний період пацієнка отримувала цефалоспорини. В загальному аналізі крові: ШОЕ- 36 мм/год. Клінічна картина характерна для:
A *Системного червоного вовчаку
B Кропив'янки
C Системної склеродермії
D Токсикодермії
E Геморагічного васкуліту

20Пацієнтка 30-ти років, звернулася зі скаргами на появу висипу на тулубі. Під час огляду на незміненій шкірі, бокових поверхнях тулуба виявлено дрібні вузлики рожевого кольору, які, зі слів пацієнтки, не супроводжуються суб'єктивними відчуттями. При збиранні епіданамнезу виявлено, що вона часто міняє статевих партнерів. Для якого захворювання це характерно?
A *Сифілісу вторинного
B Псоріазу
C Рожевого лишаю
D Сифілісу первинного
E Червоного плоского лишаю

21Вагітна, 27-ми років, знаходиться на диспансерному обліку після лікування гонореї. В пологовому будинку народила доношеного хлопчика вагою 4 кг. Яка тактика профілактики гонобленореї у новонароджених?
A *Обробка очною 1% еритроміциновою або тетрацикліновою маззю
B Обробка фізіологічним розчином
C Обробка розчином гідрокортизона
D Обробка 2% розчином борної кислоти
E Обробка розчином риванолу

22Дитині 5-ти років поставлено діагноз мікроспорія гладкої шкіри. Основне джерело зараження при мікроспорії:
A *Кішки, собаки
B Велика рогата худоба
C Заражена людина
D Комахи
E Свині, гризуни

23До вас звернувся сусід 25-ти років зі скаргами на безболісну ерозію на головці статевого члена. Ви порекомендували звернутися до лікаря і запропонували:
A *Примочки з фізрозчином
B Обробити розчином фурациліну
C Обробити розчином йоду
D Ванночки з розчином марганцевокислого калію
E Накладання синтоміцинової емульсії

24При проходженні профілактичного огляду у жіночій консультації жінці встановлено попередній діагноз первинний серопозитивний сифіліс. Яку клінічну ознаку виявили при об’єктивному обстеженні?
A *Твердий шанкр
B Розеоли
C Папули
D Гострокінцеві кондиломи
E Сифілітичні гуми

25Хворому поставлено діагноз короста. Який препарат використовується для санітарної обробки шкіри, ураженої коростою?
A *Бензилбензоат
B Бензилпеніцилін
C Біцилін-3
D Біцилін-5
E Хлорофіліпт

26При обстеженні хворого чоловіка 33-х років на шкірі передпліччя, на яскраво-червоних, гладеньких папулах з пупкоподібним вдавленням у центрі, виявлено сіточка Уїкхема. Який попередній діагноз у хворого?
A *Червоний плоский лишай
B Оперізуючий лишай
C Екзема

D Мікроспорія
E Оніхомікоз

27Мама з донькою 3-х років звернулася до ФАПу зі скаргами на висип в ділянці обличчя. При об'єктивному обстеженні на лобі та повіках вузлики 5-7 мм, у центрі пупкоподібне заглиблення, під час стискування пінцетом з обох боків виділяється кашкоподібна маса білого кольору. Про яке захворювання слід думати?
A *Контагіозний молюск
B Оперізуючий лишай
C Червоний лишай
D Бородавки
E Псоріаз

28Ви працюєте акушеркою на ФАПі. До Вас звернулась пацієнтка 30-ти років зі скаргами на сверблячий висип на шкірі. Висип з'явився тиждень тому після нервового стресу. Об'єктивно: на шкірі розгинальних поверхонь кінцівок (в ділянці ліктьових та колінних суглобів) - рожево-червоного кольору папули, вкриті сріблясто-білими лусочками. При зішкрібуванні лусочок спостерігається "феномен стеаринової плями", "феномен термінальної плівки", "феномен точкової кровотечі". Для якого захворювання характерні такі клінічні ознаки?
A *Псоріаз
B Екзема
C Нейродерміт
D Короста
E Рожевий лишай

29В жіночій консультації при огляді вагітної акушерка помітила висип на шкірі. Об'єктивно: на шкірі правого передпліччя дві плями круглої форми з обідком по периферії із вузликів, пухирців, кірочок у вигляді кілець, у центрі - лущення. Розміри вогнищ 1-2 см в діаметрі. Назвіть метод лабораторного дослідження для встановлення діагнозу:
A *Мікологічне дослідження елементів висипки
B Бактеріологічне дослідження крові
C Аналіз крові на реакцію Вассермана (RW)
D Аналіз калу на яйця гельмінтів
E Аналіз крові на цукор

30У декількох дітей дитячого садка однієї групи виявлені на шкірі ніг та обличчі поверхневі везикули з еритемою навкруги, вміст яких швидко перетворюється у пустули. Пустули швидко руйнуються з утворенням ерозії, поверхня яких покрита медово-жовтими кірочками, кількість елементів збільшується. Температура тіла - субфебрильна. Ваш ймовірний діагноз:
A *Імпетиго
B Фурункул
C Карбункул
D Екзема
E Кандидоз

Нервові та психологічні хвороби

1Пацієнтка, 29-ти років, страждає патологічною тягою до алкогольних напоїв. 2 дні тому востаннє приймала алкоголь. Вночі погано спала, “бачила” в кімнаті на стінах павутину, стала тривожною, відкривши очі побачила біля себе незнайомого чоловіка, але придивившись, зрозумів, що це пальто на вішаку. Який препарат слід порекомендувати з метою профілактики розвитку делірію?

A *Суміш Попова

B Галоперидол

C Аміназин
D Димедрол
E Корвалол

2Через 6 місяців після пологів у жінки 22-х років з'явились скарги на імперативні позиви до сечовипускання, затерпання та тяжкість в ногах. 2 роки тому у неї був випадок раптової втрати зору на праве око, яка після лікування в очному відділенні повністю пройшла. Для якого захворювання є типовими дані скарги?
A *Розсіяного склерозу
B Пухлини головного мозку
C Ішемічного інсульту
D Поліомієліту
E Летаргічного енцефаліту

3У дитини 2-х років відмічається підвищення м'язового тонусу та рефлексів на нижніх кінцівках. Під час ходи спирається на пальці, перехрещує гомілки. Є дані про патологічний перебіг вагітності та пологів у матері, відставання дитини в психомоторному розвитку з перших місяців життя. Про яке захворювання можна думати?
A *Дитячий церебральний параліч
B Пухлина мозку
C Хвороба Дауна
D Енцефаліт
E Акушерський параліч

4У породіллі після пологів, розвинувся післяпологовий психоз. Вона постійно сумна, задумана, відмовляється від їжі, лежить в ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки Ви повинні запідозрити?
A *Суїцидальні думки і дії
B Розвиток гіпостатичної пневмонії
C Авітаміноз
D Схуднення
E Виникнення пролежнів

5У породіллі після пологів розвинувся післяпологовий психоз. Вона була постійно сумна, задумана, відмовлялася від їди, лежала у ліжку, відвернувшись до стіни. Після проведенного лікування стан покращився. Проведіть оцінку успішних результатів втручань:
A *Зникнення депресії
B Нормалізація температури
C Нормалізація стільця
D Нормалізація серцево-судинної системи
E Покращання апетиту

6Вагітна 27-ми років, після тривалого перебування на холоді скаржиться на неможливість закрити ліве око, сльозотечу з нього, порушення слуху, порушення смаку. Який симптом необхідно перевірити?
A *Симптом "вітрила"
B Симптом Кернега

C Ригідність потиличних м’язів
D Симптом Бабинського
E Симптом Пастернацького

7Після пологів у новонародженого шкірні покрови ціанотичні, дихання нерегулярне, поверхневе, знижена реакція на зовнішні подразники, безумовні рефлекси пригнічені. Діагностована гіпоксія. При лікуванні гіпоксії у новонароджених важливо, насамперед:
A *Ліквідувати кисневе голодування головного мозку
B Очистити кишківник
C Зігріти новонародженого
D Налагодити нормальне харчування
E Очистити шкірні покриви

8У вагітної, хворої на епілепсію, після самостійного припинення прийому протисудомних препаратів виник великий судомний напад. Які найбільш доцільні дії в цьому випадку?
A *Надати допомогу при нападі і викликати лікаря
B Ввести протисудомний препарат
C Викликати лікаря
D Дати заспокійливі препарати
E -

9Акушерка була викликана до породіллі, яка проявляє гнівливість, агресію. По відношенню до дитини байдужа, не реагує на її крик. Періодично говорить про заподіяння шкоди дитині. Які першочергові дії акушерки?
A *Негайно викликати лікаря
B Перевести породіллю з дитиною в окрему палату
C Самостійно дати заспокійливі препарати
D Провести бесіду з породіллею про необхідність турботи про дитину
E Спостерігати за породіллею

10 Пацієнтка, 65-ти років, хворіє на гіпертонію. Дві доби тому перенесла гостре порушення мозкового кровообігу Який сучасний додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?
A *Магнітнорезонансна комп’ютерна томографія
B Реоенцефалографія
C Спинномозкова пункція
D Ехоенцефалографія
E Рентгенографію черепа в 2-х проекціях

11Пацієнтка скаржиться на біль в ділянці попереку, який віддає в праву ногу та посилюється при рухах. Хворіє довгий час. Які особливості догляду за пацієнткою?
A *Необхідно щит на ліжко
B Покласти хвору на живіт
C Покласти на правий бік
D Покласти на лівий бік
E Під поперек покласти, щось м’яке

12У вагітної жінки протягом доби виникають багаторазові судомні напади один за одним. Свідомість пацієнтки між нападами не відновлюється. Про який діагноз можна думати?
A *Епілептичний стан
B Епілептичний напад
C Істеричний напад
D Малий епілептичний напад
E Епілепсія Джексона

13У пацієнтки - розщеплення психічних процесів, зниження активності, згасання емоцій, аутизм, негативізм і прояви апатико-абулічного синдрому. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A *Шизофренії
B Маніакально-депресивного психозу
C Істерії
D Інволюційних психозів
E Епілепісї

14У пацієнтки виявлено підвищення *t*° до 39°*C*, відсутність активних рухів в нижніх кінцівках, трофічні розлади на сідницях, порушення функції тазових органів по типу гострої затримки сечі. Для якого ураження характерні ці симптоми?
A *Для ураження спинного мозку
B Для ураження головного мозку
C Для ураження мозкових оболонок
D Для ураження головного та спинного мозку
E Для ураження периферичних нервів

15Машина швидкої допомоги доставила пацієнта в приймальне відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. При огляді: шкірні покрови багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Геморагічний інсульт
B Менінгіт
C Ішемічний інсульт
D Епілептичний напад
E Істеричний напад

16Пацієнтка скаржиться на перекос обличчя, ліве око не закривається, ліва брова нерухома, їжа виливається через лівий кут рота. Який нерв уражений у пацієнтки?
A *Лицьовий
B Трійчастий
C Верхньощелепний
D Потиличний
E Очний

17У хворої на епілепсією безпричинно з'явились: незадоволення собою, оточуючими, дратівливість, похмурість. Про яку патологію емоцій можна подумати?
A *Дисфорія

B Депресія
C Апатія
D Ейфорія
E Слабодухість

18Пацієнтка на третій день після пологів почала себе дивно поводити: сміялась без причини, намагалась покинути відділення, пояснюючи терміновими справами, зустріччю з “великими” людьми. Яку патологію може запідозрити акушерка?
A *Післяпологовий психоз
B Інфекційний делірій
C Депресивну фазу маніакально-депресивного психозу
D Кататонічна форма шизофренії
E Клімактеричний невроз

19У пацієнтки 36-ти років, яка 2 дні тому перенесла травму голови з короткочасною втратою свідомості, наростає головний біль, нудота, слабість в лівій половині тіла. Об’єктивно: зіниці S<D, тонус м’язів зліва вищий, сухожилкові рефлекси S<D, симптом Бабінського зліва (+). Який попередній діагноз?
A *Стиснення мозку внутрішньочерепною гематомою
B Контузія головного мозку III ст.
C Струс головного мозку
D Контузія головного мозку I ст.
E Розрив спинного мозку

20Акушерку ФАПу викликали до пацієнтки 50-ти років, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної хвороби. Прокинувшись вночі, хвора не змогла встати з ліжка через слабість в правих кінцівках, втратила мову. Виявлено підвищення АТ до 190/110 мм рт.ст. Які медикаменти необхідно застосувати в першу чергу?
A *Гіпотензивні
B Седативні
C Антихолінестеразні
D Нейролептики
E Антикоагулянти

21Пацієнт 42-х років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Яке діагностичне обстеження необхідно провести?
A *Спинно-мозкову пункцію
B Біохімічний аналіз крові
C Бактеорологічне дослідження калу
D Загальний аналіз крові
E Загальний аналіз сечі

22Пацієнтка не може стати на повну стопу, ходить на пальцях. Про яке захворювання можна думати?
A *Неврит великогомілкового нерва
B Неврит малогомілкового нерва
C Параліч кінцівки
D Істерія

E Негативізм

23После родов с использованием акушерских щипцов у новорожденного правая ручка пассивно свисает вдоль туловища, спонтанные движения в руке отсутствуют. Сухожильные рефлексы не вызываются. Кожа бледная, рука холодная на ощупь. Поставлен диагноз: тотальный акушерский паралич. Причиной данного состояния является?
A *Поражение плечевого сплетения
B Поражение крестового сплетения
C Поражение поясничного утолщения
D Поражение межреберных нервов
E Поражение конского хвоста

24У женщины со сроком беременности 10 недель подозревается опухоль мозга. Какое исследование необходимо провести для выявления опухоли?
A *МРТ головного мозга
B Исследование спинномозговой жидкости
C Электроэнцефалографию
D Рентгенографию органов грудной клетки
E Рентгенографию черепа

25На ФАП обратилась мать пациентки с жалобами, что на 15 сутки после родов у её дочери снизился фон настроения, появилась плаксивость, безразличие к окружающему, перестала интересоваться собой и новорожденным ребенком, пропал аппетит, появились запоры. Ранее подобного состояния у дочери никогда не было. Акушерка квалифицировала состояние как:
A *Послеродовая депрессия
B Астенический синдром
C Ажитированная депрессия
D Дисфорический синдром
E Анарексия

26Пацієнтка на прийомі у лікаря втратила свідомість. З'явились тонічні судоми, котрі через декілька секунд змінились клонічними. Дихання стало хриплим, з рота виділяється піна, спостерігається самовільне сечовиділення. Приступ тривав 3 хв. Яку патологію можна запідозрити?
A *Великий епілептичний напад
B Малий епілептичний напад
C Істеричний напад
D Присмериковий стан
E Транс

27У пацієнтки 32-х років, раптово виник головний біль, нудота, блювота, втрата свідомості. Об'єктивно: АТ- 190/130 мм рт.ст., пульс - 94/хв., напружений, шкіра гіперемована. Сопор. На запитання відповідає односкладно. Позитивні менінгеальні знаки. Ліквор кров'янистий. Встановіть попередній діагноз:
A *Субарахноїдальний крововилив
B Ішемічний інсульт
C Енцефаліт

D Емболія судин головного мозку
E Менінгіт

287-річний хлопчик - неуважний в класі. Вчитель звернув увагу на періодично відсутній погляд дитини і прицмокування губами. Падіння і судом не відмічалось. Під час короткої “відсутності” (1-2 секунди) не відкликався на своє ім’я. Який імовірний тип нападу?
A *Малий епілептичний
B Генералізований тоніко-клонічний
C Парціальний
D Епістатус
E Джексонівський

29У пацієнтки 40-а років, після фізичного навантаження виник біль у поперековій ділянці з іррадіацією по задній поверхні лівої ноги. Об’єктивно: сколіоз поперекового відділу, напруження м’язів спини. Назвіть симптом натягу, який необхідно перевірити при обстеженні:
A *Ласега
B Керніга
C Брудзинського
D Бабинського
E Россолімо

30На прийомі у жіночій консультації молода жінка стверджує, що вона вагітна. Зі слів пацієнтки остання менструація відбулась три місяці тому. Скаржиться на нудоту, блювання, зміну смаку. При вагінальному обстеженні та при УЗД ознак вагітності не виявлено. Відомо, що через неприємності на роботі жінка потрапляє під кримінальну відповідальність. Поставте попередній діагноз:
A *Істеричний невроз(несправжня вагітність)
B Вагітність 12 тижнів
C МДП
D Шизофренія
E Психопатія

Охорона праці

1Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?
A *Один календарний місяць
B 15 календарних днів
C 20 календарних днів
D 24 календарні дні
E 26 календарних днів

2У відділ кадрів жіночої консультації звернулася акушерка із заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів. Має двох дітей. До якого віку старшої дитини надається така відпустка?
A *15-ти років
B 16-ти років
C 17-ти років
D 18-ти років
E 19-ти років

3Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?
A *Вступний
B Первинний

C Повторний
D Позаплановий
E Цільовий

4Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?
A *Так, вважається, складаються акти за формами Н-1 та Н-5
B Не вважається нещасним випадком
C Так, вважається, складається акт за формою Н-2
D Так, вважається, складається акт за формою Н-5
E Так, вважається, складається акт за формою НТ-1

5Ви - випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років. При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість робочого тижня?
A *36 годин
B 30 годин
C 24 години
D 40 годин
E 32 години

6У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації на акушерці загорівся одяг. Яким способом якнайшвидше припинити горіння?
A *Швидко загорнути людину в палаючому одязі в пожежну кошму
B Засипати людину піском
C Облити водою
D Бігти якомога швидше
E Направити на потерпілого струмінь вогнегасника

7В медустанові збільшився штат працівників до 60-ти осіб. Виникло питання про створення служби охорони праці. При якому мінімальному числі працюючих створюється ця служба?
A *50 осіб
B 40 осіб
C 30 осіб
D 20 осіб
E 10 осіб

8При виникненні пожежі на другому поверсі лікарні почалась евакуація людей відповідно до графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути не меншою ніж:
A *1 м
B 2 м
C 0,5 м
D 3 м
E 4 м

9Під час чергування акушерка послизнулась і отримала забій правого коліна. Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (зав. відділення) з медперсоналом відділення при виникненні виробничої травми?
A *Позаплановий
B Вторинний
C Первинний
D Вступний
E Цільовий

10На роботу у пологовий будинок влаштовується акушерка. Яку роботу з нею проводить інженер з техніки безпеки?
A *Вступний інструктаж з техніки безпеки
B Ознайомлення з історією створення установи
C Проведення екскурсії по установі
D Ознайомити з планом евакуації
E Ознайомлення з працівниками установи

11При взятті крові з вени у вагітної акушерка поранила палець через гумову рукавичку. Яке захворювання може виникнути при контакті з кров'ю породіллі у випадку, коли пацієнтка хвора на це захворювання?
A *ВІЧ-інфекція
B Артрит
C Туберкульоз
D Гіпотонія
E Алергія

12Ви працюєте акушеркою в пологовому будинку та слідкуєте за своєчасною зміною забрудненої білизни вагітних жінок та породіль. У що збирають забруднену білизну жінок?
A *В прогумовані мішки
B В індивідуальні пакети
C В бавовняні мішки
D В паперові одноразові мішки
E -

13Акушерка порушила правила протипожежної безпеки, що привело до загорання обладнання. Який інструктаж повинен провести відповідальний за пожежну безпеку?
A *Позачерговий протипожежний інструктаж
B Первичный противопожарный инструктаж
C Повторный противопожарный инструктаж
D Цільовий протипожежний інструктаж
E Вступний протипожежний інструктаж

14В ходе операции кровь больной попала в глаза акушерке, что необходимо использовать для профилактики ВИЧ-инфекции?
A *Альбуцид
B Раствор перманганата калия
C Спирт

D Нафтизин
E Фурацилин

15Комиссия по расследованию несчастного случая составляет акт о несчастном случае, если он связан с производством по форме:
A *Н-1, Н-5
B Н-5
C НПВ
D Н-9
E П-4

16После завершения физиотерапевтической процедуры аппарат необходимо:
A *Выключить в порядке, обратном включению, снять электроды с пациента
B Снять электроды с пациента
C Оставить аппарат включенным для следующего пациента
D Аппарат выключить в порядке включения
E Снять электроды с пациента, а затем выключить аппарат

17Во время иньекций акушерка укололась инфицированной иглой. Как квалифицируется данный случай с точки зрения охраны труда?
A *Авария
B Несчастный случай
C Проишествие
D Катастрофа
E Вредный фактор

18Акушерку переводят в другое отделение для выполнения разовых работ. Какой вид инструктажа должен быть проведен с ней?
A *Целевой
B Первичный
C Внеочередной
D Специальный
E Повторный

19При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?
A *Завідувач відділенням
B Інженер з охорони праці
C Головний лікар
D Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
E Головна акушерка

20У пологовій залі необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Який прилад використовується для визначення рівня природного освітлення?
A *Люксметр
B Анемометр
C Термометр

D Актинометр
E Психрометр

21Акушерці доручено терміново доставити кров з пологового будинку до лабораторії, яка розташована за межами установи. У якій упаковці необхідно транспортувати даний біологічний матеріал?
A *У контейнері
B У картонній коробці
C У дерев'яному ящику
D У поліетиленовому пакеті
E У паперовій обгортці

22Акушерка обслуговує вагітну, хвору на СНІД. У якому випадку найімовірніше інфікування її збудником цього захворювання?
A *При попаданні крові пацієнтки на ушкоджену шкіру акушерки
B При проведенні фізіотерапевтичних процедур
C При проведенні термометрії
D При зміні білизни пацієнтки
E При харчуванні пацієнтки

23Ви акушерка жіночої консультації районної лікарні. Що потрібно мати згідно з нормативним наказом №120 МОЗ України?
A *Аптечку для надання невідкладної медичної допомоги медичним працівникам у разі поранення
B Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах
C Запас предметів індивідуального захисту від кров'яних інфекцій
D Набір антисептичних засобів
E Набір перев'язного матеріалу

24Акушерка полового відділення при виконанні своїх обов'язків постійно працює з кров'ю. Який засіб найефективніший для зниження ризику зараження кров'яними інфекціями?
A *Гумові рукавички
B Медичний халат
C Захисна маска
D Захисні нарукавники
E Поліетиленовий фартух

25Випускниця медичного коледжу прийшла влаштовуватись на роботу в пологовий будинок. З нею укладається трудовий договір. Між ким укладається трудовий договір?
A *Працівником і роботодавцем
B Уповноваженими трудового колективу і власником.
C Власником і профспілками.
D Профспілками і працівниками.
E Працівником і уповноженими трудового колективу.

26Випускниця медичного коледжу прийшла влаштовуватись на роботу в

пологовий будинок. Який медичний огляд вона проходить відповідно до Положення про проведення медичних оглядів?
A *Попередній
B Поточний
C Періодичний
D Позаплановий
E Цільовий

27Акушерка працює в реєстратурі. Яка тривалість робочого тижня для неї відповідно до Кодексу законів про працю?
A *40 годин
B 42 годин
C 38 годин
D 36 годин
E 44 годин

28Акушерка пропрацювала у пологовому будинку 11 місяців. Яка мінімальна тривалість щорічної основної відпустки їй належиться?
A *24 календарних днів
B 35 календарних днів
C 56 календарних днів.
D 42 календарних днів
E 50 календарних днів.

29У населеному пункті сталося стихійне лихо. Медичних працівників пологового будинку залучили до виконання разових робіт, не передбачених трудовою угодою. Який вид інструктажу представник служби охорони праці повинен провести з медичним персоналом?
A *Цільовий
B Вступний
C Первинний
D Повторний
E Позаплановий

30При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути, не менш ніж:
A *1 м
B 0,8 м
C 1,5м
D 2м
E 1,75м