

Крок Б Сестринська справа-2015 рік

(правильна відповідь А)

1. До жіночої консультації звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування нею жіночої консультації:

- A. *2 рази на місяць
- B. 1 раз на місяць
- C. 1 раз на 3 місяці
- D. 1 раз на 2 місяці
- E. 1 раз на тиждень

2. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

- A. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів
- B. Собівартість медичних послуг і загальні доходи
- C. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- D. Ціна та собівартість медичних послуг
- E. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

3. Хворий К., 42 роки, страждає впродовж 8-ми років на гіпертонічну хворобу. Після емоційного стресу на роботі став дратівливим, відчуває сухість у роті. Об'єктивно: у свідомості, тремор рук, обличчя гіперемовано, шкіра зволожена, поліурія. АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС110/хв. Рухових і сенсорних порушень немає. Глюкоза крові - 4,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Гіпоглікемія
- C. Ішемічний інсульт
- D. Геморагічний інсульт
- E. Гіперглікемічна кома

4. Серед населення міста зареєстровано 280 випадків смерті від новоутворень на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена смертність населення від новоутворень?

- A. Інтенсивний
- B. Екстенсивний
- C. Наочності
- D. Співвідношення
- E. Середнє арифметичне

5. Наукове дослідження присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу на хвороби органів дихання. Одиницею спостереження в такому дослідженні буде кожен:

- A. Випадок захворювання органів дихання
- B. Студент медичного коледжу
- C. Хворий студент медичного коледжу (на будь-яке захворювання)
- D. Студент медичного коледжу з хворобою органів дихання

Е. Випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

6. Медична сестра обстежує пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Що є найбільш інформативним у діагностиці даного стану?

- А. набряки на ногах та задишка
- В. Слабкість, поганий апетит
- С. Кашель та підвищена температура тіла
- Д. Біль у серці ниючого характеру та біль у великих суглобах
- Е. Пульсація сонних артерій, жовтяниця

7. Дитина 10-ти років скаржиться на слабкість, біль у горлі при ковтанні, підвищення т_о тіла до 39оС. При огляді: шкіра звичайного кольору; в зіві: гіперемія, набряк мигдаликів, гнійні плівки. При реалізації плану медсестринських втручань необхідним є таке обстеження:

- А. Мазок із зіву та носа на ВЛ
- В. Забір слизу із носоглотки на віруси
- С. Забір крові на біохімічне дослідження
- Д. Рентгенологічне
- Е. Серологічне

8. Яким законодавчим актом визначаються організація та управління охороною здоров'я України?

- А. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"
- В. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", законом "Про місцеве самоврядування", законом "Про санепідблагополуччя"
- С. Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"
- Д. Законом "Про державну службу", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"
- Е. –

9. Чоловік 59-ти років скаржиться на поганий апетит, відразу до м'ясних і молочних страв. За останні 3 місяці схуд на 18 кг. Про що може свідчити вказаний симптомокомплекс

- А. Рак шлунку
- В. Рак товстого кишківника
- С. Синдром хронічної втоми
- Д. Астенічний синдром
- Е. Виразкова хвороба шлунку

10. У пацієнта 49-ти років на 4-й день після резекції шлунку виник постійний інтенсивний біль в животі. Загальний стан важкий. Температура тіла- 37, 8оС, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рs- 104/хв. Язик сухий. Живіт здутий, ліва половина відстає під час дихання. Симптоми Воскресенського, Щоткіна-Блюмберга позитивні. Назвіть імовірне післяопераційне ускладнення:

- А. Перитоніт
- В. Кишкова непрохідність
- С. Кровотеча

- D. Панкреатит
- E. Абсцес

11. Пацієнтка скаржиться на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку. Було блювання без полегшення. Температура тіла - 37, 6оС. Живіт помірно здутий, напружений та болючий в правому підребер'ї. Спостерігається помірне напруження м'язів черевної стінки в правому підребер'ї. Симптом Ортнера позитивний. Вкажіть попередній діагноз:

- A. Гострий холецистит
- B. Гострий апендицит
- C. Гострий панкреатит
- D. Гостра кишкова непрохідність
- E. Перфоративна виразка шлунку

12. Медсестра проводить обстеження пацієнта з відмороженням правої ступні. Оберіть, який з симптомів є характерним лише для дореактивного періоду відмороження?

- A. Втрата чутливості
- B. Поява болю
- C. Гіперемія шкіри
- D. набряк тканин
- E. Підвищення температури

13. Дитині 5,5 місяців. Перебуває на нераціональному штучному вигодовуванні (коров'ячим молоком). При введенні жовтка у дитини з'явилася плямистопапульозна висипка по всьому тілу, на щоках яскрава гіперемія, злущення шкіри, мокнучі ділянки, екскоріація. Про який стан слід думати в даній ситуації?

- A. Алергічний діатез
- B. Нервово-артритичний діатез
- C. Лімфатико-гіпопластичний діатез
- D. Кропив'янка
- E. Геморагічний діатез

14. Антидоти - лікарські засоби, які використовуються як протиотрута при інтоксикації хімічними речовинами. Які антидоти використовують при отруєнні сірковуглецем?

- A. Оксигенотерапія
- B. Метиленовий синій
- C. Унітіол
- D. Тетацин кальцію
- E. Активоване вугілля

15. При інтоксикації свинцем уражається система крові. Які зміни характерні для картини крові при інтоксикації свинцем?

- A. Гіпохромія еритроцитів, підвищений вміст заліза
- B. Тромбоцитопенія, ретикулоцитоз
- C. Поява в еритроцитах тілець Гейнца, збільшення базофілів
- D. Гіпохромна анемія, тромбоцитопенія, поява в еритроцитах тілець Гейнца

Е. Лейкоцитоз

16. При проведенні патронажу медична сестра виявила у дитини 5-ти місяців наступні проблеми: кволість, t_o - 38, $5oC$, часте блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім'ячко запале. Для якого стану характерні дані симптоми?

- А. Синдром токсикозу з ексикозом
- В. Функціональний розлад травлення
- С. Пілоростеноз
- Д. Ентеробіоз
- Е. Гіперглікемічна кома

17. Частину потреб районної лікарні у минулому році профінансовано за рахунок коштів програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надійшли ці кошти?

- А. Державний бюджет
- В. Місцевий бюджет
- С. Благодійні внески
- Д. Добровільне медичне страхування
- Е. Обов'язкове медичне страхування

18. У потерпілого К. 39-ти років термічний опік лівої кисті. Вкажіть препарат, який застосовують зовнішньо під час надання допомоги:

- А. Пантенол
- В. Фукорцин
- С. Первомур
- Д. Бактосин
- Е. Йодонат

19. У пацієнта постійні скарги на нудоту, відчуття дискомфорту після прийому густої їжі, періодичне блювання, що приносить полегшення. Яке імовірне ускладнення виразкової хвороби шлунку розвинулося у пацієнта?

- А. Стеноз
- В. Малігнізація
- С. Перфорація
- Д. Кровотеча
- Е. Пенетрація

20. До хірургічного відділення надійшов хворий віком 51 рік зі скаргами на біль у правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Флебіт
- В. Флеботромбоз
- С. Артеріїт
- Д. Тромбофлебіт
- Е. Лімфангоїт

21. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку. Біль виникає після фізичного та психічного перенавантаження. Застосування якого препарату буде першочерговим?

- A. Нітрогліцерин
- B. Ніфедипін
- C. Атенолол
- D. Аспірин
- E. Папаверин

22. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ- 170/100 мм рт.ст., Рs- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A. Аналіз сечі за Нечипоренком
- B. Аналіз сечі на глюкозу
- C. Аналіз сечі за Зимницьким
- D. Загальний аналіз крові
- E. Аналіз сечі на діастазу

23. Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль "летючого характеру" у колінних та ліктьових суглобах, який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до 37,5^oC ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A. Ревматичний артрит
- B. Туберкульозний артрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Гонорейний артрит
- E. Деформуючий остеоартроз

24. Хворий скаржиться на гострий "кинджальний" біль у животі, різку слабкість. Захворів раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- A. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки
- B. Шлункова кровотеча
- C. Гострий гастрит
- D. Синдром подразненого кишківника
- E. Гострий панкреатит

25. Пацієнт скаржиться на виникнення раптової ядухи з утрудненим видихом, наприкінці нападу кашель з виділенням незначної кількості склоподібного харкотиння. При аналізі харкотиння виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Яке захворювання у пацієнта?

- A. Бронхіальна астма
- B. Серцева астма

- C. Гострий бронхіт
- D. Рак легень
- E. Туберкульоз легень

26. Особливістю функцій медичних сестер спеціалізованих кабінетів поліклініки є:

- A. Проведення спеціальних лікувальних та діагностичних процедур
- B. Санітарно-освітня робота
- C. Виконання ін'єкцій
- D. Підготовка кабінету лікаря до прийому хворого
- E. Передача інформації про пацієнта родичам

27. Дитина 4-х років захворіла гостро через 7 днів після ГРВІ. На шкірі нижніх кінцівок з'явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно- папульозна висипка, скупчена навколо гомілковостопних суглобів. Визначте ймовірне захворювання:

- A. Геморагічний васкуліт, шкірна форма
- B. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- C. Гемофілія
- D. Тромбоцитопенічна пурпура
- E. Хвороба Верльгофа

28. Результати попереднього (періодичного) медичного огляду працівників і висновок комісії про їх стан здоров'я заносяться до:

- A. Картки працівника
- B. Амбулаторної карти хворого
- C. Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання
- D. Стаціонарної карти хворого
- E. Статистичного талону

29. Хворому К. лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Медична сестра пояснює пацієнтові, що слід зібрати таку порцію сечі:

- A. Середню
- B. Кінцеву
- C. Всю сечу
- D. Початкову
- E. –

30. Хворій на токсичний дифузний зоб призначено консервативне лікування. Які препарати є обов'язковими для лікування даного захворювання?

- A. Мерказоліл, метімазол
- B. Тиреоїдин, тироксин
- C. Тиреокмб, тироксин
- D. Метотрексат, метилурацил
- E. Гідрокортизон, преднізолон

31. Дитина 7-ми років захворіла раптово (напередодні вживала тістечка), підвищилася температура тіла до 38оС, турбують болі в животі, часті рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається болючість в

лівій половині живота. Припущено дизентерію. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- A. Бактеріологічне дослідження калу
- B. Копрологічне дослідження
- C. Загальний аналіз крові
- D. Змив з носоглотки на віруси
- E. Серологічні дослідження

32. Хворий К. 46-ти років скаржиться на задишку, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, біль у грудях. Умови праці пов'язані з вдиханням пилу заліза. Який вид металоконіоза розвинувся у хворого?

- A. Сидероз
- B. Бериліоз
- C. Алюмініоз
- D. Баритоз
- E. Фіброз

33. У дитини 4-х років на шкірі обличчя, волосистій частині голови виявлено плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, різні за розміром, розташовані на незмінній шкірі. Вміст везикул прозорий. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

- A. Вітряна віспа
- B. Скарлатина
- C. Кір
- D. Краснуха
- E. Ексудативно-катаральний діатез

34. Медична сестра 30-ти років працює у фізіотерапевтичному кабінеті, обслуговуючи електроапаратуру, яка є джерелом випромінювання всіх ділянок електромагнітного спектра. Засобами захисту медична сестра не користується. Скаржиться на біль та відчуття піску в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об'єктивно: спостерігається гіперемія та набряк кон'юнктиви очей. Яке професійне захворювання може розвинути внаслідок недостатнього контролю медичної сестри?

- A. Кератокон'юнктивіт
- B. Блефароспазм
- C. Прогресуюча міопія
- D. Фотоалергія
- E. Катаракта

35. Хвора 26-ти років занедужала через 2 години після вживання в їжу кремового торта. Виникли загальна слабкість, нудота, багаторазова блювота. Які заходи за призначенням лікаря треба провести щодо хворої в першу чергу?

- A. Промивання шлунку
- B. Введення антибіотиків
- C. Введення платифіліну
- D. Введення реополіглюкіну
- E. Введення преднізолону

36. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

- A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
- B. Медичну карту амбулаторного хворого
- C. Контрольну карту диспансерного спостереження
- D. Талон амбулаторного пацієнта
- E. Медичну карту стаціонарного хворого

37. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень належить до одного з додаткових джерел фінансування?

- A. Благодійні внески
- B. Державний бюджет
- C. Особисті кошти громадян
- D. Відрахування підприємств на медичне страхування
- E. Місцевий бюджет

38. Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- A. Попередній
- B. Направляючий
- C. Фільтруючий
- D. Заклучний
- E. Поточний

39. У стаціонарі на 300 ліжок перебувало на лікуванні протягом року 6500 хворих, виписано без змін у стані здоров'я - 135, померло - 65. Який показник ефективності треба застосувати для оцінки роботи стаціонару?

- A. Медичної ефективності
- B. Соціальної ефективності
- C. Економічної ефективності
- D. Мішаної ефективності
- E. Всі види ефективності

40. У дитини 6-ти місяців через 2 тижні після вакцинації АКДС з'явилася геморагічна висипка у вигляді петехій та екхімозів на верхніх та нижніх кінцівках та обличчі. В крові: НЬ- 115 г/л, лейкоц.- $6,5 \cdot 10^9$ /, тромбоц.- $15 \cdot 10^9$ /. Яке захворювання має місце у хворого?

- A. Тромбоцитопенічна пурпура
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Гострий лейкоз
- D. Системний червоний вовчак
- E. Апластична анемія

41. Дитині 8 місяців. Хворіє 5 днів. Спостерігаються кволість, підвищення температури тіла 37,8-38, 8оС, задишка60/хв., в легенях з обох сторін у нижніх ділянках вислуховуються крепітація, послаблене дихання, пригнічення перкуторного тону. Яке обстеження є найвагомим для встановлення діагнозу?

- A. Рентгенографія органів грудної клітки
- B. Клінічний аналіз крові
- C. Імунограма
- D. Кислотно-лужний стан крові
- E. Спірометрія

42. У хворого кардіологічного відділення виникла зупинка дихання і зникла пульсація на сонній артерії. Який стан у хворого?

- A. Клінічна смерть
- B. Біологічна смерть
- C. Агонія
- D. Передагонія
- E. Соціальна смерть

43. Який дієтичний стіл рекомендують хворому на хронічний ентероколіт?

- A. Стіл № 4
- B. Стіл № 1
- C. Стіл № 5
- D. Стіл № 7
- E. Стіл № 11

44. До післяопераційної палати доставили пацієнта, якому проводили оперативне втручання під епідуральною анестезією. Які тимчасові зміни можуть спостерігатися у пацієнта?

- A. Втрата чутливості
- B. порушення дихання
- C. Затримка сечовиділення
- D. Патологічні рефлекси
- E. Виникає біль

45. Перед апендектомією пацієнту К. 45-ти років проводять премедикацію. З якою метою при цьому використовують розчин атропіну сульфату?

- A. Зменшення секреції залоз
- B. Прискорення серцевих скорочень
- C. Запобігання блюванню
- D. Посилення дії анальгетиків
- E. Звуження зіниць

46. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігають у разі кашлюку?

- A. Лімфоцитоз
- B. Анемію
- C. Нейтрофільоз
- D. Еозинофілію
- E. Тромбоцитопенію

47. Дитина народилася доношеною. Оцінка стану за шкалою Апгар 8-10 балів. Коли дитину прикласти до грудей?

- A. Протягом перших 30 хвилин
- B. Через 2 години
- C. Через 6-8 годин
- D. Через 10-12 годин
- E. Через добу

48. Серед причин, які спричиняють розвиток повторних нападів професійної бронхіальної астми, є:

- A. Екзогенні алергени
- B. Електромагнітне випромінювання
- C. Ультразвукове випромінювання
- D. Лазерне випромінювання
- E. Ендогенні алергени

49. У пацієнта діагностовано легкий ступінь гострої променевої хвороби. Під дією якої дози радіоактивного випромінювання він розвивається?

- A. 100 - 200 рад
- B. 200 - 300 рад
- C. 300 - 500 рад
- D. 500 - 600 рад
- E. 600 - 800 рад

50. Старша медична сестра бере участь у складанні та оформленні статуту новоствореної медичної організації (кабінет стоматологічної допомоги). Цей документ належить до такої групи:

- A. Організаційні
- B. Інформаційні
- C. Розпорядчі
- D. Фінансово-розрахункові
- E. Інформаційні та організаційні

51. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- A. Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад
- B. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- C. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- D. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- E. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

52. Ви - медсестра пологового відділення. Згідно з яким наказом здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

- A. № 234
- B. № 620
- C. № 503
- D. № 408

Е. № 233

53. Ви - медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно з наказом № 234)?

- A. 1 раз на 3 місяці
- B. 1 раз на 6 місяців
- C. 1 раз на 9 місяців
- D. 1 раз на рік
- E. 1 раз на 2 роки

54. У хворої 68-ми років інфаркт міокарду. Який з наведених лікарських засобів треба застосувати для зняття больового синдрому?

- A. Промедол
- B. Анаприлін
- C. Клофелін
- D. Еуфілін
- E. Строфантин

55. Пацієнтці, яка лікувалася з приводу хронічного холециститу, лікар призначив дуоденальне зондування. В якій порції жовчі будуть виявлені патологічні компоненти жовчі, характерні для даного захворювання, та які саме компоненти?

- A. Лейкоцити в порції B
- B. Лейкоцити в порції A
- C. Лейкоцити в порції C
- D. Еритроцити в порції A
- E. Еритроцити в порції B

56. Дитині 2 роки. Скарги на підвищення t_o до $38^{\circ}C$, кашель, нежить, кон'юнктивіт, гіперемію зів. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Аденовірусна інфекція
- B. Кір
- C. Коклюш
- D. Пневмонія
- E. Трахеобронхіт

57. Медична сестра здійснює патронаж дівчинки 1 року. Мати цікавиться, які щеплення необхідно зробити її дитині в даному віці?

- A. Проти кору, краснухи, паротиту
- B. Проти туберкульозу
- C. Проти поліомієліту
- D. Проти дифтерії, коклюшу, правця
- E. Проти гепатиту B

58. Медична сестра здійснює догляд за дитиною з гіпотрофією. Що необхідно включити до плану незалежних медсестринських втручань при догляді за такою дитиною?

- A. Постійний контроль маси тіла
- B. Проведення очисної клізми

- C. Вимірювання артеріального тиску
- D. Введення еубіотиків
- E. Введення антибіотиків

59. Пацієнт К. 43-х років скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. З чим пов'язаний даний стан пацієнта?

- A. Гостра кишкова непрохідність
- B. Перфорація виразки шлунку
- C. Гострий аппендицит
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий холецистит

60. Медична сестра сімейного лікаря проводить за його дорученням збір інформації про захворюваність на дільниці. Які показники будуть її цікавити?

- A. Показники тимчасової стійкої втрати працездатності, причин смерті
- B. Витрати на медико-гігієнічне навчання населення
- C. Співвідношення народжуваності та смертності
- D. Дані перепису населення
- E. Відсутність розбіжностей у захворюваності серед чоловіків і жінок

61. На яку суму здійснюється списання товарів відповідно до існуючої інструкції МОЗ України?

- A. Не більше 0,1% від загального товарообігу
- B. Не більше 1% від загального товарообігу
- C. Не більше 2% від загального товарообігу
- D. Не більше 5% від загального товарообігу
- E. Не більше 10% від загального товарообігу

62. Наркотичні лікарські засоби, термін придатності яких минув, для списання і знищення необхідно передати з аптек:

- A. На аптечний склад
- B. До комісії ЛПЗ
- C. До спецкомісії УВС
- D. До комісії ЗОЗ
- E. На завод, де були виготовлені ліки

63. Для заміщення втраченої крові хірург призначив переливання 1л свіжоцитратної крові. Медична сестра на кожні 500 мл перелитої донорської крові вводить внутрішньовенно 10 мл 10% розчину кальцію хлориду. Яке ускладнення це допоможе попередити?

- A. Цитратний шок
- B. Геморагічний шок
- C. Тромбоз судин
- D. Інфікування рани
- E. Алергічна реакція

64. Жінка отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Її турбує сильний пекучий біль. При огляді: гіперемія передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Визначте площу і ступінь опіку:

- A. 9%, II ступінь
- B. 18%, II ступінь
- C. 9%, III А ступінь
- D. 18%, III Б ступінь
- E. 4%, IV ступінь

65. За допомогою звернувся пацієнт Д. 58-ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: виявлено напружене та болюче вип'ячування в паховій ділянці справа. Що можна припустити?

- A. Защемлення пахової киля
- B. Защемлення пупкової киля
- C. Незащемлену пахову килу
- D. Незащемлена стегнова кила
- E. Невправима калиткова кила

66. За порадою звернувся чоловік 42-х років зі скаргами на біль в животі, загальну слабкість. Три години тому брав участь у бійці, отримав удар ногою в живіт. При огляді: живіт участі в акті дихання не бере, при пальпації м'який, справа спостерігається біль і напруження м'язів. Пульс в межах норми. Що необхідно зробити в першу чергу?

- A. Холод на живіт
- B. Грілку на живіт
- C. Ввести знеболювальні
- D. Ввести спазмолітики
- E. Заборонити пити

67. Пацієнтові, який перебуває на лікуванні в онкологічному диспансері з приводу раку шлунка, призначено хіміотерапію. Яка побічна дія цитостатичних препаратів?

- A. Блювання
- B. Дисфагія
- C. Анізокорія
- D. Закрепи
- E. Гіпотермія

68. В онкологічному диспансері на лікуванні з приводу пухлини легень перебуває пацієнт Н. 50-ти років. Яке з досліджень є найінформативнішим?

- A. Гістологічне
- B. Бактеріологічне
- C. Імунологічне
- D. Цитогенетичне
- E. Біохімічне

69. У жінки О. 63-х років під час проведення профілактичного огляду грудних залоз виявлено: почервоніння та потовщення соска лівої молочної залози, наявні кірочки, струпи.

Після їх зняття з'явилася волога та зерниста поверхня шкіри. Як називається таке захворювання?

- A. Рак Педжета
- B. Рак медулярний
- C. Аденокарцинома
- D. Аденома
- E. Кіста

70. Вихідною базою для визначення витрат кошторису лікарні на наступний рік є затверджені кошторисні асигнування та їх виконання. За який період мають бути ці дані?

- A. За поточний рік
- B. За минулий рік
- C. За 2 минулих роки
- D. За 3 минулих роки
- E. За останні 5 років

71. Яка система охорони здоров'я повинна бути в сучасній Україні, згідно з концепцією МОЗ України?

- A. Мішана
- B. Державне управління охороною здоров'я
- C. Приватна медицина
- D. Медичне страхування
- E. Централізоване планування

72. При обстеженні пацієнта з ревматоїдним артритом виявлено проблему: біль у суглобах. З ураження яких суглобів починається дане захворювання?

- A. Дрібні суглоби кистей рук і стоп
- B. Великі суглоби верхніх кінцівок
- C. Кульшові суглоби
- D. Плечові суглоби
- E. Великі суглоби нижніх кінцівок

73. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A. УЗД органів черевної порожнини
- B. Загальний аналіз крові
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Кров на діастазу
- E. Кров на визначення рівня холестерину

74. Рецензент статті науково-медичного журналу приступає до написання рецензії. Що насамперед йому необхідно зробити?

- A. Визначити актуальність статті
- B. Написати анотацію
- C. Прочитати та проаналізувати зміст журналу в цілому

- D. Переказати зміст статті
- E. Написати резюме

75. Робота, в якій критично оцінюються основні положення та результати дослідження, звертається увага на актуальність теоретичних положень, оригінальність підручників, достовірність отриманих результатів, - це:

- A. Рецензія
- B. Стаття
- C. Анотація
- D. Навчальний посібник
- E. Монографія

76. Пацієнтові Ф. 59-ти років проводиться резекція шлунку під загальним знеболюванням. Об'єктивно: обличчя бліде, зіниці розширені, тонус м'язів різко знижений. АТ- 90/60 мм рт.ст. Якій стадії наркозу відповідають такі ознаки?

- A. III
- B. I
- C. II
- D. IV
- E. V

77. У дитини 6-ти місяців раптово виникла зупинка дихання, шкіра вкрита холодним липким потом, чути гучний вдих - "півнячий крик". З яких незалежних медсестринських втручань необхідно почати невідкладну допомогу?

- A. Натискання на корінь язика
- B. Ввести 50% розчин анальгін
- C. Ввести 0,5% седуксен
- D. Ввести 1% розчин нікотинової кислоти
- E. Проведення штучної вентиляції легень

78. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- A. Анафілактична реакція
- B. Септичний шок
- C. Пірогенна реакція
- D. Гемолітична реакція
- E. Цитратний шок

79. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксант короткої дії - дитилін. Чим можна усунути залишкову дію цього препарату?

- A. Прозерин
- B. Налоксон
- C. Мезатон
- D. Адреналін
- E. Атропін

80. У дитини 5-ти років після вживання в їжу полуниць розвинулася кропив'янка. Який з ентеросорбентів потрібно застосувати в даному випадку?

- A. Ентеросгель
- B. Кларитин
- C. Фенкарол
- D. Тавегіл
- E. Цетрин

81. Дитина 4-х років стала дратівливою, погано спить, скаржиться на біль в животі, сильний свербіж у ділянці перианальних складок. Яке захворювання можна припустити?

- A. Ентеробіоз
- B. Трихоцефальоз
- C. Коліт
- D. Аскаридоз
- E. Ентерит

82. При огляді хворої дитини 3-х років медична сестра виявила: "зірчастий" геморагічний висип на тілі, блювання, ригідність м'язів потилиці, підвищення температури до 38оС. Яке захворювання можна припустити?

- A. Менінгококцемія
- B. Мала хорія
- C. Туберкульозний менінгіт
- D. Геморагічний васкуліт
- E. Екламсія

83. Медичній сестрі потрібно нагодувати недоношену новонароджену дитину. Відсутні смоктальний і ковтальний рефлекс. Вкажіть найдоцільніший метод годування дитини:

- A. Через зонд
- B. Парентеральний
- C. З ложечки
- D. З пляшечки
- E. Прикладання до грудей

84. Захворювання є результатом довготривалого перенапруження м'язів плечового поясу. Зустрічається у робітників різних професій: ковалів, малярів, кочегарів, вантажників тощо. Об'єктивно: визначається невелика припухлість і помірна болючість при пальпації плечового суглобу. Яке це захворювання?

- A. Періартрит плечового суглобу
- B. Стенозуючий лігаментит
- C. Крепітуючий тендовагініт передпліччя
- D. Асептичний остеонекроз
- E. Координаційний невроз

85. В центральній районній лікарні підраховали показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу кожного класу захворювань. Які графіки можна застосувати для даних показників?

- A. Секторні, лінійні
- B. Стовпчикові, лінійні
- C. Об'ємні, картограма
- D. Радіальні, фігурні
- E. Картограма, радіальні

86. У пацієнта Н. проведено пробу за Зимницьким: 6:00-90 мл; 9:00-110 мл; 12:00-100 мл; 15:00-150 мл; 18:00-120 мл; 21:00-80 мл; 24:00-160 мл; 3:00-50 мл. Який це ряд?

- A. Динамічний, інтервальний
- B. Варіаційний, інтервальний
- C. Динамічний, дискретний
- D. Динамічний, моментний
- E. Ранговий, згрупований

87. У місті К. від вроджених вад померло троє дітей до 28-ми днів. Який це показник?

- A. Неонатальна смертність
- B. Загальна смертність
- C. Рання неонатальна смертність
- D. Постнеонатальна смертність
- E. Спеціальна смертність

88. У дитячій поліклініці було щеплено 2117 дітей до 14-ти років та прочитано 1117 лекцій в дитячих дошкільних та шкільних закладах. Які заходи були проведені?

- A. Первинні профілактичні
- B. Амбулаторні
- C. Вторинні профілактичні
- D. Лікувально-діагностичні
- E. Медичні

89. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця маніпуляційної медсестри?

- A. Природне
- B. Штучне
- C. Мішане
- D. Люмінесцентними лампами
- E. Не має значення

90. Який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, якщо зацікавленість у результатах є високою, як з боку керівництва лікарні, так і з боку працівників середньої медичної ланки:

- A. Співпраця
- B. Тиск
- C. Уникнення
- D. Примирення
- E. Переговори

91. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналася, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

- A. Агравация
- B. Симуляція
- C. Дисимуляція
- D. Апеляція
- E. Атаксія

92. Під час профілактичного обстеження в жіночій консультації у пацієнтки Л. 65-ти років під час пальпації молочних залоз виявили ущільнення розміром 0,5 см в діаметрі у верхньому квадранті правої молочної залози. Яке з перерахованих нижче обстежень слід провести першочергово?

- A. Мамографія
- B. Загальноклінічні аналізи
- C. Рентгенографія
- D. Біопсія
- E. Сцинтиграфія

93. У клініку звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на біль в животі, який виникає через 15-20 хв. після прийому їжі, відрижку кислим. Як характеризується цей біль?

- A. Ранній
- B. Пізній
- C. Голодний
- D. Оперізуючий
- E. Періодичний

94. У пацієнта спостерігаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

- A. Виразкова хвороба шлунку
- B. Жовчнокам'яна хвороба
- C. Гастрит
- D. Езофагіт
- E. Дискінезія жовчовивідних шляхів

95. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- A. Загальний аналіз сечі
- B. Проба за Зимницьким
- C. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- D. Визначення креатиніну
- E. Визначення протеїнурії

96. До приймального відділення доставлено пацієнта з виразковою хворобою шлунку. Раптово у хворого розпочалося блювання кольору кавової гущі. Суб'єктивно пацієнт почуває себе задовільно, може рухатися самостійно. Як хворого необхідно транспортувати?

- A. На каталці-ношах
- B. В кріслі-каталці
- C. Самостійною ходою
- D. Пішки при підтримці медсестри
- E. Ліфтом у супроводі медсестри

97. В хірургічному відділенні готується Кдо планової операції пацієнт К. 55-ти років, в анамнезі якого порушення периферичного кровообігу нижніх кінцівок. Яке ускладнення може виникнути в післяопераційний період?

- A. Тромбоз вен
- B. Розвиток пневмонії
- C. Динамічна кишкова непрохідність
- D. Запалення країв рани
- E. Реактивний психоз

98. Надається допомога постраждалому 35-ти років, в якого була стиснута нижня кінцівка більше 4-х годин. Яка першочергова дія під час надання допомоги?

- A. Накласти джгут вище стиснення
- B. Ввести дихальні та серцеві аналептики
- C. Виконати інфузію реополіглюкіну
- D. Звільнити стиснуту кінцівку
- E. Виконати блокаду кінцівки

99. У соматичному відділенні лікується дитина 8-ми місяців з пневмонією. Яка інформація стосовно догляду за дитиною буде найбільш корисною для матері?

- A. Частіше брати на руки, змінювати положення в ліжку
- B. Вимірювати температуру тіла через 2 години
- C. Поїти через кожні 30 хвилин
- D. Стежити за кольором шкіри
- E. Підраховувати через кожні 10 хвилин кількість дихань за 1 хвилину

100. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- A. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька
- B. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- C. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- D. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- E. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

101. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

- A. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська
- B. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- C. Управлінська, наукова, виробнича, збутова

- D. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- E. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

102. Старша медична сестра відділення готується до лекції на тему: "Інформаційне забезпечення управління". До яких документів належить Статут?

- A. Організаційні
- B. Інформаційні
- C. Розпорядчі
- D. Фінансово-розрахункові
- E. Інші

103. Головна медична сестра лікарні готується до лекції з теми "Управління конфліктами та стресами". Вкажіть основні компоненти переговорів:

- A. Обмін інформацією
- B. Ведення бесіди
- C. Наявність спільної мети
- D. Наявність протилежних поглядів та думок
- E. Наявність інтриг

104. Поділ тексту наукової роботи на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків та їх нумерації має назву:

- A. Рубрикація тексту
- B. Робота над остаточним варіантом рукопису
- C. Вибірковий виклад матеріалів
- D. Групування матеріалу в бібліографічних описах
- E. Впорядкування внутрішньотекстових посилань

105. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія". t_{o38} , $5oC$. Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- A. Після нормалізації температури тіла
- B. Після одужання від пневмонії
- C. Одразу
- D. Немає обмежень в часі
- E. Натщесерце

106. Через 10 днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулася до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, t_{o37} , $4oC$, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. До якого відділення слід госпіталізувати хвору?

- A. Нефрологічне
- B. Терапевтичне
- C. Урологічне
- D. Кардіологічне
- E. Інфекційне

107. В ході складання річного звіту головна медична сестра повинна графічно відобразити динаміку загального рівня захворюваності серед населення за останні 5 років. Який вид діаграми вона використає?

- A. Стовпчикова
- B. Секторна
- C. Картограма
- D. Внутрішньостовпчикова
- E. Радіальна

108. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- A. Кордіамін
- B. Еуфілін
- C. Мезатон
- D. Фенобарбітал
- E. Адреналін

109. У пацієнта 19-ти років після укусу невідомої комахи раптово з'явилися інтенсивний свербіж шкіри, почервоніння, висипання, які виступають над поверхнею шкіри. Пізніше виникли різні за розміром пухирці, заповнені прозорою рідиною, температура тіла підвищилася до 38°C. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Кропив'янка
- B. Сироваткова хвороба
- C. Геморагічний діатез
- D. набряк Квінке
- E. Анафілактичний шок

110. Під час проведення плевроцентезу пацієнт 65-ти років став блідим, млявим, шкіра вкрилася холодним потом. Дихання прискорене, поверхнєве, пульс швидкий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений. Який препарат необхідно терміново ввести парентерально, за стандартом надання невідкладної допомоги?

- A. Кофеїн
- B. Атропін сульфат
- C. Корглікон
- D. Глюкозу
- E. Реополіглюкін

111. Хворий перебуває в хірургічному відділенні після апендектомії. Вкажіть фактор високого ризику, який затримує відновлення дихальної системи у даного пацієнта:

- A. Застосування морфіну
- B. Спинномозкова анестезія
- C. Тривалі блювання
- D. Діабет
- E. Зупинка дихання під час операції

112. Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим можна зняти даний стан у пацієнта?

- A. Інгаляція кисню
- B. Зігрівання хворого
- C. Протисудомні засоби
- D. Заспокійливі засоби
- E. Протиаритмічні засоби

113. Пацієнта Ю. 21-го року готують до планового оперативного втручання, він попередньо погодився з планом лікування. Коли востаннє підтверджується згода цього пацієнта на операцію?

- A. Безпосередньо перед премедикацією
- B. Напередодні операції
- C. У день операції зранку
- D. Перед письмовою згодою
- E. Під час написання письмової згоди

114. Як часто медична сестра повинна контролювати пульс, артеріальний тиск та загальний стан хворого в перший день після операції?

- A. Через кожні 2 години
- B. Через кожну годину
- C. Через кожні 30 хвилин
- D. Через кожні 4 години
- E. Через кожні 6 годин

115. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

- A. Показник загальної захворюваності
- B. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
- C. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню
- D. Дані про профілактичний огляд
- E. Дані перепису населення

116. Головний лікар міської лікарні у методах свого керівництва виключає хаотичність, діє відповідно до заздалегідь спланованих схем. Така поведінка забезпечує досягнення поставленої мети. Вкажіть тип діяльності керівника:

- A. Діловий
- B. Ліберальний
- C. Компромісний
- D. Авторитарний
- E. Колегіальний

117. Існує багато методик оцінки ефективності досліджень, але всі вони зводяться до того, що основною оцінкою реального вкладу за рік виступає:

- A. Коефіцієнт економічної ефективності

- В. Сума коштів, вкладених в наукову тематику
- С. Тривалість розробки
- Д. Ступінь відповідності вирішення завдань поставленим вимогам
- Е. Глибина опрацювання тематики

118. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- А. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- В. Регламенту
- С. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- Д. Нової теми досліджень
- Е. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

119. У хлопчика 4-х років погане самопочуття: виражена слабкість, знижена рухова активність, блідість шкірних покривів. На шкірі та слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

- А. Зниження рівня тромбоцитів
- В. Зниження рівня гемоглобіну
- С. Запалення дрібних судин
- Д. Дефіцит ІХ фактора
- Е. Підвищена швидкість осідання еритроцитів

120. В ході активного патронажу медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

- А. Постійна крововтрата
- В. Аутоімунні захворювання крові
- С. Хронічний гепатит
- Д. Вплив іонізуючого опромінення
- Е. Резекція тонкої кишки

121. Патронажна медична сестра дитячої поліклініки підраховує відсоток дітей, які перебували на грудному вигодовуванні до 4-х місяців життя. Вкажіть показник за яким Ви це визначите:

- А. Екстенсивний
- В. Інтенсивний
- С. Показник наочності
- Д. Показник співвідношення
- Е. Показник укомплектованості

122. Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

- А. Профілактика розвитку ателектазів

- В. Усунення бронхоспазмів
- С. Зменшення хвилювання
- Д. Усунення виділень з дихальних шляхів
- Е. Профілактика дихальної недостатності

123. До системи добровільного фінансування охорони здоров'я належить:

- А. Приватне страхування
- В. Загальне оподаткування
- С. Соціальне медичне страхування
- Д. Обов'язкове медичне страхування
- Е. –

124. До групи зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення на медичні послуги, належать:

- А. Рівень попиту
- В. Цілі ціноутворення
- С. Витрати
- Д. Державне регулювання
- Е. Змінні витрати

125. Завданням медичних працівників на першому етапі диспансеризації є групування так званого диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії субкомпенсації?

- А. 4
- В. 2
- С. 5
- Д. 1
- Е. 3

126. Що можна обрати за одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності дітей на гострі респіраторні хвороби (ГРЗ) у поліклініці?

- А. Випадок захворювання ГРЗ у дитини
- В. Випадок захворювання на хвороби органів дихання
- С. Випадок госпіталізації при ГРЗ
- Д. Випадок догляду за дитиною, хворою на ГРЗ
- Е. Дитина хвора на грип

127. Дитині 3 місяці. Об'єктивно: виражена блідість слизових оболонок, шкірних покривів, підвищена пітливість, особливо голови, неспокій, "облісіння" потилиці. Вигодовування штучне. Про яке захворювання свідчить даний стан дитини?

- А. Рахіт, початковий період
- В. Рахіт, період розпаду
- С. Анемія
- Д. Рахіт, період реконвалесценції
- Е. Рахіт, період залишкових явищ

128. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A. Вартість медичних послуг
- B. Співвідношення збуту й цін
- C. Загальні та відносні витрати
- D. Імовірні стратегії конкурентів
- E. Показники повторних купівель

129. Які моделі системи охорони здоров'я виділяються на основі класифікації за маркетинговими відносинами суб'єктів даної системи?

- A. Ринкова, неринкова, натуральна, модель змішаного типу
- B. Класична, плюралістична, страхова, національна, соціалістична
- C. Утилітарна, комунотарна, ліберальна
- D. Приватна, державна
- E. Класична ринкова, страхова утилітарна, національно-ліберальна

130. Охарактеризуйте, який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, коли людину мало турбує, що вона отримає в результаті, як для себе, так і для іншої сторони:

- A. Уникнення
- B. Тиск
- C. Примирення
- D. Співпраця
- E. Компроміс

131. Медсестра проводить клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Який з симптомів буде характерним для II періоду даного захворювання?

- A. Гостра ниркова недостатність
- B. Нормалізація функції нирок
- C. Локальні зміни в ушкоджених тканинах
- D. Бактеріальні ускладнення
- E. Ендогенна інтоксикація

132. При аналізі народжуваності найвищий показник в області спостерігався серед жінок 22-х років. Який це показник?

- A. Віковий
- B. Загальний
- C. Показник народжуваності
- D. Середній
- E. Тотальний

133. В поліклініці проводили диспансерне спостереження людей за соціальними показниками. Які групи людей було охоплено в ході спостереження?

- A. Працівники навчальних та харчових закладів
- B. Хворі на окремі хронічні захворювання
- C. Часто та тривало хворіючі
- D. Особи, які мають донозологічні стани
- E. Студенти навчальних закладів

134. З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- A. Спеціальне вибіркоче дослідження
- B. Медичний огляд окремих груп
- C. Профілактичний
- D. Загальний
- E. Поточний

135. Дев'ятимісячна дитина під наглядом лікаря-педіатра проходить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

- A. 2000 - 5000 МО
- B. 500 - 1000 МО
- C. 250 - 500 МО
- D. 1000 - 2000 МО
- E. 5000 - 10000 МО

136. До стаціонару доставлено дитину 2-х років, у якої 3 години тому під час гри з мозаїкою почався напад непродуктивного кашлю. Об'єктивно: дитина збуджена, температура тіла нормальна. Що може бути причиною такого стану?

- A. Стороннє тіло у дихальних шляхах
- B. Бронхіальна астма
- C. Бронхіт
- D. ГРВІ
- E. Пневмонія

137. У пацієнта 42-х років туберкульоз легень. Вкажіть найбільш оптимальний препарат для терапії даного пацієнта:

- A. Рифампіцин
- B. Канаміцин
- C. Ампіокс
- D. Цефтріаксон
- E. Еритроміцин

138. Якщо планування - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття управлінських рішень, то першим його етапом є:

- A. Визначення та аналіз проблеми
- B. Визначення цілей програми та головних дій щодо її реалізації
- C. Вибір правильного рішення
- D. Визначення технічних методів виконання
- E. Визначення альтернативних варіантів

139. Основні джерела інформації, які характеризують захворюваність за даними медичних оглядів (цільових, попередніх, періодичних), - це:

- A. Список осіб, що підлягають медичним оглядам
- B. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
- C. Талон амбулаторного пацієнта
- D. Листок непрацездатності

Е. Статистична карта пацієнта, що вибув зі стаціонару

140. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом спостерігаються нудота, блювання, свербіння шкіри. Об'єктивно: стан важкий, психічна загальмованість, шкіра суха, запах аміаку з рота, АТ- 190/110 мм рт.ст., тони серця приглушені, аритмічні, ЧСС- 76/хв. Який стан виник у пацієнта?

- А. Уремія
- В. Гіпоглікемія
- С. Гіперглікемія
- Д. Ниркова колька
- Е. набряк легенів

141. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на болі в суглобах, субфебрильну температуру. При огляді: на спинці носа і щоках висип, що нагадує крила метелика. Погіршення стану пов'язує з перебуванням на сонці. Розвиток якого захворювання можна припустити?

- А. Системний червоний вовчак
- В. Ревматичний артрит
- С. Гострий лейкоз
- Д. Ревматоїдний артрит
- Е. Кропив'янка

142. У дівчинки 4-х років $t_{o} = 37,4^{\circ}\text{C}$, утруднене носове дихання, слизовосерозні виділення з носу, захриплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

- А. Гострий ларингіт
- В. Гострий фарингіт
- С. Гострий трахеїт
- Д. Гострий бронхіт
- Е. Обструктивний бронхіт

143. У хлопчика 9-ти місяців життя надмірний вологий кашель, задишка з утрудненим видихом, дистанційні хрипи, ЧДР- 52/хв., ЧСС- 110/хв., температура тіла - $36,9^{\circ}\text{C}$. На що треба звернути увагу в першу чергу при плануванні сестринського обстеження?

- А. Частота дихальних рухів
- В. Частота серцевих скорочень
- С. Температура тіла
- Д. Аускультация легень
- Е. Характер харкотиння

144. Медсестра здійснює догляд за дитиною 10-ти років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

- А. Еритроцитурія, циліндрурія
- В. Лейкоцитурія, бактеріурія
- С. Підвищення цукру, циліндрурія
- Д. Лейкоцитурія, еритроцитурія
- Е. Еритроцитурія, бактеріурія

145. Жінка 30-ти років, яка перебуває в психіатричному диспансері з діагнозом маніакально-депресивний психоз у стані депресії, вже 3-й день поспіль відмовляється від приймання їжі. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?

- A. Вдатися до годування через зонд
- B. Продовжувати переконувати у необхідності поїсти
- C. Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти
- D. Попросити допомоги у сусідів по палаті
- E. Ввести хворій снодійне

146. У хворої на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

- A. II ступінь
- B. III ступінь
- C. I ступінь
- D. V ступінь
- E. IV ступінь

147. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації спостерігаються набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

- A. Ревматична гарячка, поліартрит
- B. Ревматична гарячка, ревмокардит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Деформуючий остеоартроз
- E. Ревматична гарячка, мала хорея

148. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

- A. Везикулопустульоз
- B. Пухирчатка новонароджених
- C. Псевдофурункульоз
- D. Фурункульоз
- E. Герпес-інфекція

149. Вкажіть вік, з якого недоношеним дітям починають проводити профілактику рахіту:

- A. 10-20-й день життя
- B. 2-й місяць життя
- C. 5-й день життя
- D. 3-й місяць життя
- E. Одразу після народження

150. Чоловік працює акумуляторщиком протягом 12-ти років. Доставлений в хірургічне відділення зі скаргами на різкий переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень впродовж 2-х діб. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. При огляді: живіт втягнутий; при пальпації: розлитий біль,

переважно навколо пупка. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- A. Свинцева колька
- B. Гострий апендицит
- C. Гострий панкреатит
- D. Гострий холецистит
- E. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки