

Крок М. Лікувальна справа –2018

Буклет

1. "Кинджальний біль", виразковий анамнез, напруження м'язів передньої черевної стінки це:

- A. *Тріада Мондора
- B. Тріада Лаффіте
- C. Тріада Крисчена
- D. Тріада Огюстена
- E. Тріада Кондора

2. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4оС, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

- A. *Ревматична хвороба
- B. Ревматоїдний артрит
- C. Остеоартроз
- D. Остеохондроз
- E. Подагра

3. Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:

- A. *Дезінфекції
- B. Утилізації
- C. Сортунню
- D. Стерилізації
- E. Передстерилізаційній обробці

4. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6оС. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

- A. *Гостра кропив'янка
- B. Рожевий лишай
- C. Алергічний дерматит
- D. Синдром Лайєла
- E. Токсикодермія

5. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмі- чаються жовтувато-білі крапки розміром з головку шпильки. Визначте діагноз:

- A. *Фолікулярна ангіна
- B. Катаральна ангіна
- C. Лакунарна ангіна
- D. Дифтерія глотки
- E. Виразково-плівчаста ангіна

6. До ФАПУ машиноюшвидкої допомоги терміново доставили пацієнта 20-ти років, у якого блювотні маси мають вигляд "кавової гущі". Вкажіть, про що це свідчить:

- A. *Шлункова кровотеча

- В. Легенева кровотеча
- С. Стеноз воротаря шлунка
- Д. Анорексія
- Е. Кровотеча з розширених вен стравоходу

7. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 8-ми років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемованій шкірі, підвищення температури тіла до 38оС. Об'єктивно: у зіві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідість носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А. *Скарлатина
- В. Атопічний дерматит
- С. Краснуха
- Д. Вітряна віспа
- Е. Кір

8. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- А. *Диспансерний нагляд
- В. Оперативне лікування
- С. Санаторно-курортне лікування
- Д. Фізіотерапевтичні методи лікування
- Е. Медикаментозне лікування

9. До фельдшера звернувся хлопчик 10-ти років зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Комірка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити?

- А. *Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)
- В. Геморагічний васкуліт
- С. Гемофілія
- Д. Гострий лейкоз
- Е. Гемолітична анемія

10. Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, швидку стомлюваність, сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла струмектомію з приводу тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Рс- 58/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/55 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний під час пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої:

- А. *L-тироксин
- В. Гіпотіазид
- С. Йодид калію
- Д. Мерказоліл
- Е. Ловастатин

11. Дитина 3-х місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулася до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

- А. *Недогодовування
- В. Перегодовування
- С. Кишковий токсикоз

- D. Просту диспепсію
- E. Парентеральну диспепсію

12. Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, пінисті, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Трихомоніаз
- B. Хламідіоз
- C. Гонорея
- D. Сифіліс
- E. Кандидоз

13. Фельдшер під час дезінфекції шприців та голок випадково направив струмінь дезрозчину собі в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

- A. *Промити очі струменем проточної води
- B. Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря
- C. Промити очі 3% розчином перексиду водню
- D. Промити очі перевареною водою
- E. Накласти на очну щілину асептичну пов'язку

14. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- A. *Міокардит
- B. Вогнищева пневмонія
- C. Гломерулонефрит
- D. Сироваткова хвороба
- E. Набута вада серця

15. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. При проведенні проби Манту у дитини 5-ти років виявлена папула 7 мм. Як оцінюється проба Манту?

- A. *Позитивна проба Манту
- B. Негативна пробу Манту
- C. Гіперергічна проба Манту
- D. Сумнівна проба Манту
- E. Віраж туберкулінової проби

16. Дівчина 14-ти років скаржиться на болі у животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча кольору "пива". Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Вірусний гепатит
- B. Гострий холецистит
- C. Гострий гастрит
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Жовчнокам'яна хвороба

17. До фельдшера ФАПУ звернувся чоло- вік 26-ти років, зі скаргами на кашель з виділенням незначної кількості "іржавого" мокротиння, біль в грудній клітці справа під лопаткою, який посилюється на вдиху та при кашлі, різку слабкість. Захворів два дні тому після переохолодження. Об'єктивно: $t_0 - 39^{\circ}\text{C}$, стан тяжкий, шкірні покриви бліді, рум'янець на щоках, дихання поверхневе, задишка. У легенях - при перкусії притуплено

- тимпанічний звук, при аускультатції крепітація на висоті вдиху. Рс- 100/хв., ЧД- 30/хв.

Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. *Негоспітальна пневмонія
- B. Гострий бронхіт
- C. Інфаркт легені
- D. Сухий плеврит
- E. Екссудативний плеврит

18. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

- A. *Виділення пінистої крові яскраво- червоного кольору при кашлі
- B. Відсутність блювання
- C. Артеріальна гіпертензія
- D. Блювання "кавовою гущею"
- E. Кров, що виділяється, має темне забарвлення

19. Вагітна звернулась на ФАП до фельдшера зі скаргами на головну біль, нудоту, 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ- 180/110 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 175/105 мм рт.ст. Рс- 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

- A. *Прееклампсія тяжкий ступінь
- B. Прееклампсія легкий ступінь
- C. Набряки під час вагітності
- D. Гіпертонічний криз
- E. Ранній гестоз вагітних

20. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. *Алергічний діатез
- B. Анемія
- C. Гіпотрофія
- D. Рахіт
- E. Пітниця

21. Хворий 38-ми років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині груднини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. *ІХС. Стенокардія, що вперше виникла
- B. ІХС. Гострий інфаркт міокарда
- C. ІХС. Стабільна стенокардія напруження III ФК
- D. ІХС. Стабільна стенокардія напруження IV ФК
- E. Нейроциркуляторна дистонія

22. Після автомобільної аварії потерпілий скаржить на біль у грудній клітці, неможливість глибокого вдиху, задишку. Об'єктивно: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана, з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:

- A. *Пневмоторакс
- B. Відкритий перелом ребер
- C. Поранення серця
- D. Поранення м'яких тканин
- E. Поранення легені

23. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на нападopodobний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий присмак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для невідкладної допомоги фельдшер приготує:

- A. *Ренальган
- B. Холензим
- C. Маалокс
- D. Альмагель
- E. Кордіамін

24. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 65-ти років, який скаржиться на кашель, наявність прожилків крові в мокротинні, задишку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит. Ці симптоми з'явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу: курить з 20-ти років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер?

- A. *Рак легень
- B. Хронічний гастрит
- C. Абсцес легень
- D. Гангрена легень
- E. Емпієма плеври

25. Пацієнт 25-ти років із діагнозом грип перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезін- фекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- A. *Вогнищева поточна
- B. Вогнищева заключна
- C. Профілактична
- D. Механічна
- E. Комбінована

26. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

- A. *На животі
- B. На лівому боці
- C. На правому боці
- D. На спині
- E. Сидячи

27. Пацієнтка 29-ти років надійшла до гінекологічного відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Скарги на переймоподобний біль у правій клубовій ділянці. Затримка менструації 5 тижнів. Загальний стан середньої важкості, Рс- 90/хв., АТ- 105/60 мм рт.ст. Пальпаторно: живіт болючий в нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга невиражений. Бімануально: збільшені та болючі додатки справа. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A. *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- B. Зондування порожнини матки
- C. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- D. Гістеросальпінгографія
- E. Біопсія ендометрію

28. Ви прийшли на патронаж до дитини 1 місяць. Оцініть поствакцинальні зміни на місці введення вакцини БЦЖ:

- A. *Інфільтрат
- B. Кірочка
- C. Рубець
- D. Лімфаденіт
- E. Везикула

29. До фельдшеру ФАПУ звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, децю гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Злоякісне новоутворення молочної залози
- B. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- C. Первинний сифіліс
- D. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- E. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

30. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

- A. *Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень
- B. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- C. Штучна вентиляція легень
- D. Переведення на апаратне дихання
- E. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

31. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ-80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блумберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Апоплексія яєчника
- B. Перекрути ніжки кісти яєчника
- C. Позаматкова вагітність
- D. Гострий апендицит
- E. Фіброміома

32. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

- A. *Кольпоскопія
- B. Зондування порожнини матки
- C. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- D. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- E. УЗД

33. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся хворий, який годину тому отримав травму правого плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова западина, рухи в суглобі різко обмежені, болючі, носять пружинячий характер. При пальпації головка плечової кістки знаходиться в пахвовій ямці. Назвіть попередній діагноз:

- A. *Вивих правого плеча
- B. Перелом правої плечової кістки

- C. Розрив м'язів правого плеча
- D. Перелом ключиці
- E. Розрив зв'язок плечового суглоба

34. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- A. *Хронічний лімфолейкоз
- B. Хронічний мієлолейкоз
- C. Гострий лейкоз
- D. Гіпопластична анемія
- E. Лімфогранулематоз

35. До фельдшера ФАПУ звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- A. *До дільничного гінеколога
- B. На УЗД
- C. До ВПВ
- D. До гінекологічного відділення
- E. До терапевта

36. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта. При огляді було виявлено відсутність серцевої та дихальної діяльності, звуження зіниць у вигляді "котячого ока", трупні плями на спині, охолодження тіла. Ці ознаки характерні для:

- A. *Біологічної смерті
- B. Клінічної смерті
- C. Коми
- D. Непритомності
- E. Агонального стану

37. У чоловіка раптово розвинувся напад гострого абдомінального болю з іррадіацією ліву поперекову і пахову ділянки, що супроводжуються нудотою, пітливістю частим сечовипусканням. Хворий неспокійний, метушиться у ліжку. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Лівобічна ниркова колька
- B. Дивертикул сигмоподібної кишки
- C. Перекрут лівого яєчка
- D. Ретроперитонеальний крововилив
- E. Герпес Зостера

38. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- A. *Лімфаденіт
- B. Флегмона
- C. Бешиха
- D. Лімфангоїт
- E. Правець

39. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога - нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?
- A. *Морфіну гідрохлорид
 - B. Но-шпу
 - C. Баралгін
 - D. Папаверину гідрохлорид
 - E. Спазмалгон
40. Дитина 5-ти місяців після введення вакцини АКДП зблідла, вкрилася холодним потом, знепритомніла. Про яке ускладнення йдеться?
- A. *Анафілактичний шок
 - B. Ларингоспазм
 - C. Епісиндром
 - D. Екламсія
 - E. Непритомність
41. На ФАП звернулася жінка 42-х років, котра 2 хвилини тому отримала травму розбитим склом під час прибирання в шафі. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана 4x0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:
- A. *Накладання джгута
 - B. Підвищене положення кінцівки
 - C. Стискаюча пов'язка
 - D. Максимальне згинання в суглобі
 - E. Тампонада рани
42. У дитини 5-ти років важкий стан. При огляді зіву збільшення та гіперемія мигдаликів, на яких виявлено щільний фібринозний сірувато-білий наліт, при знятті його спостерігається кровоточивість слизової оболонки. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
- A. *Дифтерія мигдаликів
 - B. Катаральна ангіна
 - C. Скарлатина
 - D. Лакунарна ангіна
 - E. Фолікулярна ангіна
43. Визначте дату пологів, якщо дата останньої менструації 5 жовтня:
- A. *12 липня
 - B. 7 червня
 - C. 1 травня
 - D. 15 серпня
 - E. 17 червня
44. Ви фельдшер ШМД. Виклик до хворого зі скаргами на гострий біль в правому підбер'ї, який виник після прийому смаженої їжі, іррадіація болю в праве плече, гіркоту в роті, блювання жовчю. Хворий збуджений. Ваш попередній діагноз:
- A. *Печінкова коліка
 - B. Хронічний гастрит
 - C. Цироз печінки
 - D. Хронічний панкреатит
 - E. Виразкова хвороба шлунка

45. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4^oC. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- A. *Гектична
- B. Неправильна
- C. Ремітуюча
- D. Хвилеподібна
- E. Інтермітуюча

46. Потерпіла лежить на спині, бліда, байдужа до присутніх, на питання не відповідає. Шкіра покрита холодним липким потом, пульс - 130/хв., слабкого наповнення і напруження, ниткоподібний, АТ- 85/50 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність серця ритмічна. На внутрішній поверхні лівого стегна різана рана розміром 10x15 см, із якої поштовхами витікає кров яскраво червоного кольору. Який вид кровотечі у потерпілого?

- A. *Артеріальна
- B. Венозна
- C. Паренхіматозна
- D. Капілярна
- E. Ювенільна

47. У дитини 5-ти років температура тіла - 38,2^oC, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

- A. *Дизентерія
- B. Сальмонельоз
- C. Колі-ентерит
- D. Ешерихіоз
- E. Стафілококовий ентероколіт

48. Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації:

- A. *Пов'язка Дезо
- B. Зворотня пов'язка
- C. Колосоподібна пов'язка
- D. Спіралеподібна пов'язка
- E. Восьмиподібна пов'язка

49. Перелом якої з наданих кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

- A. *Плечової
- B. Великогомількової
- C. Променевої
- D. Надколінки
- E. П'яркової

50. У першороділлі 24-х років з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ- 120/80 мм рт.ст. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода - 140/хв. Піхове дослідження: шийка матки вкорочена до 1,5 см, відкриття - 3 см. Плідний

міхур цілий, напружений. Голівка плода притиснута до входу у малий таз. Назвіть період пологів:

- A. *I період пологів
- B. Передвісники пологів
- C. Прелімінарний період
- D. III період пологів
- E. Початок II періоду пологів

51. Хворому 36-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової приналежності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів ABO аглютинація спостерігалася в краплях із сироватками 0(I) і B(III) і не спостерігалася - з сироваткою A(II). Еритроцитарну масу якої групи потрібно перелити пацієнтові?

- A. *A(II)
- B. AB(IV)
- C. 0(I)
- D. B(III)
- E. –

52. У пацієнта 33-х років туберкульоз легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Які дії фельдшера?

- A. *Покласти міхур із льодом на грудну клітку
- B. Зробити масаж грудної клітки
- C. Поставити банки
- D. Дати зволожений кисень
- E. Поставити гірчичники на грудну клітку

53. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

- A. *Стерильна вазелінова олія
- B. Гліцерин
- C. Антисептичний розчин
- D. Вазелін
- E. Розчин фурациліну

54. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилася нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

- A. *Кетоацидотична кома
- B. Гіперосмолярна кома
- C. Гіперлактацидемічна кома
- D. Уремична кома
- E. Печінкова кома

55. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5оС, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації - болючість. Який попередній діагноз?

- A. *Гострий мастит
- B. Фурункул правої молочної залози

- C. Мастопатія
- D. Фібroadенома правої молочної залози
- E. Гіпермастія

56. На ФАПі вагітна в терміні 36 тижнів поскаржилася на різкий головний біль, погіршення зору, біль у ділянці черевного сплетіння. Об'єктивно: артеріальний тиск - 170/110 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Який препарат Ви оберете для надання невідкладної допомоги вагітній?

- A. *16 мл 25% магніюсульфат
- B. 2 мл 50% анальгіну
- C. 150 мг кокарбоксілази
- D. 40 мг лазиксу
- E. 2 мл 1% промедолу

57. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру тіла - 37,6оС, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі - кіста яєчника. Бімануально: матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, малорухоме. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A. *Перекрут ніжки кісти яєчника
- B. Порушена позаматкова вагітність
- C. Апоплексія яєчника
- D. Гострий аднексит
- E. Розрив капсули кісти яєчника

58. За викликом прибув фельдшер ШМД до хворого 62-х років, який скаржиться на стискаючий сильний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Хворий прийняв нітрогліцерин, але біль не вщухає вже 2 години. ЧДР- 20/хв., пульс - 85/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Температура тіла - 37оС. Тони серця приглушені. Вкажіть ймовірний діагноз:

- A. *Гострий інфаркт міокарда
- B. Кардіогенний шок
- C. Стенокардія спокою
- D. Набряк легень
- E. Стабільна стенокардія напруження

59. Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

- A. *Нирки
- B. Печінка
- C. Серце
- D. Легені
- E. Головний мозок

60. Хвора бліда, АТ- 95/60 мм рт.ст., частота пульсу - 100/хв. Який із нижче перерахованих попередніх діагнозів можна встановити жінці зі скаргами на короткочасну втрату свідомості після раптового гострого болювнизу живота, затримку місячних на 5 тижнів?

- A. *Позаматкова вагітність
- B. Загроза раннього викидня
- C. Рак матки

- D. Запальний процес додатків матки
- E. Виразка шлунка

61. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, попрілість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

- A. *Екзема
- B. Кропив'янка
- C. Атопічний дерматит
- D. Токсикодермія
- E. Нейродерміт

62. Фельдшер швидкої медичної допомоги приїхав на виклик до хворого 50-ти років, який скаржиться на ядуху, що триває близько 2-х годин. Об'єктивно: вимушене положення, хворий сидить нахилившись вниз і спираючись ліктями на край ліжка. Дихання - 34/хв. Чутні дистанційні сухі хрипи. Пульс - 84/хв.; АТ- 130/80 мм рт.ст. Інгаляції астмопентом, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Доцільно застосувати препарат:

- A. *Преднізолон
- B. Папаверин
- C. Сальбутамол
- D. Лазолван
- E. Атропін

63. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом "виразкова хвороба шлунка". Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- A. *Гіповолемічний шок
- B. Кардіогенний шок
- C. Анафілактичний шок
- D. Перфорація виразки шлунка
- E. Гостре отруєння

64. В якій дозі вводять преднізолон у разі інфекційно-токсичного шоку II-го ступеня у дитини з менінгококцемією?

- A. *10 мг/кг
- B. 2-3 мг/кг
- C. 3-5 мг/кг
- D. 0,5-1 мг/кг
- E. 30 мг

65. Чому НЕ ДОЦІЛЬНО закапувати в очі більш 1-2 крапель лікарських розчинів?

- A. *У кон'юнктивальній порожнині не утримується більш 1 краплі розчину
- B. Очні краплі містять сильнодіючі речовини
- C. Велика кількість рідини шкодить кон'юктиві
- D. Велика кількість крапель може викликати алергію
- E. Велика кількість препарату шкідливо впливає на зір

66. Пацієнт, що звернувся до фельдшера ФАПу скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. Об'єктивно: "судинні" зірочки на грудях,

печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан ймовірний у пацієнта?

- A. *Цироз печінки
- B. Хронічний гастрит
- C. Виразкова хвороба шлунка
- D. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- E. Рак шлунка

67. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 28-ми років, у якої 3 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помив, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: шкіра бліда. Набряки на обличчі. Пульс - 82/хв, ритмічний, напружений. АТ- 175/125 мм рт.ст., добова кількість сечі - 350 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. *Гострий гломерулонефрит
- B. Гострий пієлонефрит
- C. Хронічний пієлонефрит
- D. Хронічний гломерулонефрит
- E. Гіпертонічна хвороба

68. Вкажіть, за допомогою якого реактиву фельдшер здійснює контроль якості передстерилізаційного очищення інструментаріюна предмет виявлення залишків мию- чого засобу:

- A. *Фенолфталеїновий
- B. Судан-3
- C. Азопірамовий
- D. Бензидиновий
- E. Фекел-2

69. Дівчина 15-ти років звернулася до фельдшера зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 38°C. Живіт болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна- Блюмберга. Які дії слід виконати в першу чергу?

- A. *Терміново госпіталізувати
- B. Спостерігати
- C. Викликати маму
- D. Відпустити додому
- E. Промити шлунок

70. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржить на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіяння шкіри з незначноюкровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

- A. *Відкритий перелом
- B. Закритий перелом
- C. Вивих
- D. Розтягнення зв'язок
- E. Розрив зв'язок

71. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох днів з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному

статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. *Ішемічний інсульт
- B. Геморагічний інсульт
- C. Транзиторна ішемічна атака
- D. Епідуральна гематома
- E. Пухлина мозку

72. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

- A. *Зіскоб з періанальних складок
- B. Копрологічне дослідження випорожнень
- C. Дуоденальне зондування
- D. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- E. Фіброгастродуоденоскопія

73. Чоловік 23-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, нездужання, головний біль. Підвищення температури тіла до 37,5оС, сухий кашель. Хворіє другий день. Об'єктивно: температура тіла - 37,2оС. Загальний стан задовільний. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Перкуторний звук над легеньми ясний. Дихання жорстке, розсіяні сухі свистячі хрипи. ЧДД- 16/хв. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС- 72/хв. АТ- 120/80 мм рт.ст. Ваш діагноз:

- A. *Гострий бронхіт
- B. ХОЗЛ
- C. Бронхіальна астма
- D. Вогнищева пневмонія
- E. Ексудативний плеврит

74. Хворий 36-ти років, звернувся до фельдшера зі скаргами на гострі болі в животі, які виникають через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відмічає в осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відмічається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

- A. *Виразкова хвороба шлунка
- B. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- C. Хронічний холецистит
- D. Хронічний панкреатит
- E. Хронічний ентерит

75. Після народження плода у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'яні виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

- A. *Ознака Шредера
- B. Ознака Кюстнера-Чукалова
- C. Ознака Альфельда
- D. Ознака Клейна
- E. Ознака Штрассмана

76. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

- A. *Дихання Куссмауля
- B. Трахіпное
- C. Брадипное
- D. Дихання Біота
- E. Дихання Чейна-Стокса

77. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "обратити перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

- A. *Кандинського-Клерамбо
- B. Корсакова
- C. Маніакальний
- D. Невротичний
- E. Астенічний

78. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ- 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плода повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене - 160/хв. Перейми, які почались 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

- A. *Загроза розриву матки
- B. Емболія навколоплідними водами
- C. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D. Повний розрив матки
- E. Кінець I періоду пологів

79. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий із скаргами на оперізуючі болі в животі, нудоту, блювання. Зі слів хворого зловживає алкоголем та жирною їжею. При пальпації живіт болючий, особливо посередині живота на 6-7 см вище пупка та в лівих відділах живота. Позитивний симптом Мейо-Робсона. Вкажіть, яке захворювання можна запідозрити у хворого:

- A. *Гострий панкреатит
- B. Гострий холецистит
- C. Гострий апендицит
- D. Кишкова непрохідність
- E. Защемлена кила

80. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 32-х років зі скаргами на задишку з утрудненим видихом. При огляді грудна клітка в положенні максимального вдиху, при перкусії визначається коробковий звук, аускультативно - дихання послаблене, розсіяні свистячі хрипи. Поставте попередній діагноз:

- A. *Бронхіальна астма
- B. Пневмонія
- C. Емфізема легень
- D. Серцева астма
- E. Гострий бронхіт

81. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся працівник зі скаргами на болі в епігастральній ділянці правому підребер'ї. При обстеженні виявлені позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Вкажіть, про яке захворювання можна думати:

- A. *Холецистит
- B. Панкреатит
- C. Пієлонефрит
- D. Гастрит
- E. Виразкова хвороба шлунка

82. Назвіть протипоказання до проведення промивання шлунка:

- A. *Шлунково-кишкова кровотеча
- B. Отруєння ліками
- C. Отруєння концентрованими кислотами
- D. Харчова токсикоінфекція
- E. Алкогольна інтоксикація

83. Бригада ШМД прибула у навчальний заклад. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Запідозрено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

- A. *Застосувати прийоми Геймліха
- B. Ввести знеболюючі
- C. Вставити товсту голку в трахею
- D. Провести трахеостомію
- E. Ввести спазмолітики

84. Хвора 25-ти років, госпіталізована зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, було одноразове блювання. Температура тіла - 37,5°C. При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:

- A. *Гострий апендицит
- B. Гостру кишкову непрохідність
- C. Гострий правобічний аднексит
- D. Правобічний приступ ниркової коліки
- E. Гострий холецистит

85. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Рс- 90/хв., ЧДР- 16/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний характер ушкоджень?

- A. *Струс головного мозку
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Забій головного мозку
- D. Стиснення головного мозку
- E. Перелом основи черепа

86. Фельдшер оглядає дитину 6-ти років, в якій підвищилась температура тіла до 39,5°C, з'явився висип на шкірі обличчя, волосистій частині голови, тулубі, кінцівках у вигляді папул, пухирців із гнійним вмістом. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A. *Вітряна віспа пустульозна форма
- B. Строфулюс
- C. Екسفоліативний дерматит Ріттера
- D. Натуральна віспа
- E. Стрептодермія

87. У новонародженої дитини спостерігається пухлина в ділянці кісток черепа. Пухлина не виходить за межі шва. Різко відмежована від нормальної кістки ущільненим і трохи піднятим над її рівнем валиком. Яку пологову травму можна припустити?

- A. *Кефалогематома
- B. Пологова пухлина
- C. Внутрішньочерепна пологова травма
- D. Гіпоксично-травматична енцефалопатія
- E. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія

88. Ви проводите перший етап оральної регідратації дитині 2-х років з діареєю та зневодненням I-го ступеня. Яким розчином і в якій кількості порекомендуєте матері це робити?

- A. *Регідрон 50 мл/кг
- B. Сік 100 мл після кожної дефекації
- C. Солодкі газовані напої 100 мл/кг
- D. Гемодез 30 мл/кг
- E. Реополіглюкін 50 мл/кг

89. Виклик фельдшера ШМД до хворого. Стан середньої тяжкості. Скарги на сильний головний біль у потиличній ділянці, шум у вухах, нудоту, біль у ділянці серця. Об'єктивно: АТ- 220/110 мм рт.ст., пульс - 82/хв. Попередній діагноз:

- A. *Гіпертонічний криз
- B. Інфаркт міокарда
- C. Стеноз мітрального отвору
- D. Стенокардія напруження
- E. Гостра лівошлуночкова недостатність

90. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту, біль в епігастральній ділянці живота оперізувального характеру, проноси, здуття живота. Об'єктивно: дефіцит ваги 10 кг, при пальпації болючість в епігастральній ділянці живота та лівому підребер'ї. Який попередній діагноз фельдшера?

- A. *Хронічний панкреатит
- B. Хронічний гастрит
- C. Хронічний гепатит
- D. Хронічний ентерит
- E. Хронічний коліт

91. Хворому, який знаходиться на "Д" обліку з приводу гіпертонічної хвороби, призначені препарати з групи інгібіторів АПФ та діуретиків. Вкажіть цюпару препаратів:

- A. *Каптоприл, фуросемід
- B. Атенолол, корвалол
- C. Ніфедипін, нітрогліцерин
- D. Енап, кордарон
- E. Коринфар, фуросемід

92. До фельдшера ФАП звернулась вагітна зі скаргами на болісні незначні кров'янисті виділення які з'явилися вночі. Тактика фельдшера:
А.* Мобілізувати вену, негайно госпіталізувати
В. Ввести но-шпу
С. Ввести окситоцин
D. Провести піхвове дослідження
E. Оглянути шийку в дзеркалах
93. У 12-річного хлопчика, хворого на гемофілію, температура - 39,5оС. Який з жарознижувальних препаратів ПРОТИПОКАЗАНИЙ?
А. *Ацетилсаліцилова кислота
В. Анальгін
С. Парацетамол
D. Піпольфен
E. Но-шпа
94. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?
А. *Лідокаїн
В. Верапаміл
С. Еуфілін
D. Атропін
E. Анальгін
95. Яка ознака відрізняє еклампсію від інших видів пізнього гестозу?
А. *Судоми
В. Головний біль
С. набряки
D. Прибавка у вазі
E. блювання
96. Виклик фельдшера до дитини 8-ми років. Скарги на нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Блювотні маси містять частково перетравлену їжу. Дані симптоми з'явилися через 2 години після вживання великої кількості м'ясного са- лату з майонезом. Які першочергові дії фельдшера?
А. *Промити шлунок і госпіталізувати
В. Залишити хворого дома
С. Дати протиблювотні ліки
D. Назначити дієту і залишити дома
E. Обмежити їжу і пиття
97. Під час чергового огляду у лікаря жіночої консультації у вагітної в терміні 33 тижні виникли судоми з короткочасною втратою свідомості. АТ- 170/100 мм рт.ст. Генералізовані набряки. В сечі: білок - 3 г/л, гіалінові циліндри. Встановіть ймовірний діагноз:
А. *Еклампсія
В. Епілепсія
С. Артеріальна гіпертензія вагітних
D. Судомний синдром
E. Прееклампсія

98. Фельдшера ФАПУ викликали до хлопчика 5-років з нападом судом. Який пре- парат слід ввести дитині?

- A. *Р-н сибазону 0,5%
- B. Р-н еуфіліну 2,4%
- C. Р-н відехолу 0,125%
- D. Р-н димедролу 0,1%
- E. Р-н лазиксу 0,1%

99. У новонародженої дитини на 2-й день життя з'явилась помірна жовтяниця шкіри та склер. Загальний стан задовільний, сон і апетит не порушені. З анамнезу: дитина від II вагітності, у матері - A(II), Rh(+), у дитини A(II), Rh(+). Який стан виник у новонародженого?

- A. *Фізіологічна жовтяниця
- B. Гемолітична хвороба
- C. Пологова травма
- D. Сепсис
- E. Гепатит

100. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

- A. *Краснуха
- B. Кір
- C. Скарлатина
- D. Менінгококцемія
- E. Вітряна віспа

101. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6оС, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A. *Гострий розлад травлення функціонального походження
- B. Дизентерія
- C. Сальмонельоз
- D. Колі-інфекція
- E. Ротавірусна інфекція

102. До фельдшера ФАПУ, звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

- A. *Альгодисменорея
- B. Передменструальний синдром
- C. Мастопатія
- D. Посткастраційний синдром
- E. Вірильний синдром

103. У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

- A. *Експіраторна задишка

- В. Стридорозне дихання
- С. Дихання Біота
- Д. Інспіраторна задишка
- Е. Дихання Куссмауля

104. Який препарат вводять із метою ранньої діагностики туберкульозу?

- А. *Туберкулін
- В. БЦЖ
- С. Фтивазид
- Д. Рифампіцин
- Е. Стрептоміцин

105. В місті виник спалах кишкової інфекції. Скарги пацієнтів на часті випорожнення без болю, без тенезмів. Багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, язик обкладений. Живіт не болючий. Випорожнення у вигляді рисового відвару 10-15 разів на добу. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. *Холера
- В. Черевний тиф
- С. Шигельоз
- Д. Сальмонельоз
- Е. Ботулізм

106. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

- А. *Седуксен, димедрол, аміназин
- В. Кордіамін, супрастин, анальгін
- С. Строфантин, адреналін, тавегіл
- Д. Цефазолін, манітол, еуфілін
- Е. Ефедрин, алупент, атропін

107. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білої лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- А. *Вагітність маткова
- В. Вагітність позаматкова
- С. Пухлина матки
- Д. Ендометриоз матки
- Е. Ендометрит

108. При обстеженні породіллі виявлено: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

- А. *Лактостаз
- В. Гіпогалактія
- С. Мастит
- Д. Лактогенез
- Е. Лактопоез

109. На виробництві чоловік отримав удар електрострумом кілька хвилин тому. Без свідомості, обличчя бліде, зіниці розширені, пульс на сонній артерії не визначається. Які Ваші першочергові дії?

- A. *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B. Приготувати все необхідне для дефібриляції
- C. Вкрити постраждалого ковдрою
- D. Підняти ноги та опустити голову
- E. Чекати приїзду карети ШМД

110. У дитини 2-х років - IV ступінь гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Який метод невідкладної допомоги найдоцільніший в цьому випадку?

- A. *Трахеотомія
- B. Подання зволоженого кисню
- C. Відволікальна терапія
- D. Антигістамінні засоби
- E. Парові інгаляції

111. Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби ці результати заносять до:

- A. *Протоколу переливання крові
- B. Листа інтенсивного нагляду
- C. Температурного листка
- D. Листка лікарняних призначень
- E. Амбулаторної картки

112. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметріюшкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

- A. *Природжений вивих стегна
- B. Травматичний вивих стегна
- C. Застарілий вивих стегна
- D. Звичний вивих стегна
- E. Патологічний вивих стегна

113. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- A. *Гострий фронтит
- B. Гострий етмоїдит
- C. Гострий риніт
- D. Гострий гайморит
- E. Гострий сфеноїдит

114. У дитини віком 1 рік, яка другий день хворіє на ГРЗ, виник гавкаючий кашель, хриплий голос, вночі з'явилася задишка. При огляді фельдшер виявив, що загальний стан середньої тяжкості, дихання шумне, виражені задишка інспіраторного характеру, участь допоміжних м'язів в акті дихання, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. *Стенозуючий ларинготрахеїт
- B. Обструктивний бронхіт

- C. Вогнищева пневмонія
- D. Гострий назофарингіт
- E. Сегментарна пневмонія

115. Ви фельдшер здоров'я пункту школи. У учня 6-го класу, який хворіє на цукровий діабет на 5-му уроці розвинулась слабкість, запаморочення, втрата свідомості, дитина стала бліда, вкрилась холодним потом, появився тремор кінцівок. Який стан розвинувся у дитини?

- A. *Гіпоглікемічна кома
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Непритомність
- D. Колапс
- E. Ацетонемічний синдром

116. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- A. *Баралгін
- B. Вікасол
- C. Дицинон
- D. Алохол
- E. Нітрогліцерин

117. До фельдшера ФАПу із поля, яке оброблене фосфорорганічними отрутохімікатами, доставили пацієнта 35-ти років. Свідомість пацієнта потьмарена, спостерігаються слинотеча, нудота, блювання, порушення дихання, брадикардія, звуження зіниць. Який препарат необхідно застосувати як антидот у даному випадку?

- A. *Атропін
- B. Адреналін
- C. Унітіол
- D. Прозерин
- E. Пентацин

118. Фельдшер проводить санітарно-освітню лекціюна підприємстві з питань профілактики онкозахворювань. Що повинен відповісти фельдшер на питання: "Як часто жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз?"

- A. *1 раз на місяць
- B. 1 раз на тиждень
- C. 1 раз на рік
- D. 2 рази на рік
- E. 2 рази на тиждень

119. Дівчину 12-ти років витягнуто з холодної води через 15 хвилин після утоплення без ознак життя. Які першочергові заходи необхідно проводити фельдшеру при наданні долікарської допомоги?

- A. *Звільнити дихальні шляхи від води і почати серцево-легеневу реанімацію
- B. Не проводити реанімаційних заходів
- C. Транспортувати дитину в найближчий лікувальний заклад
- D. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- E. Ввести кордіамін 1,0 в/м

120. Фельдшер ШМД оглядає роділлюв терміні 38-39 тижнів вагітності. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено: положення плода повздожнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, ІІ позиція, передній вид. Де найкраще вислуховується серцебиття плоду?

- A. *Справа нижче пупка
- B. Зліва нижче пупка
- C. Справа вище пупка
- D. Справа на рівні пупка
- E. Зліва вище пупка

121. Ви фельдшер ФАПУ. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в бактеріологічну лабораторію:

- A. *2 години
- B. 1 година
- C. 3 години
- D. 30 хвилин
- E. 6 годин

122. У потерпілої 20-ти років констатовано клінічна смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- A. *Ппульсація на сонній артерії
- B. Пасивні рухи грудної клітки
- C. Зниження температури тіла
- D. Розширені зіниці
- E. Відсутність свідомості

123. При обстеженні хворої фельдшер ФАПУ виявив: схуднення на 10 кг за 2 місяці, дратівливість, витрішкуватість, тахікардію навіть у спокої. Для гіперфункції якої ендокринної залози характерні дані симптоми?

- A. *Щитоподібна
- B. Підшлункова
- C. Надниркові
- D. Паращитоподібні
- E. Яєчники

124. Виклик ШМД до жінки зі скаргами на сильний різучий біль у правому підребер'ї, який віддає у праве плече, шию, щелепу, повторне блювання. Живіт здутий, болісний у ділянці правого підребер'я. Больовий напад почався після повернення з автобусної екскурсії. Які лікарські препарати слід застосовувати в даній ситуації?

- A. *Папаверин, баралгін
- B. Анальгін, алохол
- C. Но-шпа, фуросемід
- D. Фестал, бісептол
- E. Карсил, ентеросгель

125. Ви - фельдшер ФАПУ, оглядаєте 4-денну дитину після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на

пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовто- червоні кристалики. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

- A. *Сечокислий інфаркт
- B. Токсична еритема
- C. Статевий криз
- D. Транзиторна гіпертермія
- E. Транзиторний дисбактеріоз

126. Робітник 25-ти років раптово знепритомнів і впав на спину. Об'єктивно: шкіра обличчя стала блідою з ціанотичним відтінком. З'явилися спочатку тонічні, а потім клонічні судоми, піна з рота, забарвлена кров'ю, мимовільне сечовипускання. Який невідкладний стан може запідозрити фельдшер?

- A. *Епілептичний напад
- B. Істеричний напад
- C. Геморагічний інсульт
- D. Гіперглікемічна кома
- E. Гіпокальціємічна кома

127. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Об'єктивно: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

- A. *Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки
- B. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- C. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- D. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- E. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

128. На ФАП звернулася жінка 25-ти років, зі скаргами на утруднене носове дихання і ковтання, які з'явилися після укусу оси. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язик набрякли. Фельдшер виставив діагноз: набряк Квінке і ввів в/м димедрол. Стан хворої не покращився. Який з перерахованих препаратів потрібно ввести для покращення стану?

- A. *Преднізолон
- B. Кофеїн
- C. Мезатон
- D. Кордіамін
- E. Баралгін

129. В дитячому садочку виявлена дитина, що захворіла на скарлатину. Які профілактичні заходи необхідно провести в вогнищі інфекції?

- A. *Карантин на 7 днів, огляд контактних
- B. Карантин на 21 день
- C. Поточна дезінфекція, обстеження контактних на менінгокок
- D. Поточна дезінфекція, обстеження на стафілокок
- E. Проведення щеплення контактним

130. Скільки см дорівнює акушерська кон'югата:

- A. *11 см
- B. 12 см
- C. 13 см
- D. 21 см

Е. 25 см

131. III-й період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одномоментно виділилося 400 мл крові, кровотеча продовжується. Під час огляду встановлено відсутність однієї часточки. Яка тактика акушерки при затримці часток плаценти в матці?

- A. *Ручне обстеження порожнини матки і видалення часточки плаценти
- B. В/в введення утеротонічних засобів
- C. Зовнішній масаж матки
- D. В/в введення інгібіторів фібринолізу
- E. Випускання катетером сечі

132. До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

- A. *8-10 годин
- B. 40-60 хвилин
- C. 1-2 години
- D. 2-4 години
- E. 4-6 годин

133. До Вас у медпункт заводу доставили потерпілого 42-х років, який внаслідок небережності отримав сильний удар у праву поперекову ділянку. Непокоїть біль у поперековій ділянці з іррадіацією сечовід, травмований помочився сечею кольору м'ясних помиїв. При огляді блідий, пульс - 90/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку першу допомогу Ви надасте?

- A. *Холод на поперекову ділянку, викликати швидку допомогу
- B. Тепло на поперекову ділянку, направити хворого до хірурга
- C. Покласти спиртовий компрес на поперекову ділянку, викликати терапевта
- D. Розтерти поперекову ділянку маззю "Рятівник"
- E. Ввести катетер у сечовий міхур

134. Ви фельдшер ШМД. На вулиці знепритомнів хворий на цукровий діабет (в кишені знайдена картка хворого на інсулінозалежний цукровий діабет). При огляді: шкіра волога, високий тонус м'язів, судоми, високі сухожилльні рефлекси, розширені зіниці. Дихання звичайне, запаху ацетону з рота немає. Пульс - 80/хв. АТ- 120/80 мм рт.ст. Ваші дії:

- A. *В/в струменево ввести 40-60 мл 40% глюкози
- B. Ввести інсулін короткої дії
- C. Ввести кордіамін
- D. Зачекати аналізу рівня глюкози в крові
- E. Ввести глюкокортикостероїди

135. Ви виїхали на виклик до потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть основний симптом цієї травми:

- A. *Кровотеча з ліквореєюз носа та вуха
- B. Наявність крововиливу на потилиці
- C. набряк шиї
- D. Головний біль
- E. Кровотеча з рани на голові

136. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Позитивні симптоми

подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A. *Перитоніт
- B. Механічна кишкова непрохідність
- C. Інфаркт міокарда
- D. Перелом основи черепа
- E. Тромбоз мезентеріальних судин

137. Який метод дослідження найдоцільніший для встановлення діагнозу раку шийки матки?

- A. *Гістологічне дослідження
- B. Огляд шийки матки в дзеркалах
- C. Проба Шиллера
- D. Кольпоскопія
- E. Мазок на онкоцитологію

138. Хвора з кістомоюяєчника обстежується для планового оперативного лікування. Після різких рухів виник біль внизу живота, нудота, блювання. З яким діагнозом фельдшер КШД госпіталізував пацієнтку?

- A. *Розрив кісти яєчника
- B. Гострий апендицит
- C. Гострий холецистит
- D. Перекрут ніжки субсерозного фіброматозного вузла
- E. Порушена позаматкова вагітність

139. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

- A. *Миготлива аритмія
- B. Синусова тахікардія
- C. Екстрасистолічна аритмія
- D. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- E. Синусова аритмія

140. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років, зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сідла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Хвороба Іценко-Кушинга
- B. Акромегалія
- C. Нецукровий діабет
- D. Хвороба Аддісона
- E. Гіпофізарний нанізм

141. Дитина народилась від ВІЛ- інфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, довжиною - 50 см. Загальний стан задовільний. Антиретровірусна терапія не проводилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ-інфекції у дитини?

- A. *Через 18 місяців

- В. Через 12 місяців
- С. У перші дні після народження
- Д. У перші 6 місяців
- Е. У 2 роки

142. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною віком 5 років. Останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

- А. *Пробіотики
- В. Вітаміни
- С. Сорбенти
- Д. Антибіотики
- Е. Антигістаміни

143. До Вас звернулася пацієнтка 60-ти років зі скаргами на біль внизу живота серозно-гнійні виділення із статевих шляхів. На шийці матки виявлено утворення яке має вигляд кольорової капусти, яка кровоточить. Ваш діагноз:

- А. *Рак шийки матки
- В. Крауроз
- С. Поліп шийки матки
- Д. Ерозія шийки матки
- Е. Лейкоплакія

144. Хвора, 35-ти років, скаржиться на часті водянисті випорожнення, блювання, спрагу, слабкість та запаморочення. Об'єктивно: $t_o - 36,0^{\circ}\text{C}$, відмічається сухість слизових оболонок, тургор шкіри знижений, АТ- 80/50 мм рт.ст., живіт м'який, не- болючий, діурез знижений. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика з боку фельдшера ШМД?

- А. *Регідратаційна терапія
- В. Введення адреналіну
- С. Введення преднізолону
- Д. Введення ентеросорбентів
- Е. Введення сечогінних препаратів

145. Вкажіть клінічні ознаки струсу головного мозку:

- А. *Втрата свідомості, головний біль, блювання
- В. Парези та паралічі, головний біль, блювання
- С. Головний біль, блювання, апраксія
- Д. Апраксія, атаксія, розлади мови
- Е. Розлади мови, втрата свідомості, парези та паралічі

146. До ФАПУ звернувся хворий зі скаргами на нудоту, блювання, рідкі випорожнення 2-3 рази на добу світло-жовтого кольору. Об'єктивно: температура - $37,2^{\circ}\text{C}$, порушення зору (косоокість, двоїння в очах, сітка перед очима), порушення ковтання. З анамнезу: хворіє 2 дні, після вживання консервованих грибів. Яке захворювання може бути у цього хворого?

- А. * Ботулізм
- В. Отруєння грибами
- С. Шигельоз
- Д. Сальмонельоз
- Е. Холера

147. На прийом до фельдшера ФАПу привели хворого 52-х років, який зловживає алкоголем. Фельдшер помітив, що хворий збуджений, відмічається тремтіння всього тіла. Хворий заглядає під кушетку, щось ніби ловить там. Ваш попередній діагноз:

A. *Алкогольний делірій (біла гарячка п'яниць)

B. Депресивний стан

C. Параноїд

D. Маніакальний стан

E. Реактивний стан

148. До хворого, що повернувся із Африки викликана ШМД. Скарги хворого на раптове підвищення температури тіла до 39,9оС. При огляді шкіра гіперемійована, слизові оболонки сухі. Язик обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені, тахікардія. Відмічається гепатоспленомегалія. Зі слів дружини 2 дні тому також був напад гарячки, який закінчився рясним потовиділенням. Яке захворювання можна запідозрити?

A. *Малярія

B. Пневмонія

C. Черевний тиф

D. Грип

E. Туберкульоз

149. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39оС, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: L- 30 · 109/л, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

A. *Абсцес головного мозку

B. Мозковий інсульт

C. Менінгіт

D. Радикуліт

E. Неврит

150. Основні ознаки менінгіту:

A. *Ригідність потиличних м'язів, симптоми Брудзинського, Керніга, зміни ліквору

B. Підвищення температури тіла, блювання, жар, пітливість

C. Запаморочення, судоми тіла, блювання, підвищення температури тіла

D. Лихоманка, слабкість, нудота, симптоми Нері, Ласега

E. Марення, судоми, жар, сопор