

1. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

- A. \*Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів
- B. Собівартість медичних послуг і загальні доходи
- C. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- D. Ціна та собівартість медичних послуг
- E. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

2. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

- A. \*Протеїнурія
- B. Еритроцитурія
- C. Зрушення рН сечі в лужну сторону
- D. Лейкоцитурія
- E. Поява "активних лейкоцитів"

3. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок", кисті рук набрякли, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

- A. \*Палестезіометрія
- B. Капіляроскопія
- C. Проба на реактивну гіперемію
- D. Холодова проба
- E. Алгезиметрія

4. Дитині 12 місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сильного сухого кашлю, підвищення  $t_o$  тіла до 38,7о Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота - ціаноз. Під час дихання спостерігається втягнення міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

- A. \*Рентгенологічне
- B. УЗД
- C. ЕКГ
- D. Загальний аналіз калу
- E. Аналіз сечі по Зимницькому

5. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A. \*Аналіз сечі за Нечипоренком

- В. Аналіз сечі на глюкозу
- С. Аналіз сечі на діастазу
- Д. Загальний аналіз крові
- Е. Загальний аналіз сечі

6. Для встановлення остаточного діагнозу при кишкових інфекціях у дітей використовують дослідження:

- А. \*Бактеріологічне дослідження прямої кишки
- В. Загальний аналіз крові
- С. Визначення вмісту білірубіну в крові
- Д. Визначення жовчних пігментів в сечі
- Е. Кал на яйця глистів

7. Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- А. \*Попередній
- В. Направляючий
- С. Фільтруючий
- Д. Заключний
- Е. Поточний

8. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- А. \*Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад
- В. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- С. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- Д. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- Е. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

9. У спекотний сонячний день чоловік 40- ка років, який перебував на пляжі, відчув себе погано. Виникли головний біль, запаморочення, блювання, шум у вухах. Об'єктивно: пульс - 120/хв., дихання поверхневе. Ви підозрюєте, що у пацієнта сонячний удар. Що необхідно зробити першочергово для покращення його стану?

- А. \*Холодне пиття, холодний компрес на голову
- В. Здійснити ШВЛ
- С. Ввести антигістамінні засоби
- Д. Зробити непрямий масаж серця
- Е. Терміново транспортувати потерпілого до лікарні

10. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- А. \*УЗД органів черевної порожнини
- В. Загальний аналіз крові
- С. Загальний аналіз сечі
- Д. Кров на діастазу
- Е. Кров на визначення рівня холестерину

11. У пацієнта, що хворіє на бронхіальну астму, напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу неефективні. Об'єктивно: вимушене положення тіла, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, дистанційні сухі хрипи. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. \*Преднізолон
- B. Ефедрин
- C. Астмопент
- D. Морфін
- E. Анальгін

12. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- A. \*Налоксон
- B. Атропін
- C. Мезатон
- D. Прозерин
- E. Адреналін

13. Дитині молодшого шкільного віку дільнична медсестра проводить вторинну профілактику ревматичної лихоманки. Яким з перерахованих нижче препаратів здійснюється вона?

- A. \*Біциліном - 5
- B. Бісептолом
- C. Цефтріаксоном
- D. Ампіциліном
- E. Ортофеном

14. Які завдання лікарсько-консультативної комісії [ЛКК]?

- A. \*Вирішення складних питань експертизи непрацездатності
- B. Видача листків непрацездатності в перші 5 днів
- C. Переведення на іншу роботу
- D. Видача медикаментів
- E. Перевірка санітарно-епідемічного режиму

15. Яка є лікувально-профілактична допомога в залежності від ступеня складності?

- A. \*Первинна, вторинна, третинна
- B. Профілактична, первинна, патронажна
- C. Змішана
- D. Профілактична, змішана, санітарногігієнічна
- E. Санітарно-епідеміологічна, змішана, патронажна

16. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

- A. \*Крепітація
- B. Дрібноміхурцеві хрипи
- C. Шум тертя плеври
- D. Шум тертя перикарду
- E. Плевроперикардальний шум

17. Під час проведення об'єктивного обстеження пацієнта з діагнозом: гострий пієлонефрит, спостерігається біль в поперековій ділянці при постукуванні. Як називається такий симптом?

- A. \*Пастернацького
- B. Ортнера
- C. Мерфі
- D. Френікус-симптом
- E. Керте

18. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- A. \*Загальний аналіз сечі
- B. Дослідження сечі за Зимницьким
- C. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- D. Визначення креатиніну
- E. Визначення протеїнурії

19. Ви старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

- A. \*Тарифна система та нормування праці
- B. Посадовий оклад, тарифна ставка
- C. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- D. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- E. –

20. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія",  $t_{o} = 38,9^{\circ}\text{C}$ . Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребер'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- A. \*Після нормалізації температури тіла
- B. Після одужання від пневмонії
- C. Одразу
- D. Немає обмежень в часі
- E. Натщесерце

21. Медична допомога міському населенню надається за принципом:

- A. \*Дільнично-територіальний
- B. Поетапний
- C. Переважає обслуговування окремих соціально-значущих груп
- D. Надання медичної допомоги вдома
- E. Цеховий

22. У дитини 4-х років діагностовано туберкульозний менінгіт. Для такого захворювання характерні клінічні ознаки:

- A. \*Симптоми Керніга, Брудзінського
- B. Симптом Філатова
- C. Афонія
- D. Біль у суглобах

23. Дефіцит якого макроелементу може виникнути в організмі при безконтрольному вживанні фуросеміду?
- А. \*Калію
  - В. Натрію
  - С. Кобальту
  - Д. Магнію
  - Е. Заліза
24. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому за призначенням лікаря?
- А. \*Кордіамін
  - В. Еуфілін
  - С. Мезатон
  - Д. Фенобарбітал
  - Е. Адреналін
25. Хворий, 2 доба після великої операції. Проводиться знеболення наркотичними анальгетиками згідно призначення лікаря. Яка ускладнення вони можуть викликати у хворого?
- А. \*Пригнічують дихання
  - В. Спричинюють спазм периферійних судин
  - С. Спричинюють брадикардію
  - Д. Підвищують артеріальний тиск
  - Е. Порушують мозковий кровообіг
26. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які із нижче приведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?
- А. \*Аналіз сечі на діастазу
  - В. Загальний аналіз крові
  - С. Аналіз крові на цукор
  - Д. Аналіз сечі на цукор
  - Е. Аналіз крові на білірубін
27. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?
- А. \*Показник загальної захворюваності
  - В. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  - С. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню
  - Д. Дані про профілактичний огляд
  - Е. Дані перепису населення
28. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження

результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A. \*Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B. Регламенту
- C. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- D. Нової теми досліджень
- E. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

29. Дитина 5-ти років, хворіє 2-й день. Хвороба розпочалась гостро,  $t_o = 39,0^{\circ}\text{C}$ , скаржиться на біль в горлі, зниження апетиту, порушення сну. Спостерігається лакунарна ангіна, язик з сіруватим нальотом. На гіперемійованому тлі шкіри - висипка яскраво-червона дрібно-крапкова крім носо-губного трикутника. Вкажіть захворювання, для якого найхарактерніші дані симптоми:

- A. \*Скарлатина
- B. Краснуха
- C. Кір
- D. Вітряна віспа
- E. Паротитна інфекція

30. У пацієнта 55-ти років, через деякий час після введення йому вітаміну "B1" обличчя набрякло, повіки стали важкими, перешкоджають відкриванню очей, очні яблука "ін'єковані". Губи збільшились. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком, не гаряча на дотик, не болюча, не свербить. Вкажіть, який стан розвинувся у пацієнта:

- A. \*Набряк Квінке
- B. Анафілактичний шок
- C. Сироваткова хвороба
- D. Кропив'янка
- E. Бронхоспазм

31. Хворому з діагнозом: пієлонефрит призначена проба Зимницького. Яке пояснення треба надати хворому для правильного збору сечі?

- A. \*Збирати сечу цілодобово, кожні 3 години в окремий посуд
- B. Збирати сечу цілодобово в один посуд
- C. Збирати сечу вранці і ввечері
- D. Збирати сечу вранці одноразово
- E. Збирати середню порцію сечі вранці

32. Показник малюкової смертності - це смертність дітей:

- A. \*До 1 року життя
- B. До 6 дня життя
- C. До 1 місяця життя
- D. До 3 років життя
- E. До 5 років життя

33. Виберіть вид шоку, що ускладнює інфаркт міокарда:

- A. \*Кардіогенний
- B. Гіповолемічний
- C. Септичний
- D. Неврогенний
- E. Анафілактичний

34. Пацієнт 55-ти років в хірургічному відділенні готується до флебектомії лівої нижньої кінцівки. При підготовці операційного поля медична сестра помітила фурункул в нижній третині стегна. Лікар відмінив оперативне втручання. Виникнення якої потенційної проблеми було попереджено?

- A. \*Нагноєння післяопераційної рани
- B. Тромбофлебіт
- C. Підшкірна гематома
- D. Варикозне розширення вен
- E. Тромбоз

35. Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

- A. \*Профілактика розвитку ателектазів
- B. Усунення бронхоспазмів
- C. Зменшення хвилювання
- D. Усунення виділень з дихальних шляхів
- E. Профілактика дихальної недостатності

36. Дитина 4-х років відвідує дитячий садок. Захворіла на вітряну віспу. Який період ізоляції потребує дитина?

- A. \*До 5-ти днів, від появи останніх висипань
- B. 21 день
- C. 3 дні з моменту появи висипань
- D. 14 днів з моменту захворювання
- E. 22 дні

37. На кожного пацієнта, що звертається в поліклініку або отримує допомогу вдома, медична сестра заповнює:

- A. \*Медичну карту амбулаторного хворого Ф-025/0
- B. Контрольну карту диспансерного спостереження Ф-030/0
- C. Карту профілактичних щеплень Ф063/0
- D. Довідку про тимчасову непрацездатність Ф-095/0
- E. Санітарно-курортну карту Ф- 072/0

38. За змістом документи в охороні здоров'я поділяються на:

- A. \*Організаційно-розпорядчі, фінансоворозрахункові, постачально-збутові, кадрові
- B. Письмові, графічні, фотодокументи, акустичні
- C. Службові, офіційно-особисті
- D. Прості, складні
- E. Типові, зразкові

39. Ви, головна медсестра лікарні, відпустили у відділення 2 ампули кордарону 5% 3,0 №5 з коробки. Залишилось ще 3 ампули, тобто Ви порушили упаковку виробника. Ваші дії правильні, якщо:

- A. \*На новоствореній упаковці Ви зазначили назву, серію, термін придатності, виробника ЛЗ та власний підпис старшої медсестри
- B. На новоствореній упаковці в довільній формі Ви зазначили назву та лікарську форму відпущеного засобу

- C. Порушувати упаковку виробника не дозволено ні за яких умов
- D. На упаковці, що залишилась, Ви зробили напис "3 ампули"
- E. Коробку, з якої взяли 2 ампули, не закрили, щоб було зрозуміло, що вона почата

40. Який препарат необхідно якомога швидше застосувати при гострому отруєнні миш'яковмісними сполуками?

- A. \*Унітіол
- B. Тіосульфат натрію
- C. Тетацин кальцію
- D. Розчин ізонітрозину
- E. Розчин атропіну

41. У дитини 7-ми років порушено загальний стан, температура тіла сягає 40°C, біль в глотці під час ковтання. Діагноз катаральної ангіни встановлено на підставі огляду. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити збудника хвороби?

- A. \*Мазок із слизової оболонки глотки та носа
- B. Загальний аналіз крові
- C. Біохімічне дослідження крові
- D. Серологічне дослідження - РЗК, в динаміці
- E. Загальний аналіз сечі

42. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A. \*Вартість медичних послуг
- B. Співвідношення збуту й цін
- C. Загальні та відносні витрати
- D. Імовірні стратегії конкурентів
- E. Показники повторних купівель

43. Згідно з класифікацією документів, за строками зберігання вони поділяються на:

- A. \*Постійні, тимчасові, тривалі
- B. Термінові, нетермінові
- C. Сталі та змінні
- D. Типові та трафаретні
- E. Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні

44. Медична сестра бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Які з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

- A. \*Симптом Труссо
- B. Симптом Ортнера
- C. Симптом Грефе
- D. Симптом Мебіуса
- E. Симптом Галанта

45. Дитина 9-ти років перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу менінгіту. Складаючи план обстеження, яке обстеження потрібно зробити в першу чергу?

- A. \*Спинномозкову пункцію
- B. Комп'ютерну томографію
- C. Енцефалографію

- D. Магнітно-ядерний резонанс
- E. Ангіографію

46. До Вас постувила дитина, при огляді якої Ви спостерігаєте: стан важкий, шкірні покриви бліді, висипи на шкірі у вигляді петехій та екхімозів. Під час огляду у дитини почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви повинні зробити з метою надання невідкладної допомоги?

- A. \*Нахилити голову вперед
- B. Надати дитині горизонтального положення
- C. Закинути голову доверху
- D. Провести гарячу ніжну ванну
- E. Провести задню тампонаду носа

47. Хлопчик 8-ми років лікується в нефрологічному відділенні. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на гомілках, АТ150/100 мм рт.ст. При проведенні медсестринського обстеження Ви виявили такі проблеми як: зменшення кількості сечі та переважання нічного діурезу над денним. Дайте визначення цим поняттям:

- A. \*Олігурія, ніктурія
- B. Поліурія, бактеріурія
- C. Циліндрурія, гематурія
- D. Анурія, бактеріурія
- E. Лейкоцитурія, протеїнурія

48. Які принципи відносяться до основних принципів первинної лікувальнопрофілактичної допомоги?

- A. \*Кваліфікованість; оперативність; доступність
- B. Солідарність і субсидіарність
- C. Надання медичної допомоги при нещасних випадках
- D. Керованість надання медичних послуг
- E. –

49. Пацієнт скаржиться на спрагу, поліурію, свербіж шкіри, нудоту, блювання, біль у животі. Хворий загальмований, дихання шумне, запах ацетону з рота, шкіра та слизові оболонки сухі, тони серця приглушені, ЧСС- 102/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Живіт болючий. Під час обстеження хворий втратив свідомість. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A. \*Гіперглікемічна кома
- B. Гіпоглікемічна кома
- C. Ліподистрофія
- D. Печінкова кома
- E. Уремична кома

50. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації спостерігаються набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

- A. \*Ревматична гарячка, поліартрит
- B. Ревматична гарячка, ревмокардит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Деформуючий остеоартроз
- E. Ревматична гарячка, мала хорія

51. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

- A. \*Везикулопустульоз
- B. Пухирчатка новонароджених
- C. Псевдофурункульоз
- D. Фурункульоз
- E. Герпес-інфекція

52. У дитини 8-ми років визначаються ознаки інтоксикації. Під час огляду: мигдалики збільшені, вкриті сіруватими нашаруваннями, які важко знімаються, після зняття виступають крапельки крові. Нашарування не розтираються між шпателями, не розчиняються у воді. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A. \*Дифтерія горла
- B. Скарлатина
- C. Лакунарна ангіна
- D. Мононуклеоз
- E. Фолікулярна ангіна

53. У крові дітей, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, виявляють специфічні антитіла до:

- A. \*Helicobacter pylori
- B. Salmonella
- C. Bordetella pertusis
- D. Entamoeba histolytica
- E. Mycobacterium tuberculosis

54. При здійсненні медсестринського огляду у пацієнта виявлено гінгівіт, стоматит, а також ціанотична смуга вздовж країв ясен, постійний тремор рук, підвищена збудливість. Яка речовина при інтоксикації дає такі ознаки?

- A. \*Ртуть
- B. Марганець
- C. Оксид вуглецю
- D. Арсен
- E. Свинець

55. Контроль - це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають, він складається з:

- A. \*Попереднього, поточного й заключного
- B. Поточного й заключного
- C. Попереднього й заключного
- D. Тільки з поточного контролю
- E. Тільки із заключного контролю

56. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 місяці, з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,6 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

- A. \*Спазмофілія. Судоми
- B. Спазмофілія, ларингоспазм
- C. Рахіт, гострий період. Судоми
- D. Гіпервітаміноз Судоми
- E. Рахіт залишкових явищ

57. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Який лікарський препарат і яку дозу лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. \*0,5% сибазон 0,8 мл
- B. 0,5% сибазон 0,5 мл
- C. 0,5% седуксен 0,5 мл
- D. 0,5% діазепам 2 мл
- E. 0,5% діазепам 0,2 мл

58. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- A. \*Тетраду Фалло
- B. Дефект міжшлуночкової перегородки
- C. Відкриту аортальну протоку
- D. Фіброеластоз міокарда
- E. Коарктація аорти

59. У хворого порушення серцевого ритму, при якому на ЕКГ протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

- A. \*Миготлива аритмія
- B. Пароксизмальна тахікардія
- C. Синусова тахікардія
- D. Синусова аритмія
- E. Атріовентрикулярна блокада

60. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виник гострий біль у животі, нудота, печія, гіркота у роті, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- A. \*Оглядова рентгенографія
- B. Колоноскопія
- C. Іригоскопія
- D. Лапароцентез
- E. Зняття ЕКГ

61. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається

крепітація та патологічна рухливість. Рс- 130/хв., слабкого наповнення, АТ- 80/45 мм рт.ст. Дихання поверхневе, прискорене. Стан пацієнта відповідає:

- A. \*Шок II ступеня
- B. Шок I ступеня
- C. Шок IV ступеня
- D. Шок III ступеня
- E. Передагонія

62. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахвинну ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

- A. \*Призначення спазмолітиків, гарячої ванни
- B. Літотрипсія, грілка на поперек
- C. Призначення прийому рідини, гарячої ванни
- D. Призначення антибіотиків та спазмолітиків
- E. Заспокоїти хвору, холод на поперек

63. Соціальна медицина, як наука, володіє різноманітними методами дослідження. Як називається статистичне дослідження, яке охоплює облік усіх одиниць спостереження?

- A. \*Суцільне дослідження
- B. Монографічне дослідження
- C. Дослідження основного масиву
- D. Вибіркове дослідження
- E. Несуцільне дослідження

64. Вас викликали до дитини 10-ти років. На момент огляду у дитини безперервний кашель, ціаноз шкіри, задишка, дитина збуджена. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. Якої допомоги потребує дитина для звільнення дихальних шляхів від стороннього тіла?

- A. \*Прийом Геймліха
- B. Прийом Леопольда
- C. Відсмоктування слизу з рота та носа
- D. Термінова інтубація трахеї
- E. Прийом Селіка

65. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38о Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. \*Гострий гематогенний остеомієліт
- B. Флегмона правої гомілки
- C. Вивих правого колінного суглоба
- D. Перелом правого колінного суглоба
- E. Гострий артрит колінного суглоба

66. У пацієнта 38-ми років після бійки виявлено крововилив і крепітацію в ділянці нижньої щелепи. Вкажіть вид пов'язки, яку необхідно застосувати для іммобілізації нижньої щелепи під час транспортування:

- A. \*”Вузечка”
- B. ”Чепець”
- C. Хрестоподібна
- D. Колова
- E. Поворотна

67. Населення міста А має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста:

- A. Прогресивний
- B. Стабільний
- C. Регресивний
- D. Динамічний
- E. Змішаний

68. Реєстрація випадку смерті відбувається у відділі РАЦСу на основі спеціального медичного обліково-статистичного документа. Назвіть цей документ:

- A. Лікарське свідоцтво про смерть
- B. Історія хвороби
- C. Журнал обліку померлих
- D. Довідка дільничного лікаря про випадок смерті
- E. Протокол розтину

69. Наукове дослідження, присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу хворобами органів дихання. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- A. Кожен випадок захворювання органів дихання
- B. Кожен студент медичного коледжу
- C. Кожен хворий студент медичного коледжу (будь-яким захворюванням)
- D. Кожен студент медичного коледжу з хворобою органів дихання
- E. Кожен випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

70. Пацієнтка скаржиться на наростаючу задишку. При огляді пацієнтки визначають асиметрію грудної клітки, відставання в акті дихання правої половини. Перкуторно - справа тупий перкуторний звук. Під час аускультатії дихання справа не вислуховується. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Накопичення рідини в плевральній порожнини
- B. Ущільнення легеневої тканини
- C. Деструкції легеневої тканини
- D. Бронхіальної обструкції
- E. Синдром порожнини

71. У хворої раптово після фізичного навантаження виник біль в правій здухвинній ділянці, часте сечовипускання малими порціями через короткий проміжок часу. При огляді: симптом Пастернацького позитивний справа. Який попередній діагноз?

- A. Правобічна ниркова коліка
- B. Гострий панкреатит

- C. Гострий холецистит
- D. Гостра непрохідність кишечника
- E. Гострий аднексит

72. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

- A. \*Визначення амілази крові
- B. Зняття ЕКГ
- C. Загальний аналіз крові
- D. Оглядовий знімок грудної клітки
- E. Оглядовий знімок черевної порожнини

73. У хворої, оперованої з приводу апендициту рік тому, виникли біль у животі, блювання, затримка газів. При рентгенографії органів черевної порожнини - множинні "чаші Клойбера". Встановіть попередній діагноз:

- A. Спайкова хвороба
- B. Пухлина товстої кишки
- C. Пухлина тонкої кишки
- D. Защемлена грижа
- E. Дивертикуліт товстої кишки

74. За рекомендацією ВООЗ базова тривалість життя (показник який застосовується для розрахувань економічних показників) складає:

- A. 65 років
- B. 50 років
- C. 55 років
- D. 60 років
- E. 70 років

75. Медична сестра має вагітність 28 тижнів. Працює у денну зміну. Коли їй необхідно оформити відпустку по вагітності та пологам?

- A. Через 2 тижні
- B. Через 1 тиждень
- C. Через 3 тижня
- D. Через 4 тижня
- E. Через 6 тижнів

76. Амбулаторія сімейної медицини має реєстратуру, кабінети сімейного лікаря, оглядовий, фізіотерапії, експресдіагностики, палати денного перебування хворих. Який кабінет ще обов'язково повинен бути в структурі амбулаторії?

- A. Маніпуляційна
- B. Архів
- C. Харчоблок
- D. Рентген-кабінет
- E. Аптека

77. У пацієнтки, яка потрапила у відділення з приводу негоспітальної пневмонії, протягом 1 години температура тіла знизилась з 39,9оС до норми, але стан погіршився:

з'явилась різка слабкість, пульс ниткоподібний, кінцівки холодні, АТ- 80/40 мм рт.ст. Чим зумовлене погіршення стану пацієнтки?

- A. \*Колапсом
- B. Непритомністю
- C. Анафілактичним шоком
- D. Маренням
- E. Судомним синдромом

78. При підозрі на харчове отруєння грибами слід заповнити документ:

- A. \*Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння
- B. Медичну карту диспансерного спостереження
- C. Контрольну карту диспансерного спостереження
- D. Талон амбулаторного пацієнта
- E. Медичну карту стаціонарного хворого

79. До Вас звернувся працівник аптеки з питанням. "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

- A. Злегка наповнені повітрям, у захищеному від світла і перепадів температури місця
- B. При температурі 23оС та при вологості повітря не менше 50%
- C. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні
- D. В сухому прохолодному приміщенні
- E. В темному прохолодному приміщенні

80. Ви старша медична сестра хірургічного відділення, проводите інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарнопротиепідемічних заходів у відділенні. Як часто Ви повинні стежити, за його виконанням?

- A. \*Щоденно
- B. Щотижня
- C. Щомісячно
- D. Щоквартально
- E. Щорічно

81. Ви медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити провітрювання палат?

- A. \*Не менше 4 разів
- B. Не менше 1 разу
- C. Не менше 2 разів
- D. Не менше 3 разів
- E. Не менше 1-2 разів

82. Ви медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно Наказу № 234)?

- A. \*1 раз в 3 місяці
- B. 1 раз в 6 місяці
- C. 1 раз в 9 місяці
- D. 1 раз на рік
- E. 1 раз на 2 роки

83. Лікар призначив дитині, хворій на пневмонію, цефтриаксон в/м в дозі 700 мг. У флаконі 1 г препарату. Медична сестра ввела у флакон 5 мл розчинника. Скільки мл розведеного цефтриаксону повинна ввести дитині медична сестра?

- A. \*3,5 мл
- B. 2 мл
- C. 4 мл
- D. 2,5 мл
- E. 5 мл

84. Під час профілактичного огляду пацієнтки встановлено діагноз злоякісного новоутворення правої молочної залози. Які ознаки найбільш характерні для даної патології?

- A. \*Утягнутість соска справа
- B. Дратівливість
- C. Відсутність апетиту
- D. Порушення менструального циклу
- E. Гіркота в роті

85. На стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії перебуває пацієнт у важкому стані. Яке ускладнення можливе у пацієнта з постійним гумовим катетером у сечовому міхурі?

- A. \*Інфікування сечового міхура
- B. Перфорація сечового міхура
- C. Аденома передміхурової залози
- D. Сечокам'яна хвороба
- E. Напад ниркової кольки

86. Пацієнтка після черепно-мозкової травми скаржить на головний біль, нудоту, блювання. Відмічає короткочасну (протягом 2-3 хвилин) втрату свідомості. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

- A. Струсом головного мозку
- B. Забоєм головного мозку
- C. Стисненням головного мозку
- D. Колапсом
- E. Непритомністю

87. В травматологічний пункт звернувся пацієнт з укушеною раною правого передпліччя. Що Ви використаєте в першу чергу з метою неспецифічної профілактики сказу при укусах вуличним собакою?

- A. \*Промити рану розчином господарського мила
- B. Промити рану 6% розчином перекису водню
- C. Промити рану 0,02% розчином фурациліну
- D. Промити рану 70% розчином спирту
- E. Промити рану 2% розчином натрію гідрокарбонату

88. Ви працюєте шкільною медичною сестрою. До Вас звернулася дівчинка 7-ми років зі скаргами на погане самопочуття, біль у горлі. Під час огляду виявлено підвищення температури тіла до 38,3оС, дрібноточковий висип на фоні гіперемійованої шкіри, блідий носогубний трикутник, фолікулярну ангіну. Які першочергові дії запланує медсестра?

- A. \*Ізоляцію хворої дитини
- B. Обробка елементів висипу

- С. Повідомлення в СЕС
- Д. Введення жарознижуючих препаратів
- Е. Введення імуноглобуліну

89. Хвора звернулася зі скаргами на тривалий субфебрилітет, виражену загальну слабкість, в'ялість, наявність шкірного висипу на обличчі у вигляді "метелика". Для якого захворювання це характерно?

- А. \*Системний червоний вовчак
- В. Хімічний опік
- С. Вульгарні вугрі
- Д. набряк Квінке
- Е. Демодекоз

90. На третю добу в післяопераційному періоді у пацієнта 72-х років раптово виник біль за грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, обличчя, шиї, тахікардія, задишка інспіраторного типу. Шийні вени набрякли. Про який стан можна подумати?

- А. Тромбоемболія легеневої артерії
- В. Інфаркт міокарда
- С. набряк легень
- Д. Гіпертонічний криз
- Е. Кардіогенний шок

91. За допомогою звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. При огляді живота виявлено вип'ячування в паховій ділянці справа, болоче при пальпації, щільноеластичної консистенції. Що можна запідозрити?

- А. Защемлення пахвинної кили
- В. Защемлення пупкової кили
- С. Незащемлену пахвинну килу
- Д. Защемлення стегнової кили
- Е. Защемлення калиткової кили

92. Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного належить до материнської смертності?

- А. \*Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами
- В. Смертність протягом вагітності, якщо смерть жінки не пов'язана з гінекологічною патологією
- С. Смертність під час пологів, якщо смерть жінки пов'язана з внутрішньоутробною інфекцією
- Д. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю
- Е. -

93. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

- А. \*Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- В. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

- C. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою ”+” та один талон з позначкою ”-”
- D. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою ”-”
- E. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою ”-” та один талон з позначкою ”6+”

94. Накази видаються на основі й для виконання законів, постанов і розпоряджень Уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів. Хто видає наказ?

- A. \*Керівник організації
- B. Колегіальний орган
- C. Голова колегіального органу
- D. Вища посадова особа
- E. –

95. Дитина 5-ти років захворіла гостро, підвищилася температури тіла до 37,5оС, з’явилася дрібноплямиста висипка спочатку на обличчі потім на внутрішній поверхні рук, на сідницях а потім і по всьому тілу. На момент огляду: потиличні та задньошийні лімфовузли збільшені, безболісні м’якої консистенції. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. \*Краснуха
- B. Кір
- C. Скарлатина
- D. ГРВІ, алергічний висип
- E. Менінгококцемія

96. Дитині 5 діб, після кожного сечовиділення на пелюшках з’являються плями червоно-бурого кольору. Зібрана сеча мутна, при зберіганні у ній з’явився цеглястий осад. У загальному аналізі сечі: еритроцити - 7-10 в полі зору, урати - в значній кількості. У чому причина даного стану у новонароджених?

- A. Сечокислий інфаркт нирок
- B. Фізіологічна норма
- C. Макрогематурія
- D. Нефролітіаз
- E. Інфекція сечових шляхів

97. Ви працюєте в центрі медичної статистики. Облік всіх захворювань (гострих і хронічних), які зареєстровані у населення певної території за певний період, визначає:

- A. \*Загальна захворюваність
- B. Госпітальна захворюваність
- C. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- D. Інфекційна захворюваність
- E. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання

98. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) x 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- A. Поширеність захворювань
- B. Первинна захворюваність
- C. Госпітальна захворюваність
- D. Інфекційна захворюваність

Е. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

99. Ви головна медична сестра. До якого рівня належить високоспеціалізована медична допомога, що забезпечується в обласних лікувально-профілактичних закладах?

- А. \*Третинного рівня надання медичної допомоги
- В. Вторинного рівня надання медичної допомоги
- С. Первинного рівня надання медичної допомоги
- Д. Четвертинного рівня надання медичної допомоги
- Е. –

100. У чоловіка виявлено задишку з утрудненим видихом. Шкіра обличчя, губи ціанотичного кольору. Вдих глибокий, видих тривалий. Грудна клітка діжкоподібна, перкуторно - коробковий звук над легенями. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Яке захворювання можна запідозрити?

- А. Емфізема легенів
- В. Пневмосклероз
- С. Бронхіт
- Д. Туберкульоз
- Е. Рак легенів

101. Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- А. \*Хвороба Іценко-Кушінга
- В. Акромегалія
- С. Гіпертонічна хвороба
- Д. Ревматична хвороба
- Е. Гіпотиреоз

102. У пацієнта з гострим гломерулонефритом сеча кольору м'ясних помийв. Чим зумовлений такий колір?

- А. \*Гематурією
- В. Протеїнурією
- С. Альбумінурією
- Д. Циліндрурією
- Е. Лейкоцитурією

103. Медична сестра працює в медичному пункті по обслуговуванню робітників газонафтовидобувної компанії, де застосовується метанол. Який антидот вона повинна використовувати в випадку гострого отруєння метанолом?

- А. Етанол (етиловий спирт)
- В. Амінокапронову кислоту
- С. Соду
- Д. Унітіол
- Е. Активоване вугілля

104. В ЛПЗ було успішно проведено акредитацію. Який документ видається в цьому випадку?

- А. \*Сертифікат

- В. Диплом
- С. Державний акт
- Д. Посвідчення
- Е. Ліцензія

105. Охарактеризуйте стиль керівництва головної медсестри, яка часто влаштовує наради та вислуховує думки співробітників, винагороджує їх за гарну роботу та рідко вичитує або карає:

- А. \*Демократичний
- В. Директорський
- С. Ліберальний
- Д. Авторитарний
- Е. Наставницький

106. Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?

- А. \*Кабінет долікарського прийому
- В. Терапевтичний кабінет
- С. Кабінет медоглядів
- Д. Кабінет функціональної діагностики
- Е. Денний стаціонар

107. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

- А. \*Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів
- В. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів
- С. Кожного дня вологим способом без застосування миючих засобів
- Д. Кожного дня із застосуванням пилососу
- Е. По мірі забруднення приміщення

108. Прийняття управлінських рішень проходить у декілька етапів. Назвіть перший етап прийняття управлінського рішення:

- А. \*Визначення проблеми
- В. Постановки мети
- С. Формування системи
- Д. Формування стратегії
- Е. Визначення альтернатив

109. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

- А. \*Цироз печінки
- В. Гіпертонічна хвороба I стадії
- С. Хронічний гастрит
- Д. Нирковокам'яна хвороба
- Е. Хронічний панкреатит

110. Після обробки приміщення дихлофосом у працівника виникли симптоми гострої інтоксикації фосфорорганічними сполуками. Який препарат застосовується в якості патогенетичної антидотної терапії?

- A. Атропіну сульфат
- B. Тіосульфат натрію
- C. Унітіол
- D. Тетацин кальцію
- E. Сульфат магнію

111. Дівчинка 2-х років захворіла гостро, з підвищення температури тіла до 38,2оС, сухого кашлю, нежиті, кон'юнктивіту, блефароспазму. При огляді: на шкірі висип у вигляді червоних цяток, які злегка підняті над поверхнею шкіри. Висип спочатку з'явився за вухами, на обличчі, шії на наступний день - на тулубі. На слизовій оболонці щік навпроти малих корінних зубів сірувато-білі висипання розміром з макове зерно, оточені червоною облямівкою, на піднебінні - плямисто-папульозна енантема. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. \*Кір
- B. ГРВІ
- C. Ентеровірусна інфекція
- D. Аденовірусна інфекція
- E. Афтозний стоматит

112. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9о С, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

- A. \*Шигельоз
- B. Сальмонельоз
- C. Ієрсиніоз
- D. Ешеріхіоз
- E. Ротавірусна інфекція

113. Під час амбулаторного прийому здорової доношеної дитини місячного віку, яка народилася взимку, знаходиться на грудному вигодовуванні, не виявлено ніякої патології. Профілактику якого захворювання необхідно рекомендувати в першу чергу?

- A. \*Рахіт
- B. Анемія
- C. Гіпотрофія
- D. Спазмофілія
- E. Паратрофія

114. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- A. \*Постнеонатальна смертність
- B. Перинатальна смертність
- C. Неонатальна смертність
- D. Рання неонатальна смертність
- E. Загальний показник смертності

115. У пацієнта, який лікується з приводу інфаркта міокарда, раптово виникла задишка, дихання стало клопочучим, з рота та носа виділяється пінисте рожеве харкотиння. Яке ускладнення виникло?

- A. \*Набряк легенів
- B. Тромбоз легеневої артерії
- C. Астматичний статус
- D. Легенева кровотеча
- E. Носова кровотеча

116. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку і триває більше 45 хвилин. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Остеохондроз
- C. Перикардит
- D. Міокардит
- E. Стенокардія

117. Пацієнт скаржиться на біль голови, зміну зовнішнього вигляду. В анамнезі: травма черепа. Об'єктивно: вилиці, нижня щелепа, лобові горби, ніс та губи збільшені. Він звернувся до медсестри з питанням: "Порушення функції якої ендокринної залози зумовлює дане захворювання?"

- A. \*Гіпофіз
- B. Підшлункова залоза
- C. Щитоподібна залоза
- D. Надниркові залози
- E. Статеві залози

118. Пацієнт знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Скаржиться на погіршення свого стану - за 3 місяці втратив 10 кг ваги, відмічає відразу до м'ясної їжі. Який метод обстеження буде найбільш інформативним?

- A. Фіброгастроскопія
- B. Загальний аналіз крові
- C. Шлункове зондування
- D. Дуоденальне зондування
- E. Колоноскопія

119. Пацієнт 42 роки, поступив до приймального відділення ЦРЛ зі скаргами на наростаючий набряк правої кінцівки, біль у ділянці рани, підвищення температури тіла до 39о С, серцебиття. З рани виділяються пухирці газу з невеликою кількістю сукровичної рідини. Пальпація тканин в ділянці ураження кінцівки супроводжувалась крепітацією. Поставте діагноз:

- A. \*Газова гангрена
- B. Бешиха
- C. Флегмона
- D. Ангіна
- E. Правець

120. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темнокоричневого кольору,

з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. \*Суха гангрена
- B. Хімічний опік III ст.
- C. Хімічний опік II ст.
- D. Волога гангрена
- E. Термічний опік IV ст.

121. Пацієнтка 38-ми років, скаржиться на сильний біль у ділянці потилиці, загальну слабкість, нудоту, підвищення температури тіла до 38,5о В ділянці потилиці пальпується болючий інфільтрат розміром 1,5 см на 2 см, шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленуватосірий гній та некротичні маси. Поставте діагноз:

- A. Карбункул
- B. Бешиха
- C. Гідраденіт
- D. Флегмона
- E. Паранефрит

122. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на операції виготовлення "якісних" електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тону, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- A. \*Марганець
- B. Карбофос
- C. Тетраетилсвинець
- D. Бензол
- E. Дихлоретан

123. Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- A. \*3 етапи
- B. 2 етапи
- C. 1 етап
- D. 4 етапи
- E. 5 етапів

124. Пацієнта 39-ти років госпіталізовано до терапевтичного відділення з приводу негоспітальної пневмонії. Що використовують з метою проведення етіотропного лікування?

- A. \*Антибіотики
- B. Бронхолітики
- C. Антигістамінні
- D. Вітаміни
- E. Імуномодульну терапію

125. До медсестри сімейного лікаря звернулася пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після

стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Ps- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. Дибазол
- B. Кофеїн
- C. Строфантин
- D. Анальгін
- E. Дицинон

126. Під час проведення проби на резуссумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію:

- A. \*Несумісна за Rh-фактором
- B. Резус-позитивна
- C. Сумісна за Rh-фактором
- D. Резус-негативна
- E. Пробу треба переробити

127. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A. \*36%
- B. 56%
- C. 42%
- D. 25%
- E. 18%

128. З яких першочергових заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги дитині з нападом пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії?

- A. \*3 вагусних проб
- B. 3 в/в введення р-ну ізоптина
- C. 3 в/в введення р-ну строфантину
- D. 3 в/в введення лідокаїну
- E. 3 в/в введення новокаїнамідю

129. На оперативній нараді старша медична сестра оголосила наказ завідуючого, стосовно графіка роботи. Визначте, до якого виду відноситься даний документ:

- A. \*Розпорядчий
- B. Інформаційний
- C. Організаційний
- D. Фінансовий
- E. Рекомендований 1

30. Ви головна медична сестра. Проводите заняття. Який спосіб слід застосувати при стерилізації перев'язувальних засобів промислового виробництва?

- A. \*Радіаційне опромінення
- B. Кип'ятіння
- C. В автоклавах
- D. Дезінфекція
- E. В сухожаровій шафі

131. Після медичного огляду школярів медична сестра склала варіаційний ряд їх зросту. 149, 151, 151, 152, 153, 154, 154, 154, 156, 156, 156, 160, 162, 165. Який це варіаційний ряд?

- A. \*Ранговий
- B. Простий
- C. Згрупований
- D. Динамічний
- E. Складний

132. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

- A. \*Народжуваність
- B. Первинна захворюваність
- C. Летальність
- D. Інвалідність
- E. Травматизм

133. Ви медична сестра статистичного відділу лікарні. При складанні статистичного звіту необхідно виділити одиницю обліку тимчасової непрацездатності. Виберіть її:

- A. \*Листок непрацездатності
- B. Довідка лікаря
- C. Акт обстеження
- D. Журнал обліку випадків непрацездатності
- E. Талон амбулаторного пацієнта

134. Концепція розвитку системи охорони здоров'я в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії. Розкрийте зміст економіки охорони здоров'я:

- A. Наука, що вивчає економічні відносини в охороні здоров'я
- B. Бухгалтерський облік в ЛПЗ
- C. Методи зниження собівартості лікування
- D. Витрати держави на охорону здоров'я
- E. Витрати держави на утримання ЛПЗ

135. Ви старша медична сестра відділення обговорюєте принципи формування оплати праці медичних працівників. Поясніть молодим спеціалістам що таке посадовий оклад:

- A. \*Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці
- B. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника
- C. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу
- D. Премія за швидкість виконаної роботи
- E. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язані з режимом або умовами праці

136. У хворого відкритий перелом стегна ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

- A. \*Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B. Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- C. Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D. Пов'язка, знеболити, джгут, шина

Е. Шина, знеболити, джгут, пов'язка

137. Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу, виникло блювання. Під час пальпації різкий біль у правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щьоткіна-Блумберга. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. \*Гострий апендицит
- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий перитоніт
- D. Гострий холецистит
- E. Кишкова непрохідність

138. Дівчинка 11-років впродовж 2-х років спостерігається з приводу хронічного гастриту. За останні 4 місяці з'явилися нічні болі в животі. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра для підтвердження діагнозу підготує пацієнта до наступного обстеження:

- A. \*Фібрезогастродуоденоскопія
- B. Аналіз кала на приховану кров
- C. УЗД травноготракту
- D. Загальний аналіз сечі
- E. Копрологічне дослідження

139. Дитині 8 років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

- A. \*Сколіоз грудного відділу хребта
- B. Кіфоз грудного відділу хребта
- C. Лордоз грудного відділу хребта
- D. Хондродистрофію
- E. Залишкові явища перенесеного рахіту

140. Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5-ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмоконіозу в нього може виникнути?

- A. \*Сидероз
- B. Азбестоз
- C. Антракоз
- D. Бісиноз
- E. Бериліоз

141. Пацієнт отримав хімічний опік правої гомілки концентрованою сірчаною кислотою. Яку речовину слід використати для нейтралізації сірчаної кислоти?

- A. \*2% розчин натрію гідрокарбонату
- B. 2% розчин борної кислоти
- C. 3% розчин пероксиду водню
- D. 0,9% фізіологічний розчин
- E. 0,02% розчин фурациліну

142. Пацієнт скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника

відсутня. Визначається позитивний симптом Валя. З чим пов'язані проблеми даного пацієнта?

- A. \*З гострою кишковою непрохідністю
- B. З перфоративною виразкою шлунка
- C. З гострим апендицитом
- D. З гострим панкреатитом
- E. З гострим холециститом

143. У пацієнта з травмою грудної клітки діагностовано закритий пневмоторакс. Яке положення слід надати пацієнту на період транспортування його до лікарні?

- A. Напівсидяче
- B. Горизонтальне на спині
- C. Горизонтальне на животі
- D. З опущеною головою
- E. З піднятими ногами

144. Жінка 35-ти років скаржиться на загальну слабкість, роздратованість, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові бліді. Рс-96/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. У крові: знижений вміст гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника та сироваткового заліза. Дефіцит якого із факторів зумовив виникнення захворювання?

- A. Заліза
- B. Вітаміну В6
- C. Вітаміну В12
- D. Кобальту
- E. Фолієвої кислоти

145. Хворий 19-ти років з дитинства страждає на підвищену кровоточивість. Після незначних травм виникають масивні підшкірні та внутрішньом'язові гематоми. Мати та сестра - здорові. Тромбоцити крові -  $190 \cdot 10^9/\text{л}$ . Про яке захворювання можна думати у цьому випадку?

- A. \*Гемофілія А
- B. Тромбоцитопенія
- C. Тромбоцитопатія
- D. ДВЗ-синдром
- E. Геморагічний васкуліт

146. У хворого 25-ти років восени з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год. після вживання їжі, і вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш ймовірно?

- A. \*Виразкова хвороба 12-палої кишки
- B. Хронічний холецистит
- C. Діафрагмальна кила
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Хронічний панкреатит

147. Хвора 36-ти років скаржиться на серцебиття, пітливість, схуднення за останні 3 місяці на 5-6 кг. Апетит збережений. Об'єктивно: шкіра волога, тепла, пульс - 140/хв.,

ритмічний, АТ- 130/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза збільшена рівномірно. Яке лабораторне дослідження є найінформативнішим?

- A. \*Визначення рівня тиреоїдних гормонів
- B. Загальний аналіз сечі
- C. Визначення рівня статевих гормонів
- D. Глюкоза крові
- E. Загальний аналіз крові

148. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, набряк повік, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38,2оС, задишка, тахікардія, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. \*Тиреотоксикоз
- B. Гіпертонічна хвороба
- C. Інфаркт міокарда
- D. Гіпотиреоз
- E. Стенокардія

149. В аптеці необхідно придбати шовний матеріал, що не розсмоктується. Який із перелічених шовних матеріалів повинен відпустити фармацевт?

- A. \*Лавсан
- B. Кетгут
- C. Вікріл
- D. Окцелон
- E. Дексон

150. Структура ринку - це розташування окремих його сегментів, їх співвідношення у загальному обсязі ринку. Кожен із них виступає водночас субринком щодо всього ринку. Назвіть критерії сегментації ринку за рівнем насиченості:

- A. \*Рівноважний, дефіцитний, надмірний
- B. Оптовий, роздрібний, аукціони
- C. Вільний, монополістичний, олігополістичний
- D. Місцевий, регіональний, національний
- E. Офіційний, тіньовий