

1. У хворої з приводу пневмонії призначений антибіотик. Раптово після першої ін'єкції у неї з'явилося відчуття жару, потім стала бліда, утруднене дихання, пульс ниткоподібний, АТ-85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- А. *Анафілактичний шок
- В. набряк Квінке
- С. Кропив'янка
- Д. Серцева астма
- Е. Колапс

2. Потерпілий 33-х років отримав електротравму. У нього виникло судомне скорочення м'язів, втратив свідомість. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?

- А. *Звільнити потерпілого від джерела струму
- В. Розпочати непрямий масаж серця
- С. Розпочати штучне дихання
- Д. Оцінити стан потерпілого
- Е. Викликати бригаду ЕМД

3. Вагітна 19-ти років раптово відчула гуркіт у вухах, потім втратила свідомість. Свідки чули короточасний крик. У жінки спостерігалися тонічні судоми, а потім у вигляді ритмічних скорочень судоми тіла, кінцівок, обличчя. З рота виділялася піна, відбулося мимовільне сечовипускання. Поставте діагноз:

- А. *Епілептичний припадок
- В. Істеричний припадок
- С. Пухлина головного мозку
- Д. Гіпоглікемічна хвороба
- Е. Прееклампсія

4. Хворий перебуває в стані клінічної смерті. З чого потрібно розпочати реанімаційні заходи?

- А. *З потрійного прийому Сафара
- В. З непрямого масажу серця
- С. З прямого масажу серця
- Д. Не має суттєвого значення
- Е. З ШВЛ

5. У дитини 5-ти років протягом 2-х тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападopodobного характеру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк. Яке обстеження доцільно провести для підтвердження діагнозу?

- А. *Бактеріологічне обстеження слизу з носової частини глотки
- В. Загальний аналіз сечі
- С. Рентгенологічне обстеження
- Д. Взяти змиви з носоглотки на вірусологічне дослідження
- Е. Аналіз крові на біохімічне дослідження

6. До акушерки ФАПУ звернувся юнак, який був покусаний домашнім собакою близько однієї години тому. При обстеженні: в нижній третині правої гомілки рана 2,5x1,5 см, з нерівними краями. Яка Ваша тактика?

- А. *Промити рану розчином мила
- В. Провести ПХО рани
- С. Обробити рану 3% перекисом водню
- Д. Обробити рану йодонатом
- Е. Промити рану гіпертонічним розчином

7. В яку фазу менструального циклу шийковий слиз при висушуванні має характерну картину у вигляді «листка папороті» у здорової жінки?

- A. *Середина циклу (період овуляції)
- B. Протягом всього циклу
- C. В другу половину циклу, на 16-28 день
- D. В першу фазу, до 12-13 днів
- E. Одразу після менструації

8. В оглядовий кабінет прийшла жінка на плановий огляд. Акушерка за призначенням лікаря бере мазок у хворої на ступінь чистоти піхви. З якого місця береться мазок?

- A. *Заднього склепіння піхви
- B. Цервікального каналу
- C. Будь-якої стінки піхви
- D. З уретри
- E. Передньо-бокового склепіння піхви

9. На прийомі в дитячій поліклініці мати з дитиною 3-х місяців. Дитина на грудному вигодовуванні, розвиток фізіологічний, здорова. В пологовому будинку щеплення проти туберкульозу не проведене. Які заходи необхідні для проведення протитуберкульозної вакцинації?

- A. *Провести туберкулінову пробу
- B. Біохімічний аналіз крові
- C. Взяти кров для загального аналізу
- D. Провести вакцинацію БЦЖ
- E. Флюорографія ОГК

10. Акушерка оглядає вагітну 26-ти років. Під час огляду жінка поскаржилась, що швидко втомлюється, має періодичні головокружіння, серцебиття та задишку під час фізичного навантаження. В анамнезі рясні місячні, які тривають 5-6 днів. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді, тьмяне, посічене волосся, в кутиках губ «заїди». В загальному аналізі крові: гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник - 0,7, анізоцитоз, пойкилоцитоз, ШОЕ-18 мм/год. Який Ваш діагноз?

- A. *Залізодефіцитна анемія
- B. Гіпопластична анемія
- C. Гостра постгеморагічна анемія
- D. Ві2-дефіцитна анемія
- E. Геморагічний діатез

11. В пологовій палаті перебуває першороділля 26-ти років. Після вилиття навколоплідних вод акушерка провела внутрішнє акушерське обстеження і встановила передньоголовне передлежання. Вкажіть провідну точку при цьому передлежанні:

- A. *Велике тім'ячко
- B. Підборіддя
- C. Ніс
- D. Середина лобного шва
- E. Мале тім'ячко

12. Жінка 47-ми років скаржиться на постійну тяжкість у правому підребер'ї, здуття живота та нудоту після вживання їжі, поганий апетит. Два роки тому перехворіла на вірусний гепатит В. Об'єктивно: склери, слизові оболонки та шкіра субіктеричні. Живіт при пальпації м'який. Нижній край печінки на 2 см нижче від правої реберної дуги, чутливий при пальпації. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. *Хронічний гепатит
- B. Хронічний холецистит
- C. Жовчнокам'яна хвороба

- D. Виразкова хвороба 12-палої кишки
- E. Цироз печінки

13. В гінекологічне відділення надійшла жінка 42-х років з матковою кровотечею та підозрою на субмукозний вузол. Які препарати **ПРОТИПОКАЗАНІ** для введення хворій при наданні долікарської допомоги?

- A. *Окситоцин
- B. Е-амінокапронова кислота
- C. Введення кровозамінників
- D. Вікасол
- E. Хлорид кальцію

14. Вас викликали на місце ДТП. Потерпілий чоловік 45-ти років скаржиться на сильний біль в нозі. Під час огляду було встановлено, що у потерпілого перелом правої гомілки. Яку шину потрібно накласти потерпілому для транспортної іммобілізації при переломі гомілки?

- A. *Шину Крамера
- B. Шину Дітеріхса
- C. Шину Ентіна
- D. Шину Белера
- E. Шину Єланського

15. У вагітної 27-ми років серцебиття плода чітке, ритмічне, 130/хв. Вислуховується праворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:

- A. *І позиція, передній вид, головне передлежання
- B. І позиція, передній вид, тазове передлежання
- C. І позиція, передній вид, головне передлежання
- D. ІІ позиція, задній вид, головне передлежання
- E. І позиція, задній вид, тазове передлежання

16. У роділлі початок третього періоду пологів. Через 10 хвилин дно матки піднялось на 4-5 см вище пупка і відхилилося в бік правого підребер'я. Вкажіть ознаку відокремлення плаценти:

- A. *Шредера
- B. Альфельда
- C. Преде-Лазаревича
- D. Довженка
- E. Кюстнера-Чукалова

17. У вагітної жінки після переохолодження з'явилися слабкість, вологий кашель, біль в нижніх відділах грудної клітки справа. Об'єктивно: шкіра бліда, t° - 38,5С, в нижніх відділах правої легені аускультативно - крепітація, перкуторно там само притуплення перкуторного тону. Ці симптоми свідчать про наявність у хворої:

- A. *Негоспітальної пневмонії
- B. Гострого бронхіту
- C. Бронхіальної астми
- D. Ексудативного плевриту
- E. Сухого плевриту

18. В гінекологічне відділення звернулася жінка зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, кров'яністі виділення зі згустками у великій кількості. Температура тіла нормальна, остання менструація два місяці тому. Який попередній діагноз може припустити акушерка?

- A. *Аборт в ході
- B. Аборт, що розпочався

- C. Порушення менструального циклу
- D. Загрозливий аборт
- E. Повний аборт

19. У роділлі 30-ти років пологи II термінові, серцебиття плода - 140/хв. Голівка в порожнині малого тазу, розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Який період пологів?

- A. *II період
- B. Прелімінарний період
- C. III період
- D. Післяпологовий період
- E. I період

20. Потерпіла лежить на спині, бліда. Шкіра вкрита холодним липким потом, пульс - 130/хв., слабкого наповнення і напруження, ниткоподібний, АТ- 85/50 мм рт.ст. На внутрішній поверхні лівого стегна різана рана розміром 10x15 см, із якої поштовхами витікає кров яскраво-червоного кольору. Який вид кровотечі у потерпілої?

- A. *Артеріальна
- B. Венозна
- C. Ювенільна
- D. Паренхіматозна
- E. Капілярна

21. У пацієнтки 40-ка років з діагнозом рак шийки матки почалась сильна кровотеча. Яку долікарську допомогу повинна надати акушерка?

- A. *Провести тугу тампонаду піхви
- B. Провести вишкрібання матки
- C. Ввести у піхву тампон, змочений перекисом водню
- D. Ввести препарати, що скорочують матку
- E. Ввести кровоспинні препарати

22. У породіллі через 5 годин після перших нормальних пологів зі статевих шляхів виділилось до 150 мл крові зі згустками. Матка тістуватої консистенції. Під час зовнішнього масажу матки виділилось ще 200 мл крові. Яке ускладнення виявила акушерка післяпологового відділення?

- A. *Пізня післяпологова кровотеча
- B. Дефект посліду
- C. Рання післяпологова кровотеча
- D. Розрив шийки матки
- E. Нормальне скорочення матки

23. На ФАП звернулась пацієнтка 20-ти років зі скаргами на виділення зі статевих шляхів з неприємним запахом, свербіж зовнішніх статевих органів, який з'явився після статевого акту. При обстеженні встановлено: гіперемія піхви і шийки матки. В ділянці заднього склепіння піхви скопичення рідких, сірувато-жовтих, пінистих виділень. Встановіть попередній діагноз:

- A. *Трихомоніаз
- B. Хламідіоз
- C. Уреаплазмоз
- D. Гонорея
- E. Мікоплазмоз

24. У першороділлі триває I період пологів. Положення плода поздовжнє. При піхвовому обстеженні встановлено: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 5 см. Плодовий міхур цілий, визначаються сідниці і поруч з ними ступні ніжок плоду. Встановіть передлежання плоду:

- A. *Змішане сідничне передлежання
- B. Повне нижнє передлежання
- C. Чисто сідничнє передлежання
- D. Неповнє нижнє передлежання
- E. Коліннє передлежання

25. У породіллі протягом тижня відзначались добові коливання температури в межах 4-5°C. Визначте тип гарячки:

- A. *Гектична
- B. Постійна
- C. Поворотна
- D. Хвилеподібна
- E. Інтермітуюча

26. До акушерки ФАПу звернувся хворий 34-х років зі скаргами на висипку, яка з'явилася через п'ять тижнів після випадкового статевого контакту. Об'єктивно: на шкірі тіла статевого члена наявна ерозія червоного кольору, з блискучою поверхнею, ущільнена в основі та безболісна при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Сифіліс
- B. Трихомоніаз
- C. Гонорея
- D. Урогенітальний мікоплазмоз
- E. Хламідіоз

27. Лікар ж/к попередив акушерку, щоб вона приготувала все необхідне для розширеної проби Шиллера. Які розчини повинні підготувати акушерка?

- A. *3 % розчин оцтової кислоти, 3 % розчин Люголя
- B. 1 % брильянтовий зелений
- C. 3% розчин перекису водню
- D. 2% розчин новокаїну, 3% розчин Люголя
- E. 20% розчин сульфосаліцилової кислоти

28. Ви акушерка пологового відділення. Першороділля, термін вагітності 42-43 тижні. Перейми по 20 секунд через 5-6 хвилин протягом 4 годин. При внутрішньому акушерському дослідженні: відкриття шийки матки 3 см, плоский плідний міхур, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Встановіть діагноз:

- A. *Вагітність I, 42-43 тижні, переношена, I період пологів, латентна фаза
- B. Вагітність I, 42-43 тижні, переношена, II період пологів
- C. Вагітність I, 42-43 тижні, переношена, I період пологів, раннє відходження вод
- D. Вагітність I, 42-43 тижні, переношена, I період пологів, активна фаза
- E. Вагітність I, 42-43 тижні, переношена, передчасне відходження вод

29. До акушерки ФАПу звернувся хлопець 14-ти років, який впав з велосипеда. Скарги на виражений біль в ділянці нижньої третини правого передпліччя. При огляді виявлено крововилив, припухлість тканин в місці травми, наявна деформація передпліччя. Що з травмованим?

- A. *Перелом кісток
- B. Забій м'яких тканин
- C. Розрив сухожилків
- D. Розтягнення зв'язок
- E. Травматичний вивих

30. Роділля надійшла в пологовий будинок зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів. При вагінальному дослідженні діагностовано: розкриття шийки матки повне, пальпується м'яка губчаста тканина, серцебиття плоду - 100/хв. Що можна припустити?

- A.** *Повне передлежання плаценти
- B.** Бічне передлежання плаценти
- C.** Крайове передлежання плаценти
- D.** Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти
- E.** Низьке передлежання плаценти

31. Ви акушерка пологового відділення. Роділля 30-ти років. Пологи I, термінові. В I періоді пологів - надмірно сильна пологова діяльність. Народилась дівчинка - 3800 г. В III періоді - активна тактика. При огляді посліду дефектів не виявлено. Матка скорочена, щільна. З пологових шляхів продовжуються кров'яні виділення. Яка найбільш імовірна причина кровотечі?

- A.** *Травми пологових шляхів
- B.** Гіпотонічна кровотеча
- C.** Затримка часточок плаценти в матці
- D.** Атонія матки
- E.** Розрив матки

32. Жінка 35-ти років скаржиться на розпираючий біль в рані правої стопи, яку отримала 5 днів тому, підвищення температури тіла. Об'єктивно: тильна поверхня правої стопи різко набрякла. Шкіра багряного кольору з множинними гематомами. При пальпації: навколо рани крепітація. Яке ускладнення можна припустити?

- A.** *Газова гангрена
- B.** Дифтерія рани
- C.** Сепсис
- D.** Правець
- E.** Нагноєння рани

33. Акушерку ФАПу викликали до жінки 57-ми років, яка скаржиться на напади за-грудинного болю з іррадіацією у ліву руку, які тривають 2-3 хвилини, з'являються після фізичного навантаження, знімаються нітрогліцерином. Хворіє 3 роки. Пульс - 80/хв., ритмічний. АТ- 130/70 мм рт.ст. Найімовірніший попередній діагноз?

- A.** *Стенокардія напруги
- B.** Гостра лівошлуночкова недостатність
- C.** Гіпертонічна хвороба
- D.** Стенокардія спокою
- E.** Інфаркт міокарда

34. При обстеженні роділлі діагностовано передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Які симптоми характерні для даної патології?

- A.** *Біль в ділянці відшарування, матка не повністю розслабляється
- B.** Матка розслаблена, безболісна
- C.** Передчасне відходження навколоплідних вод
- D.** Тахікардія у матері
- E.** Масивна кровотеча зі згустками

35. Пацієнтка 34-х років рік назад лікувалася в гінекологічному відділенні з приводу операції з великою крововтратою. Вона повідомила Вам, що після переливання близько 1000 мл однокрупної резус-сумісної консервованої крові у неї відмічались судоми м'язів, порушення дихання, занепокоєння. Яке ускладнення гемотрансфузії мало місце у хворой?

- A.** *Цитратний шок
- B.** Гострий тромбоз
- C.** Геморагічний шок
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Постгемотрансфузійний шок

36. До акушерки ФАПу звернулася вагітна зі скаргами на відчуття важкості і тиснення внизу живота і на пряму кишку. Термін вагітності - 23-24 тижнів. В анамнезі: одні роди і 4 штучних аборти. Матка в тонусі. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 2,5 см, зовнішній зів привідкритий, канал шийки закритий. Матка відповідає терміну вагітності. Виділення зі статевих шляхів слизисті, помірні. Який Ваш попередній діагноз?

- A.** *Загроза передчасних пологів
- B.** Загроза мимовільного викидня
- C.** Початковий мимовільний викидень
- D.** Аборт в ходу
- E.** Передчасні пологи

37. У роділлі при вагінальному дослідженні виміряно діагональну кон'югату - 13 см, індекс Соловйова - 15 см. Визначте справжню кон'югату:

- A.** *11,5 см
- B.** 13 см
- C.** 14 см
- D.** 12 см
- E.** 15 см

38. Хвора 34-х років надійшла до стаціонару в тяжкому стані зі скаргами на слабкість, затримку менструації на 3 тижні, серцебиття, холодний піт. На вулиці втрачала свідомість. Які методи діагностики можна використати для постановки діагнозу?

- A.** *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- B.** Лапароскопія
- C.** Клінічний аналіз крові, сечі, коагулограма
- D.** Ультразвукове дослідження
- E.** Вишкрібання порожнини матки з гістологічним дослідженням зскрібку

39. Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання:

- A.** *Розгинання голівки
- B.** Додаткове згинання
- C.** Згинання голівки
- D.** Внутрішній поворот голівки потилицею до лона
- E.** Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів

40. У дівчинки молодшої групи дитячого садочку діагностовано вітряну віспу. На який термін необхідно ізолювати контактних дітей?

- A.** *21 день
- B.** 17 днів
- C.** 7 днів
- D.** 5 днів
- E.** 10 днів

41. У пацієнтки, яка знаходиться в реанімаційному відділенні у коматозному стані, відмічається рідке (6-8 дихальних рухів за хв.), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

- A.** *Дихання Куасмауля
- B.** Брадипное
- C.** Тахіпное
- D.** Дихання Чейн-Стокса
- E.** Дихання Біота

42. Пацієнтці гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс і доповідати результат. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка?

- A. *Ритм, частоту, наповнення, напруження
- B. Ритм, швидкість, висоту, частоту
- C. Пульсові коливання, наповнення, напруження
- D. Швидкість, наповнення, напруження
- E. Частоту, напруження, висоту, ритм

43. До Вас звернулася жінка 43-х років зі скаргами на тремтіння рук, біль в серці, серцебиття, плаксивість, дратівливість, головний біль. Об'єктивно: хвора метушлива, швидко розмовляє, підвищене потовиділення. Пульс - 100/хв., напружений, ритмічний. АТ- 140/90 мм рт.ст. Яке захворювання Ви припустите в першу чергу?

- A. *Тиреотоксикоз
- B. Мікседема
- C. Гіпертонічна хвороба
- D. ІХС стенокардія
- E. Цукровий діабет

44. До акушерки ФАПу звернулася мати з дівчинкою 8-ми років зі скаргами на погіршення загального стану дитини, відмову від їжі, одноразове блювання, часті випорожнення. Об'єктивно: підвищення температури тіла до 38,5°C; біль у животі, зі слів матері, випорожнення рідкі, з домішками слизу, з прожилками крові. При пальпації живота: сигмоподібна кишка болюча і спазмована. Який лікарський засіб слід використати для лікування дитини?

- A. *Ніфуроксазид
- B. Лактобактерии
- C. Еуфілін
- D. Пеніцилін
- E. Димедрол

45. Акушерку ФАПу викликали до чоловіка, який під час бійки отримав ножове поранення грудної клітки. При огляді: між III-IV міжребер'ям справа є рана, з якої під час дихання виділяється невелика кількість яскравої крові з бульбашками повітря. Під час дихання чути свист повітря, 'рана дихає'. Надайте невідкладну долікарську допомогу:

- A. *Накласти оклюзійну пов'язку
- B. Накласти пов'язку Дезо
- C. Накласти черепашачу пов'язку
- D. Накласти хрестоподібну пов'язку
- E. Накласти циркулярну пов'язку

46. Під час онкопрофогляду у пацієнтки 45-ти років при бімануальному дослідженні виявлено, що матка збільшена як на 8-9 тижнів вагітності, щільна, рухома, неболюча. Порухень менструального циклу немає. Яку патологію з боку статевих органів можна припустити?

- A. *Фіброміома матки
- B. Аденоміоз
- C. Маткова вагітність
- D. Метроендометрит
- E. Саркома матки

47. У пацієнтки гінекологічного відділення виникло загострення хронічного холециститу. При об'єктивному обстеженні симптоми подразнення очеревини відсутні. Вкажіть, який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю:

- A. *Грілку
- B. Міхур з льодом
- C. Холодну примочку
- D. Холодний компрес
- E. Зігріваючий компрес

48. Акушерка ФАПу проводить зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки розташоване посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності:

- A.** *16 тижнів
- B.** 12 тижнів
- C.** 34 тижнів
- D.** 20 тижнів
- E.** 24 тижнів

49. Хвора 25-ти років звернулася до ж/к зі скаргами на слизові виділення з вагіни та контактні кров'янисті виділення. Огляд за допомогою дзеркал: шийка матки конічної форми, біля зовнішнього вічка визначається дефект епітелія яскраво-червоного кольору розміром 2х2 см, легко кровоточить при дотику. Який з методів обстеження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?

- A.** *Прицільна біопсія шийки матки
- B.** Зондування матки
- C.** Ультразвукове дослідження
- D.** Діагностичне вишкрібання
- E.** Функціональні тести

50. В інфекційний стаціонар надійшов пацієнт із скаргами на порушення зору, порушення ковтання, сухість у роті, м'язову слабкість. З епіданамнезу з'ясовано, що за 3 дні вживав тушонку домашнього приготування. Яке захворювання можна припустити?

- A.** *Ботулізм
- B.** Сальмонельоз
- C.** Шигельоз
- D.** Черевний тиф
- E.** Енцефаліт

51. Вкажіть, яку пробу необхідно провести для контролю якості передстерилізаційної обробки на виявлення залишків миючого розчину:

- A.** *Фенолфталеїнову
- B.** Амідопіринову
- C.** Азопірамову
- D.** Ортолуїдинову
- E.** Бензидинову

52. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 57-ми років, який хворіє на цукровий діабет, зі скаргами на біль у потиличній ділянці. Температура тіла піднялася до 38,5°C, позаду шиї наявний щільний інфільтрат шириною до 8 см, шкіра над ним багряно-червона, в центрі інфільтрату наявні декілька отворів, з яких виділяється густий зелений гній. Що може припустити акушерка?

- A.** *Карбункул
- B.** Флегмона
- C.** Бешиха
- D.** Фурункул
- E.** Абсцес

53. Жінка 68-ми років скаржиться на свербіж, печіння зовнішніх статевих органів. При огляді визначається сухість шкіри зовнішніх статевих органів, атрофія статевих губ. Який попередній діагноз?

- A.** *Крауроз
- B.** Рак зовнішніх статевих органів
- C.** Вульвіт
- D.** Кольпіт

Е. Лейкоплакія

54. У інфекційне відділення надійшла дитина 7-ми років з діагнозом кір. Який патогномічний симптом характерний для кору?

- А. *Плями Бельського-Філатова-Копліка
- В. "Малиновий язик"
- С. Симптом Мурсона
- Д. "Географічний язик"
- Е. Трикутник Філатова

55. Ви працюєте акушеркою у гінекологічному відділенні. Хвора після операції з приводу фіброміоми матки скаржиться на здуття живота, невідходження газів. Що можна припустити?

- А. *Парез кишечника
- В. Гострий коліт
- С. Механічна кишкова непрохідність
- С. Хвороба Крона
- Д. Виразкова хвороба шлунка

56. Чоловік 26-ти років переніс ангіну. Через 2 тижні відзначив набряк повік, слабкість, зниження працездатності, з'явилась задишка. Об'єктивно: тони серця приглушені, АТ- 155/85 мм рт.ст. Аналіз сечі: густина - 1,011, білок - 9 г/л, еритроцита - 15-20 в полі зору, гіалінові циліндри - 2-4 в полі зору. Попередній діагноз:

- А. *Гострий гломерулонефрит
- В. Гіпертонічна хвороба
- С. Гострий пієлонефрит
- Д. Серцева недостатність
- Е. Сечокам'яна хвороба

57. Пацієнтці з хронічним ентероколітом лікар призначив іригоскопію. Воду якої температури оптимально застосувати для постановки очисної клізми?

- А. *28-32°C
- В. 35-37°C
- С. 35-36°C
- Д. 38-39°C
- Е. 37-38°C

58. До акушерки ФАПу звернулася жінка 32-х років зі скаргами на значні кров'яні виділення зі статевих шляхів протягом 9-ти днів. З анамнезу: менструації регулярні, по 7-8 днів протягом 6-ти місяців. Страждає на хронічне запалення придатків матки. При піхвовому дослідженні: шийка матки чиста, тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності, вузлувате, безболісне, рухоме. Виділення кров'яні, рясні. Що спричинило гіперменструальний синдром?

- А. *Пухлина матки
- В. Атрезія цервікального каналу
- С. Дисгенезія гонад
- Д. Пухлина гіпофіза
- Е. Полікістоз яєчника

59. ВІЛ-інфікована жінка народила дитину. Вкажіть вид дезінфекції, який необхідно провести у пологовому відділенні після виписки породіллі:

- А. *Заключна
- В. Профілактична
- С. Осередкова
- Д. Поточна
- Е. Вогнищева

60. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 23-х років зі скаргами на ниючий біль у животі, нудоту, одноразову блювоту, температуру тіла - 38°C . При огляді: язик обкладений, сухуватий. Пульс - 88/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., живіт в правій здухвинній ділянці напружений, болючий, позитивні симптоми Воскресенського, Щоткіна-Блюмберга. Що можна припустити у пацієнта?

- A.** *Гострий апендицит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Гостру кишкову непрохідність
- E.** Гострий цистит

61. При зовнішньому акушерському дослідженні за допомогою прийомів Леопольда-Левицького акушерка визначила: положення плоду поздовжнє, ГГ позиція, тазове передлежання. Вкажіть місце вислуховування серцебиття плоду:

- A.** *Праворуч вище пупка
- B.** Ліворуч вище пупка
- C.** Праворуч на рівні пупка
- D.** Ліворуч нижче пупка
- E.** Праворуч нижче пупка

62. Акушерка пологового відділення надає допомогу при пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

- A.** *Запропонувати роділлі потужитись
- B.** Застосувати зовнішній прийом за Креде-Лазаревичем
- C.** Провести ручне відокремлення посліду
- D.** Ввести в/в 1 мл окситоцину
- E.** Застосувати зовнішній прийом за Гентером

63. Першовагітна 25-ти років госпіталізована у пологовий будинок після виникнення некоординованих посіпувань м'язів кінцівок у вигляді «руки акушера», «ноги балерини». Назвіть групу лікарських засобів, які застосовують в комплексній терапії даної патології:

- A.** *Препарати кальцію
- B.** Препарати йоду
- C.** Утеротонічні засоби
- D.** Гіпертензивні засоби
- E.** Протиблювотні засоби

64. Пацієнтка 22-х років госпіталізована в гінекологічне відділення з діагнозом прогресуюча позаматкова вагітність. Який вміст отримують під час проведення пункції черевної порожнини крізь заднє склепіння піхви?

- A.** *Вміст відсутній
- B.** Кров, яка згортається
- C.** Серозний
- D.** Кров, яка не згортається
- E.** Гнійний

65. Акушерка ФАПу здійснює диспансеризацію вагітної, що страждає на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Жінка з'явилася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, періодично відзначає відходження калу чорного кольору. Назвіть найбільш імовірне ускладнення захворювання:

- A.** *Шлункова кровотеча
- B.** Печінкова колька
- C.** Гострий гастрит
- D.** Перфорація виразки

Е. Стеноз воротаря

66. Хвора 25-ти років госпіталізована до гінекологічного відділення зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, біль внизу живота, гнійні виділення з піхви. Захворіла гостро через тиждень після штучного аборт. Об'єктивно: пульс - 100/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Гінекологічний статус: матка збільшена у розмірах, м'яка, болюча, придатки без змін, склепіння вагіни вільні. Виділення з піхви значні, гноєподібні. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** *Післяабортний метроендометрит
- B.** Септицемія
- C.** Лохіометра
- D.** Пельвіоперитоніт
- E.** Гострий аднексит

67. У дитини, народженої з внутрішньочерепною пологовою травмою, різко погіршився стан, дитина стала неспокійна, з'явилися зригування та блювання, виникли судоми. Який препарат необхідно ввести дитині в першу чергу?

- A.** *Реланіум
- B.** Адреналін
- C.** Ефедрин
- D.** Кордіамін
- E.** Преднізолон

68. Мама з дитиною 12-ти місяців звернулася на ФАП для проведення специфічної профілактики проти кору, паротиту, краснухи. Вона поцікавилась, у якому віці її дитині будуть повторно вводити вакцину від зазначених хвороб:

- A.** *У 6 років
- B.** У 14 років
- C.** У 3 роки
- D.** У 10 років
- E.** У 2 роки

69. У дитини 4-х років з'явилися лихоманка до 39°C, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмоподібна кишка пальпується у вигляді тонкого тяжа. Яке захворювання можна припустити?

- A.** *Дизентерія
- B.** Токсична диспепсія
- C.** Ешерихіоз
- D.** Холера
- E.** Сальмонельоз

70. В пологовому будинку народжує жінка 28-ми років. У роділлі встановлено сідничне передлежання плоду. Акушерка проводить ручну допомогу за Цов'яновим. З якого моменту акушерці треба розпочати надавати ручну допомогу за методом Цов'янова?

- A.** *З моменту прорізування сідниць
- B.** Після прорізування сідниць
- C.** Після народження тулуба
- D.** Після народження плода до нижніх кутів лопаток
- E.** Після народження до пупка

71. До Вас на ФАП звернулася хвора 42-х років зі скаргами на головний біль, мерехтіння "мушок" перед очима. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, збуджена. АТ- 170/95 мм рт.ст., пульс - 96/хв., напружений. Значне сечовипускання. Який препарат Ви застосуєте першочергово, щоб допомогти цій пацієнтці?

- A.** *Ніфедипін

- В.** Преднізолон
- С.** Димедрол
- Д.** Атропін
- Е.** Анальгін

72. При проведенні профілактичного огляду з метою ранньої діагностики раку шийки матки використовують:

- А.** *Мазок на цитологічне дослідження
- В.** Мазок на ступінь чистоти піхви
- С.** Мазок на гормональне дзеркало
- Д.** Бактеріоскопічне дослідження
- Е.** Бактеріологічне дослідження

73. У роділлі повторні передчасні пологи. Таз нормальних розмірів. Передбачувана маса тіла плода - 2500 г. Пологова діяльність активна. Голівка рухлива над входом в малий таз. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки 7-8 см, плодовий міхур відсутній. Прощупуються ніс, рот, підборіддя, що повернуте ліворуч дотрону. Встановіть діагноз:

- А.** *Лицеве передлежання, передній вид
- В.** Лобне передлежання, передній вид
- С.** Лицеве передлежання, задній вид
- Д.** Передньо-головне передлежання, передній вид
- Е.** Предньо-головне передлежання, задній вид

74. На ФАП доставлений пацієнт без свідомості. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, дихання Куссмауля, у повітрі відчувається запах ацетону. Очні яблука м'які, рефлекси відсутні. Зі слів родичів, страждає на цукровий діабет. Який стан розвинувся у хворого?

- А.** *Гіперглікемічна кома
- В.** Печінкова кома
- С.** Гіпоглікемічна кома
- Д.** Непритомність
- Е.** Уремична кома

75. Народилась доношена дитина. Акушерка проводить антропометрію. Чому дорівнює малий косий розмір голівки?

- А.** *9,5 см
- В.** 11 см
- С.** 12 см
- Д.** 13 см
- Е.** 10 см

76. Пацієнтці, яка перебуває на лікуванні, призначено огляд слизової оболонки товстого кишечника, у зв'язку з підозрою на пухлину. До якого ендоскопічного обстеження акушерка підготує пацієнтку?

- А.** *Колоноскопія
- В.** Холецистографія
- С.** Дуоденоскопія
- Д.** Урографія
- Е.** Іригоскопія

77. Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулася на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та правій підреберній ділянках оперізувального характеру, багаторазове блювання. Об'єктивно: Рс- 120/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт під час пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Який попередній діагноз?

- А.** *Гострий панкреатит

- В.** Загострення виразкової хвороби шлунка
- С.** Гострий гастрит
- Д.** Гострий холецистит
- Е.** Гострий апендицит

78. До акушерки ФАПу звернулася мати дитини віком 6-ти років, у якої спостерігається підвищення температури тіла до $38,6^{\circ}\text{C}$, вологий кашель. Тиждень тому дитина перехворіла на грип. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, шкіра бліда. Перкуторно: вкорочення перкуторного звуку. Аускультативно: дихання ослаблене, крепітація в нижніх відділах грудної клітки справа. Вкажіть захворювання, для якого найбільш характерні дані симптоми:

- А.** *Пневмонія
- В.** Бронхіальна астма
- С.** Плеврит
- Д.** Гострий бронхіт
- Е.** Хронічний бронхіт

79. До приймального відділення пологового будинку поступила роділья з доношеною вагітністю. При огляді: роділья неспокійна, контракційне кільце розташоване високо і косо, матка у формі піщаного годинника, зовнішні статеві органи набрякли. Яке ускладнення пологів припускає акушерка?

- А.** *Загроза розриву матки
- В.** Дискоординована пологова діяльність
- С.** Розрив піхви
- Д.** Слабкість пологової діяльності
- Е.** Розрив матки

80. Хвора 48-ми років скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, біль внизу живота. Клініка виникла півроку тому. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки визначаються щільні, горбисті, нерухомі пухлини, які заповнюють порожнину малого таза. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** *Рак яєчників
- В.** Міома матки
- С.** Кісти яєчників
- Д.** Кістоми яєчників
- Е.** Рак тіла матки

81. На ФАП до акушерки звернулася хвора зі скаргами на підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$ (7, гострий початок хвороби, біль в попереку, литкових м'язях, різке зниження кількості сечі, іктеричність склер та шкіри. При огляді: позитивний симптом Пастернацького. 6 днів назад купалась в озері. Яке захворювання можна припустити:

- А.** *Лептоспіроз
- В.** Лейшманіоз
- С.** Вірусний гепатит
- Д.** Токсоплазмоз
- Е.** Бруцельоз

82. Ви акушерка пологового відділення. Породілья 34-х років. Вагітність VIII. Пологи II. Пологи без ускладнень. При огляді посліду дефектів не виявлено. Кровотеча продовжується. Проведений огляд пологових шляхів: пологові шляхи цілі. Об'єктивно: дно матки вище пупка. При пальпації матка м'яка. Тонус матки не змінюється після введення засобів, що скорочують матку. Яка причина кровотечі?

- А.** *Атонія матки
- В.** Гіпотонічна кровотеча
- С.** Часткове прирощення плаценти

- D. Розрив шийки матки
- E. Затримка часточок плаценти в матці

83. Лікар пологового відділення запідозрив у роділлі загрозу розриву матки. Яке з призначень лікаря першочергово виконає акушерка?

- A. *Припинити пологову діяльність
- B. Введення знеболювальних
- C. Заспокоїти роділлю
- D. Порахувати перейми
- E. Виміряти АТ

84. До ФАПу звернулась жінка 30-ти років зі скаргами на біль в ділянці соска лівої молочної залози. При огляді: на шкірі соска й ареоли сухі, щільні кірочки, тріщини з яскраво-червоною поверхнею, що мокнуть. У пахвовій ділянці зліва пальпуються безболісні лімфатичні вузли. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Рак Педжета
- B. Алергічний дерматит
- C. Хронічний мастит
- D. Екзема соска зліва
- E. Мастопатія

85. Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Народився живий доношений хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС- 40/хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м'язів. Яка невідкладна допомога?

- A. *ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно адреналін
- B. ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію
- C. Закритий масаж серця, внутрішньовенно адреналін, глюкоза
- D. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно глюкозу
- E. Закритий масаж серця, внутрішньовенно гідрокарбонат натрію

86. Хворій, яка надійшла в урологічне відділення з діагнозом хронічний пієлонефрит, призначили аналіз сечі. Як потрібно зібрати сечу для дослідження за Зимницьким?

- A. *За добу кожні 3 години, 8 окремих порцій
- B. 50 мл сечі свіжовипущеної і теплої
- C. За 12 годин кожні 3 години в окремий посуд
- D. Середню порцію сечі у будь-який час
- E. За добу в один посуд

87. Вагітна 40 тижнів, I пологи, II період. Народився хлопчик масою 2400 г, зріст - 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення II плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику подальшого ведення пологів:

- A. *Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку
- B. Амніотомія, стимуляція пологової діяльності
- C. Кесарів розтин
- D. Вичікувальна тактика
- E. Амніотомія, консервативний метод ведення пологів

88. На роботах з підвищеною небезпекою один раз на квартал проводиться:

- A. *Повторний інструктаж
- B. Вступний інструктаж
- C. Позаплановий інструктаж
- D. Цільовий інструктаж
- E. Первинний інструктаж

89. На ФАП звернувся чоловік 45-ти років зі скаргами на біль у животі, який виник годину тому після фізичного навантаження. При огляді Ви виявили у паховій ділянці болюче випинання. Яку допомогу необхідно надати?

- A.** *Холод на живіт та транспортування до лікарні
- B.** Зрошення випинання хлоретилом, спостереження
- C.** Ввести знеболюючі, спостерігати
- D.** Тепло на живіт, ручне вправлення випинання
- E.** Ввести знеболюючі, вправити випинання

90. Жінка 33-х років, вагітність 34 тижні. Перебуває на стаціонарному лікуванні. Протягом останніх 2-х діб висуває скарги на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ- 170/120 мм рт.ст. В загальному аналізі сечі протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка патологія у вагітної?

- A.** *Тяжка прееклампсія
- B.** Гіпертонічний криз
- C.** Гостре порушення мозкового кровообігу
- D.** Еклампсія
- E.** Прееклампсія середньої тяжкості

91. Виклик до дитини 5-ти років, яка хворіє на природжену ваду серця. При огляді: стан дитини тяжкий, виражена задишка, дихання клекотливе, ціаноз шкіри. При аускультатії в легенях на фоні жорсткого дихання значна кількість вологих хрипів з обох боків. Вкажіть препарат, який необхідно ввести в першу чергу:

- A.** *Розчин корглікону
- B.** Анальгін
- C.** Піпольфен
- D.** Преднізолон
- E.** Глюконат кальцію

92. При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі виявлено: крижова западина цілком заповнена голівкою плода, пальпується тільки нижній край лона, сідничні горби і куприк. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі ближче до прямого. В якій площині малого тазу розташована голівка плода?

- A.** *У вузькій частині малого тазу
- B.** У виході з малого тазу
- C.** Над входом в малий таз
- D.** У широкій частині малого тазу
- E.** Малим сегментом у вході в малий таз

93. При обстеженні у пацієнтки виявили збільшення та розм'якшення матки, яка у відповідь на подразнення ущільнюється і зменшується. В анамнезі: затримка менструації. Яка ознака спостерігається у вагітної?

- A.** *Снегірьова
- B.** Гегара
- C.** Гентера
- D.** Губарева
- E.** Піскачека

94. Акушерка проводить плановий огляд дівчинки 6-ти місяців. У дитини майже зникла підшкірна жирова клітковина на животі, кінцівках, маса тіла знизилась на 24%. На що вказують ці симптоми?

- A.** *Гіпотрофія II ступеня
- B.** Хронічний гастрит
- C.** Простий гастроентерит

- D. Гіпотрофія III ступеня
- E. Гіпотрофія I ступеня

95. Породілля через 23 хвилини після народження живої доношеної дівчинки масою 3000 г перебуває у пологовій залі. Плацента відділилась самостійно, плодовою поверхнею назовні. Назвіть спосіб відшарування:

- A. *Спосіб Шульце
- B. Спосіб Дункана
- C. Спосіб Піскачека
- D. Спосіб Абуладзе
- E. Спосіб Гентера

96. При зовнішньому акушерському дослідженні живіт має поперечно-овальну форму, у лівій бічній стороні матки пальпується кругла, щільна частина плоду, що балотує, у правій - об'ємиста м'якувата частина плоду, що не балотує. Серцебиття плоду прослуховується на рівні пупка. Яке положення, позиція та передлежання плоду?

- A. *Поперечне положення, I позиція, передлегла частина відсутня
- B. Поздовжнє положення, I позиція, головне передлежання
- C. Поперечне положення, II позиція, передлегла частина відсутня
- D. Косе положення, I позиція, передлегла частина відсутня
- E. Поздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання

97. Під час вживання їжі у чоловіка 28-ми років раптово виникла інспіраторна задишка, нападоподібний кашель, ціаноз обличчя, осиплість голосу. Потерпілий збуджений, судомно хапається руками за шию. Який захід невідкладної допомоги необхідно здійснити?

- A. *Прийом Геймліха
- B. Потрійний прийом Сафара
- C. ШВЛ
- D. Постуральний дренаж
- E. Трахеостомія

98. У II періоді термінових пологів діагностували лицеве передлежання плода. Голівка в порожнині малого тазу. Стан плода і матері - задовільний. Пологова діяльність активна, при потузі підборіддя повертається до лона. Яка найбільш правильна акушерська тактика?

- A. *Очікувальна
- B. Плороруйнування
- C. Кесарів розтин
- D. Акушерські щипці
- E. Родостимуляція

99. На ФАП доставлено потерпілого з кровотечею з променевої артерії. Який метод тимчасової зупинки артеріальної кровотечі слід застосувати?

- A. *Пальцеве притиснення артерії
- B. Холод на рану
- C. Застосувати гемостатичну губку
- D. Туга тампонада рани
- E. Накладання давлячої пов'язки

100. Дитина народилася від першої вагітності з вагою 2900 г. При народженні виявлені множинні вади розвитку: мікроцефалія, катаракта, глухота, вроджена вада серця. Матері 18 років. В перші три тижні вагітності перенесла гостре інфекційне захворювання. Яке інфекційне захворювання матері стало найбільш імовірною причиною даної патології новонародженої дитини?

- A. *Краснуха
- Скарлатина

- В.** Вітряна віспа
- Д.** Менінгококова інфекція
- Е.** Кір

101. Ви працюєте у пологовій залі. У роділлі в II періоді пологів припинилось просування голівки плода, яка вже опустилась на тазове дно. Серцебиття плода на потугу 100/хв., аритмічне. Ваша тактика:

- А.** *Епізіотомія
- В.** Краніотомія
- С.** Перінеотомія
- Д.** Амніотомія
- Е.** Клейдотомія

102. У післяопераційній палаті перебуває пацієнтка 67-ми років у тяжкому стані після гінекологічної операції. їй призначено ліжковий режим. Медсестра проводить заходи з профілактики пролежнів. Вкажіть розчин для оброблення шкіри в місцях можливого утворення пролежнів:

- А.** *10% розчин камфорного спирту
- В.** 1:5000 розчин фурациліну
- С.** 2% розчин гідрокарбонату натрію
- Д.** 1 % розчин калію перманганату
- Е.** 3% розчин перекису водню

103. Роділля 40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри таза: 27-28-31-17. Індекс Соловійова - 14 см. Діагональна кон'югата 9,5 см. Яка форма кісткового таза?

- А.** *Плоскоракітничий
- В.** Поперечнозвужений
- С.** Загальнорівномірнозвужений
- Д.** Таз нормальних розмірів
- Е.** Простий плоский

104. У першороділлі у послідовому періоді через 15 хвилин ознаки відокремлення плаценти позитивні. При потужуванні послід не виділяється. Який із способів виділення посліду зовнішніми прийомами може бути найбільш фізіологічним і досить ефективним?

- А.** *Абуладзе
- В.** Гентера
- С.** Креде-Лазаревича
- Д.** Креде-Лазаревича під наркозом
- Е.** Епштейна

105. Ви акушерка пологового відділення. Роділля 27 років. Пологи I, термінові. Загальний стан задовільний. Маса плода 3900 гр. Народився послід, цілий. Крововтрата 200 мл. З піхви тривають кров'яні виділення. Матка відхилена вправо, щільна. В дзеркалах: зліва розрив шийки до 2-х см; краї рани кровоточать. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?

- А.** *Накласти шви на шийку матки
- В.** Ручна ревізія порожнини матки
- С.** Масаж матки
- Д.** Ввести утеротоніки
- Е.** Інструментальна ревізія порожнини матки

106. Акушерка спостерігає за першороділлем 29-ти років, яка доставлена в акушерський стаціонар із переймами, що почалися 10 годин тому. Перейми слабкі, нетривалі, кожні 9-10 хвилин. Серцебиття плода - 160/хв., ясне, ритмічне. Шийка матки згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яка аномалія пологової

діяльності у роділлі?

- A. *Первинна слабкість пологової діяльності
- B. Дискоординована пологова діяльність
- C. Провісники пологів
- D. Патологічний прелімінарний період
- E. Вторинна слабкість пологової діяльності

107. Хвора звернулася до акушерки ФАПУ зі скаргами на гнійні виділення, біль, печіння, свербіж у піхві, температура - нормальна. При огляді: гіперемія, набряк слизової піхви, виділення рідкі, пінисті, жовто-зеленого кольору. Для якого захворювання характерна дана клінічна картина?

- A. *Кольпіту
- B. Кондилом
- C. Аднекситу
- D. Вульвіту
- E. Ендометриту

108. Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і часточками. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

- A. *Зовнішній масаж матки
- B. Введення кровозамінників
- C. Ручна ревізія порожнини матки
- D. Міхур з льодом на низ живота
- E. Введення кровоспинних препаратів

109. У пацієнтки 47-ми років з діагнозом гіпертонічна хвороба з'явилась задишка інспіраторного характеру, клекочуче дихання, кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- A. *Набряк легень
- B. Астматичний стан
- C. Тиреотоксичний криз
- D. Кардіогенний шок
- E. Гіпертонічний криз

110. Роділля 25-ти років, II період пологів. При внутрішньому акушерському дослідженні розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка, яка цілком виповнює крижову западину. Сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Де розташована голівка?

- A. *В площині виходу малого таза
- B. Великим сегментом у площі входу у малий таз
- C. Малим сегментом у площині входу в малий таз
- D. В площині широкої частини малого таза
- E. В площині вузької частини малого таза

111. Пацієнт 60-ти років переніс два інфаркти міокарда. За відсутності фельдшера він звернувся у ФАП до акушерки зі скаргами на погіршення свого стану: поступово наростала втомлюваність, з'явилась задишка, спочатку при звичайному, а згодом навіть при невеликому фізичному навантаженні, серцебиття, у другій половині дня почали набрякати кісточки. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. *Хронічна серцева недостатність
- B. Гіпертонічний криз
- C. Гостра серцева недостатність
- D. Вада серця

Е. Гостра судинна недостатність

112. Стерильну пробірку з консервантом і ректальною петлею готують для збирання калу на:

- A.** *Бактеріологічне дослідження
- B.** Копрологічне дослідження
- C.** Наявність прихованої крові
- D.** Загальний аналіз
- E.** Дослідження на яйця гельмінтів

113. Пацієнтка 18-ти років скаржиться на сильний біль внизу живота. Остання нормальна менструація 2 тижні тому. Місячні з 14-ти років, регулярні, через 28 днів. Шкіра бліда. Пульс - 96/хв., ритмічний, АТ-100/70 мм рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання. Симптом Щоткіна слабо позитивний в нижніх відділах живота. Під час піхвового дослідження: матка не збільшена, додатки з правого боку - визначається збільшений бхб см яєчник, різко болючий, ліворуч - не збільшені. Задне склепіння випинає. Який попередній діагноз?

- A.** *Апоплексія яєчника
- B.** Гострий апендицит
- C.** Гострий калькульозний пієлонефрит
- D.** Перекрут кістоми яєчника
- E.** Трубна вагітність, яка перервалася

114. Вагітна, I вагітність, 36 тижнів, надходить в пологовий будинок у відділення патології вагітних з ознаками пізнього гестозу. Який документ повинна мати при собі вагітна?

- A.** *Обмінну карту
- B.** Історію пологів
- C.** Карту диспансерного спостереження
- D.** Індивідуальну карту вагітної та породіллі
- E.** Контрольну карту спостереження

115. До якої діагностичної процедури слід підготувати дитину, якщо у неї сильний головний біль, блювання, ригідність потиличних м'язів, позитивний симптом Керніга?

- A.** *Люмбальна пункція
- B.** Офтальмоскопія
- C.** МРТ голови
- D.** Лабораторні методи дослідження
- E.** ЕКГ

116. Пацієнтка 22-х років перебуває на лікуванні в гінекологічному відділенні. Під час внутрішньовенного введення 10% розчину кальцію хлориду вона поскаржилась акушерці на відчуття пекучого болю в місці ін'єкції. Вкажіть можливе після ін'єкційне ускладнення:

- A.** *Некроз тканини
- B.** Абсцес
- C.** Тромбофлебіт
- D.** Інфільтрат
- E.** Повітряна емболія

117. Діагностичним критерієм "важкої асфіксії при народженні" є оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар упродовж перших 5 хвилин життя:

- A.** *Менше 4 балів
- B.** Менше 6 балів
- C.** Менше 8 балів
- D.** Менше 5 балів
- E.** Менше 7 балів

118. При обстеженні пацієнта, який звернувся на ФАП з приводу нападів гарячки, акушерка виявила збільшення печінки і селезінки. При збиранні епіданамнезу було з'ясовано, що хворий місяць тому повернувся з відрядження до однієї з африканських країн. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Малярія
- B. Грип
- C. Холера
- D. Ботулізм
- E. Харчова токсикоінфекція

119. До акушерки звернулася жінка 28-ми років, яка скаржиться на загальну слабкість, кровотечі з ясен, крововиливи на шкірі. Хворіє 8 років. Об'єктивно: шкіра бліда. На шкірі грудної клітки крововиливи різного розміру та кольору (темно- червоного, синього, зеленого, жовтого). Лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не збільшені. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. *Тромбоцитопенічна пурпура
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Хронічний лімфолейкоз
- D. Гемофілія
- E. Хронічний мієлолейкоз

120. До акушерки ФАПу звернулася першовагітна 18-ти років у терміні вагітності 8 тижнів. Зріст - 166 см, вага - 59 кг, розміри тазу: 24-26-28-18 см. Яка форма тазу у даної жінки?

- A. *Загальнорівномірнорозвужений таз
- B. Поперечнозвужений таз
- C. Плоскоракітичний таз
- D. Простий плоский таз
- E. Нормальний таз

121. У пацієнтки з пневмонією на фоні лікування антибіотиками розвинулася криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40,3°C до 36,2°C. При цьому самопочуття погіршилось: пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржиться на слабкість, потемніння в очах, АТ- 70/40 мм рт.ст., Рс- 100/хв., ниткоподібний. Яке ускладнення найбільш імовірно в даному випадку?

- A. *Колапс
- B. Гостра серцева недостатність
- C. Анафілактичний шок
- D. Кардіогенний шок
- E. Непритомність

122. До акушерки ФАПу звернулася жінка 55-ти років, яка 30 хвилин тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Скаржиться на пекучий біль. При огляді: почервоніння грудної клітки, у деяких місцях пухирі, заповнені світло-жовтою рідиною. Визначте площу опіку та його ступінь:

- A. *9%, II ступінь
- B. 9%, I ступінь
- C. 18%, I ступінь
- D. 9%, III-A ступінь
- E. 18%, II ступінь

123. В інфекційне відділення надійшов хлопчик 5-ти років з явищами ангіни, інтоксикації. Стан важкий, шкіра червона, вкрита дрібноточковою висипкою, яка переважає в складках. Які залишкові зміни будуть спостерігатися у дитини в періоді реконвалесценції?

- A. *Лущення долонь та підонш
- B. Блідий носогубний трикутник
- C. Пігментація шкіри

- D. Палаючий зів
- E. Плями на слизовій щік

124. Хвора 31-го року звернулась до ФАПу зі скаргами на сильний біль в лівій половині попереку з іррадіацією в пахвинну ділянку, відмічає часті позиви до сечовипускання. Хвора збуджена, симптом Пастернацького зліва різко позитивний. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- A. *Ниркова колька
- B. Гострий пієлонефрит
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Хронічний пієлонефрит
- E. Хронічний гломерулонефрит

125. У пацієнтки 35-ти років під час огляду шийки матки у дзеркалах виявлено яскраво-червону пляму на передній губі, яка кровоточить при дотику. Який додатковий метод діагностики найдоцільніше застосовувати у даному випадку?

- A. *Кольпоскопічне дослідження
- B. Бактеріологічне дослідження
- C. Гістероскопічне дослідження
- D. Бактеріоскопічне дослідження
- E. Цервікоскопічне дослідження

126. Вагітна 20-ти років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що у дна матки пальпується округла, щільна, балотуюча частина плода, спинка розташована з лівого боку матки. Визначте передлежання та позицію плода:

- A. *Тазове передлежання, перша позиція
- B. Поперечне положення, перша позиція
- C. Тазове передлежання, друга позиція
- D. Головне передлежання, перша позиція
- E. Головне передлежання, друга позиція

127. Випускниця медичного коледжу прийшла влаштовуватись на роботу в пологовий будинок. Який медичний огляд вона проходить відповідно до «Положення про проведення медичних оглядів»?

- A. *Попередній
- B. Поточний
- C. Цільовий
- D. Періодичний
- E. Позаплановий

128. Хворий 45-ти років доставлений у реанімаційне відділення зі скаргами на біль у горлі, утруднене ковтання, сипання м'язів у рані. Об'єктивно: підвищений тонус м'язів і сухожильних рефлексів. Через 6 годин з'явився тризм, сардонічна посмішка, опістотонус. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Правець
- B. Серцева недостатність
- C. Стороннє тіло у трахеї
- D. Бронхіальна астма
- E. Дифтерія

129. Назвіть розчин, який можна використати при розведенні антибіотика для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість:

- A. *0,9% розчин натрію хлориду
- B. 0,25% розчин новокаїну
- C. 40% розчин глюкози
- D. 0,5 % розчин новокаїну
- E. 2% розчин новокаїну

130. Акушерка індивідуальної пологової палати за призначенням лікаря розпочала інфузію розчину окситоцину 5 ОД + 400 мл ізотонічного розчину. З якою швидкістю вона розпочне інфузію?

- A.** *6-8 крапель за 1 хвилину
- B.** 60 крапель за 1 хвилину
- C.** 18-20 крапель за 1 хвилину
- D.** 16-18 крапель за 1 хвилину
- E.** 40 крапель за 1 хвилину

131. При огляді пацієнтки акушерка виявила на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок мономорфні висипи у вигляді рожево-червоних папул, вкритих сріблястими лусочками. Для якого захворювання характерні данні ознаки?

- A.** *Псоріазу
- B.** Червоного плоского лишая
- C.** Сухої себореї
- D.** Червоного вовчака
- E.** Нейродерміту

132. У дитини 2-х років субфебрильна температура, катаральні явища, інтоксикація. Хворіє тиждень, кашель гавкаючий, голос поступово втратив гучність, дихання з участю допоміжних м'язів. Відомо, що щеплення проводились з грубим порушенням термінів. Якого збудника виявлять при спеціальному обстеженні дитини?

- A.** *Бацилу Лефлера
- B.** Коклюшну паличку
- C.** Бацилу Коха
- D.** Менінгокок
- E.** Стрептокок

133. Хвора 32-х років доставлена ШМД до лікарні зі скаргами на біль у правому під-ребер'ї з іррадіацією у лопатку, що виник через 2 години після вживання смаженої їжі, нудоту. Об'єктивно: язик сухий, жінка займає вимушене положення на правому боці, пульс - 98/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. При пальпації у правому підребер'ї виявляється болючість, позитивний симптом Ортнера. Який Ваш попередній діагноз?

- A.** *Гострий холецистит
- B.** Гострий гастрит
- C.** Виразкова хвороба шлунка
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Хронічний гепатит

134. До гінекологічного відділення звернулася жінка зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви. Остання менструація була 3,5 місяці тому. УЗД не проходила. Матка при пальпації тістоподібної консистенції, безболісна, ВДМ - 24 см. Частини плоду не пальпуються, ворущіння не відчувається. З обох боків матки пальпуються овоїдні утворення 5х6 см. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** *Міхуровий занесок
- B.** Загроза аборту
- C.** Передчасне відшарування плаценти
- D.** Антенатальна загибель плоду
- E.** Передлежання плаценти

135. Ви акушерка пологового відділення. Роділля 20-ти років. Пологи I, термінові. I період пологів. Ви проводите аускультатию серцебиття плода. Як часто слід проводити аускультатию під час латентної фази I періоду пологів?

- A.** *Кожні 30 хвилин
- B.** Кожні 4 години

- C. Кожні 2 години
- D. Кожні 15 хвилин
- E. Кожні 60 хвилин

136. Хвора 24-х років скаржиться на біль за ходом 6-7 ребер, зліва. У цій ділянці на тлі невеликої еритеми групами розташовані везикули. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A. *Оперізувальний лишай
- B. Герпетиформний дерматит
- C. -
- D. Імпетиго
- E. Дерматит

137. Хвора 25-ти років, звернулась на ФАП зі скаргами на невеликі кров'янисті виділення зі статевих органів, які з'явилися після затримки менструації протягом 3-х тижнів, біль внизу живота. Бімануально: матка дещо збільшена в розмірах, болюча при пальпації, праворуч пальпуються збільшені та різкоболючі придатки, при огляді в дзеркалах ш/м ціанотична, задне склепіння випинає. Ваша тактика:

- A. *Негайна госпіталізація в гінекологічне відділення
- B. Холод на живіт, відправити додому
- C. Ввести протишокові препарати
- D. Залишити на ФАПі для спостереження
- E. Знеболити

138. Пацієнтка 18-ти років захворіла гостро, температура висока, лежить у ліжку нерухомо. Скаржиться на сильний головний біль дифузного характеру, який посилюється при рухах, яскравому світлі, голосних звуках. Періодично виникають гикавка та блювання, що не приносить полегшення. Позитивні менінгеальні ознаки. Поставте попередній діагноз:

- A. *Менінгококовий менінгіт
- B. Струс головного мозку
- C. Енцефаліт
- D. Інсульт
- E. Туберкульозний менінгіт

139. У пацієнтки 50-ти років протягом останнього року виникає короточасний за грудинний біль до 3 хвилин з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Останній напад тривав 5 хвилин. Який препарат застосуєте для зняття нападу в першу чергу?

- A. *Нітрогліцерин
- B. Ериніт
- C. Анальгін
- D. Нітросорбіт
- E. Промедол

140. Акушерка жіночої консультації визначає у вагітної дату пологів. Остання менструація була 5 травня. Коли прогнозована дата пологів:

- A. *12 лютого
- B. 12 серпня
- C. 20 червня
- D. 17 лютого
- E. 25 серпня

141. Пацієнтка 50-ти років впродовж 10-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, гіпотензивні препарати приймає нерегулярно. Після фізичного і психічного навантаження раптово з'явилися сильний головний біль, нудота, блювання, стала збуджена. При обстеженні: стан свідомості коматозний, гіперемія обличчя, АТ- 200/100 мм рт.ст., пульс - 54/хв., напружений. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського, ригідність потиличних м'язів. Температура тіла

нормальна. Назвіть ускладнення гіпертонічної хвороби:

- A.** *Субарахноїдальний крововилив
- B.** Гіпертонічний криз
- C.** Арахноїдит
- D.** Минуще порушення мозкового кровообігу
- E.** Інфаркт міокарду

142. Жінка 26-ти років, вагітність I, 38 тижнів. Скарги на головний біль, погіршення зору, нудоту, блювання. Об'єктивно: збуджена, обличчя багряно-синюшне, АТ- 170/120 мм рт.ст., набряки ніг та черевної стінки. Під час огляду з'явилися судоми, тривалістю близько 2 хвилин. Свідомість відсутня, не дихає, біля рота рожева піна. Який попередній діагноз?

- A.** *Еклампсія
- B.** Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- C.** Пухлина головного мозку
- D.** Епілепсія
- E.** Тромбоз верхнього сагітального синуса

143. Жінка 32-х років скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який з'явився після вживання смаженого м'яса. При обстеженні відзначається напруження м'язів і болючість у правому підребер'ї. Вкажіть патогномонічні симптоми, характерні для даного захворювання:

- A.** *Симптоми Ортнера, Кера
- B.** Симптоми Кохера, Бартом'є-Міхельсона
- C.** Симптоми Ровзінга, Воскресенського
- D.** Симптоми Ситковського, Керте
- E.** Симптоми Роздольського, Мейо-Робсона

144. Вас викликали на місце ДТП. Потерпілий без свідомості, обличчя бліде, пульс - 110/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, часте. Спостерігається витікання крові та ліквора з носа та вух. Який Ваш попередній діагноз?

- A.** *Перелом основи черепа
- B.** Струс головного мозку
- C.** Стискання головного мозку
- D.** Забій головного мозку
- E.** Перелом склепіння черепа

145. Ви працюєте на ФАПі. Вас викликали до чоловіка 50-ти років, у якого з'явився сильний стискаючий біль за грудиною, різка слабкість, задишка. Хворий неспокійний, шкірні покриви бліді, на чолі краплі поту. Прийом нітроглицерину ефекту не дав. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** *Інфаркт міокарда
- B.** Вада серця
- C.** Напад стенокардії
- D.** Гіпертонічний криз
- E.** Серцева астма

146. Породілля звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на підвищення t° до 39- 40 $^{\circ}$ C', біль внизу живота, головний біль, спрагу, слабкість. Пологи відбулися тиждень тому, розриви на шийці матки. При піхвовому дослідженні визначається інфільтрат зліва від матки. Попередній діагноз:

- A.** *Параметрит
- B.** Метроендометрит
- C.** Сальпінгоофорит
- D.** Пельвіоперитоніт
- E.** Ендометрит

147. Дитину 2-х років за праву щоку вкусила комаха. На місці укусу з'явилося почервоніння, почали набрякати губи, повіки. Дихання стало утруднене, голос хриплим. Температура тіла підвищилася до 38°C . Такий стан діагностують у разі:

- A.** *Набряку Квінке
- B.** Молочному струпі
- C.** Сінної гарячки
- D.** Кропив'янки
- E.** Анафілактичного шоку

148. Пацієнтка 32-х років скаржиться на безпліддя протягом 10-ти років та довготривалі, надмірні менструації. Матка збільшена відповідно до 9 тижнів вагітності, вузлувата, щільна. Додатки не пальпуються. Про яку патологію йде мова?

- A.** *Міома матки
- B.** Ендометрит
- C.** Рак тіла матки
- D.** Пухирний занесок
- E.** Маткова вагітність

149. Пацієнтка 21-го року доставлена в гінекологічне відділення зі скаргами на сильний, різкий біль унизу живота, що виник після навантаження, нудоту, блювання. Менструація була 3 дні тому. При пальпації живота відзначаються симптоми подразнення очеревини. Бімануально: матка не збільшена, зліва в ділянці придатків утвір округлої форми, болючий при пальпації, має гладеньку поверхню. Поставте попередній діагноз:

- A.** *Перекрут ніжки кістоми
- B.** Апоплексія яєчника
- C.** Порушена ектопічна вагітність
- D.** Пельвіоперитоніт
- E.** Розрив піосальпінкса

150. В приймальне відділення надійшла жінка 25-ти років. Вагітність перша, термін 40 тижнів, перебіг без патологій. Акушерка проводить піхвове дослідження, щоб визначити стан і ступень розкриття шийки матки. Виберіть, в якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першороділлі:

- A.** *Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка
- B.** Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка
- C.** Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім
- D.** Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки
- E.** Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка