

1. Приватний медичний заклад очолює керівник, який виконує всі функції управління. Йому підпорядкований кожен з членів колективу медичної установи. Всі виконують тільки його вказівки. Зазначте тип управління:

- A. *Лінійний тип управління
- B. Функціональний тип управління
- C. Дивізійний тип управління
- D. Лінійно-штабний тип управління
- E. Матричний тип управління

2. Медична статистика потрібна для того, щоб:

- A. *Знати рівень здоров'я населення та планувати відповідні заходи з його поліпшення
- B. Знати число осіб, померлих в медичних закладах
- C. Слідкувати за використанням державних коштів
- D. Скласти опис країни та її населення
- E. Складати звіти медичних закладів

3. У стаціонар надійшов пацієнт з гострим отруєнням фосфорорганічними пестицидами. Яку хімічну речовину застосовують для проведення антидотної терапії при даній інтоксикації?

- A. *Атропіну сульфат
- B. Унітіол
- C. Метиленовий синій
- D. Пентацин
- E. Зволожений кисень

4. Пацієнтка 35-ти років звернулась із скаргами на ранкову скутість, біль і деформацію дрібних суглобів кистей рук і стоп. При огляді: кисті рук у вигляді «ластів моржа». Для якого захворювання характерні дані клінічні ознаки?

- A. *Ревматоїдного артрит
- B. Деформуючого остеоартрозу
- C. Остеохондрозу
- D. Ревматичного поліартрит
- E. Системного червоного вовчака

5. До медсестри сімейного лікаря звернулась пацієнтка зі скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рс- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат за призначенням лікаря потрібно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

- A. *Дибазол
- B. Строфантин
- C. Дицинон
- D. Кофеїн
- E. Анальгін

6. Пацієнтка 45-ти років госпіталізована до терапевтичного відділення зі скаргами на головний біль пульсуючого характеру в потиличній ділянці, нудоту, мерехтіння мушок перед очима, біль в ділянці серця. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, пульс - 78/хв., АТ-170/100 мм рт.ст. Вкажіть імовірний попередній діагноз:

- A. *Гіпертонічна хвороба
- B. Ішемічна хвороба серця
- C. Стенокардія напруги
- D. Миготлива аритмія
- E. Інфаркт міокарда

7. На прийомі дитина 3-х років. Скарги на біль в горлі, утруднене ковтання, ознаки інтоксикації. При огляді: на мигдаликах біло-сірі плівки, які важко знімаються шпателем. Яке

захворювання можна припустити?

- A. *Дифтерію зіву
- B. Кандидозний стоматит
- C. Лакунарну ангіну
- D. Афтозний стоматит
- E. Хронічний тонзиліт

8. Інвентаризація медикаментів у терапевтичному відділенні лікарні виявила надлишок спирту медичного та нестачу шприців одноразових. Хто несе матеріальну відповідальність за результати?

- A. *Старша медсестра відділення
- B. Заступник головного лікаря
- C. Завідувач відділенням
- D. Головна медсестра лікарні
- E. Головний лікар

9. Операція з приводу мендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- A. *Налоксон
- B. Атропін
- C. Прозерин
- D. Адреналін
- E. Мезатон

10. Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інших. Який вид статистичного спостереження за часом вони використовують?

- A. *Поточний
- B. Несуцільний
- C. Гніздовий
- D. Вибірковий
- E. Суцільний

11. На медсестринській нараді головна медична сестра лікарні довела до відома присутніх старших медичних сестер розпорядження щодо правил проведення контролю за роботою підпорядкованого їм середнього і молодшого медичного персоналу у відділеннях. Яка форма такої наради?

- A. *Інструктивна
- B. Звітна
- C. Оперативна
- D. Диспетчерська
- E. Проблемна

12. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю?

- A. *Один раз на місяць
- B. Три рази на місяць
- C. П'ять разів на місяць
- D. Два рази на місяць
- E. Чотири рази на місяць

13. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- A. *Кожен випадок хвороби серцево-судинної системи, виявлений на медичному огляді
 - B. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
 - C. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
 - D. Кожен випадок захворювання серцево-судинної системи за даними звертань по медичну допомогу
 - E. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням
- 14.** В ЦРЛ проводиться аналіз організації роботи стаціонарів. Які показники будуть залучені до цього аналізу?
- A. *Середня зайнятість ліжка, середня тривалість госпіталізації хворих, летальність
 - B. Первинна та загальна захворюваність, інвалідність, летальність
 - C. Первинна та загальна захворюваність, смертність, летальність
 - D. Обґрунтованість направлення хворих до стаціонару, середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих
 - E. Середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих, частота співпадіння діагнозів поліклініки та стаціонару
- 15.** Делегування повноважень - це передача підлеглим:
- A. *Завдань, прав і відповідальності за прийняті рішення
 - B. Прав на контроль
 - C. Прав на управління
 - D. Прав з управління з поділом відповідальності
 - E. Завдань, відповідальність за виконання яких несе керівник
- 16.** Мама дитини, у якої діагностовано вроджену ваду серця, звернулась до медичної сестри з питанням: «Чому у дитини спостерігається ціаноз губ та кінцівок?»
- A. *Через змішування артеріальної та венозної крові
 - B. Як результат анемії
 - C. Внаслідок слабкості лівого шлуночка
 - D. Через звуження повітроносних шляхів
 - E. Внаслідок паралічу дихального центру
- 17.** Обов'язковому посерійному контролю на відповідність вимогам підлягають:
- A. *Лікарські засоби для приготування ін'єкційних розчинів і очних крапель
 - B. Сильнодіючі лікарські засоби
 - C. Тверді лікарські форми
 - D. Рідкі лікарські форми
 - E. Лікарські засоби загального призначення
- 18.** У пацієнта, який перебуває в кардіологічному відділенні з інфарктом міокарда, розвинувся кардіогенний шок. Підберіть за призначенням лікаря медикаменти для надання невідкладної допомоги:
- A. *Допамін, морфін
 - B. Папаверин, магнію сульфат
 - C. Еуфілін, преднізолон
 - D. Баралгін, платифілін
 - E. Нітроглицерин, анальгін
- 19.** До сімейної медсестри звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, зниження працездатності, головний біль, запаморочення, задишку, кровоточивість ясен, носові кровотечі, субфебрильну температуру. В загальному аналізі крові панцитопенія. Для якої анемії це характерно?
- A. *Апластичної
 - B. Постгеморагічної
 - C. Гемолітичної
 - D. Мегалобластної

Е. Залізодефіцитної

- 20.** Пацієнтка 37-ми років надійшов в хірургічне відділення. Проведена операція: лапаротомія, спленектомія. В черевній порожнині 1,5 л крові. Під час операції перелито 1 л консервованої крові. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку:
- А. *10% розчин кальцію хлориду
 - В. 0,9% розчин натрію хлориду
 - С. 1% розчин вікасолу
 - Д. 12,5% розчин дицинону
 - Е. 5% розчин амінокапронової кислоти
- 21.** Створення необхідних умов праці та її регламентування є важливою передумовою підвищення ефективності роботи апарату управління. Де фіксуються вимоги до режиму роботи?
- А. *У правилах внутрішнього розпорядку
 - В. У положенні про апарат управління
 - С. У графіку роботи організації
 - Д. У статуті організації
 - Е. В окремо виданому наказі
- 22.** Протягом звітнього року в місті з населенням 20000 зареєстровано 14000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити, використовуючи ці дані?
- А. *Первинна захворюваність
 - В. Окремі види захворюваності
 - С. Поширеність захворювань
 - Д. Структура захворюваності
 - Е. Патологічна ураженість
- 23.** Енергія першого розряду при використанні біполярного дефібрилятора має становити:
- А. *150-200 Дж
 - В. 200-250 Дж
 - С. 250-300 Дж
 - Д. 300-350 Дж
 - Е. 350-400 Дж
- 24.** Старшій медичній сестрі терапевтичного відділення необхідно постійно виконувати контролюючі функції. Гнучкість контролю є однією з них, вона полягає в:
- А. *Адекватній реакції на зміни зовнішнього середовища
 - В. Здатності не допускати впливу сторонніх факторів на суб'єкти контролю
 - С. Адекватному впливі на підлеглих
 - Д. Здатності не зважати на різні чинники
 - Е. Пристосуванні до впливу обставин
- 25.** Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?
- А. *Народжуваність
 - В. Інвалідність
 - С. Летальність
 - Д. Травматизм
 - Е. Первинна захворюваність
- 26.** Дитина 3-х місяців за наявними протипоказаннями не була вчасно щеплена вакциною БЦЖ. На теперішній час здорова. За яких умов можна розпочати профілактичні щеплення дитині?

- A. *Після ретельного обстеження та негативної проби Манту
- B. Після наступної планової вакцинації за календарем
- C. Відкласти щеплення до виповнення 7 років
- D. Після обстеження та позитивної проби Манту
- E. Після ретельного обстеження

27. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат за призначенням лікаря необхідно ввести хворому?

- A. *Кордіамін
- B. Адреналін
- C. Еуфілін
- D. Фенобарбітал
- E. Мезатон

28. Медична сестра кардіологічного відділення викликана в палату о 3 годині ночі до пацієнта, який скаржиться на сильну ядуху, біль за грудиною, серцебиття. Об'єктивно: обличчя ціанотичне, частота дихання - 30/хв., пульс - 130/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст.; на відстані чути клекочучі вологі хрипи. Яке втручання необхідно виконати в першу чергу?

- A. *Надати напівсидяче положення
- B. Дати відхаркувальні засоби
- C. Покласти горизонтально
- D. Провести інгаляцію бронхолітиками
- E. Дати заспокійливі засоби

29. У дітей, які страждають на холецистит, визначають наступні симптоми:

- A. *Позитивні симптоми Ортнера та Кера
- B. Позитивний симптом Василенка та Куча
- C. Позитивний симптом Мейо-Робсона та Спіжарного
- D. Позитивний симптом Воскресенського та Сітковського
- E. Позитивний симптом Образцова та Ровзинга

30. Старша медична сестра терапевтичного відділення, готує доповідь на наукову конференцію. Тема доповіді: «Контроль - як функція управління». Дайте визначення поняттю «контроль»:

- A. *Це управлінська функція й управлінська операція, за допомогою яких здійснюють зіставлення того, що повинно бути, з тим, що є фактично
- B. Це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які зумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин
- C. Це процес вибору цілей для організації і прийняття рішень щодо найкращого способу їх досягнення
- D. Це регулярний і систематизований збір інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну та якісну сторони діяльності організації
- E. Це процес, за допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано та організовано

31. В ендокринологічне відділення бригадою швидкої медичної допомоги доставлено семирічну дитину, у якої в анамнезі цукровий діабет, свідомість відсутня, шкіра блідо-рожева, волога, відзначається тризм щелеп, посмикування м'язів кінцівок, запах ацетону відсутній. Який стан можна припустити?

- A. *Гіпоглікемічну кому
- B. Ниркову кому
- C. Гіперглікемічну кому
- D. Церебральну ком
- E. Печінкову кому

- 32.** На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну становить 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - А (II) III (+), у матері - кров групи 0(1)III (+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?
- A. *Гемолітична хвороба новонароджених за системою ABO
 - B. Кон'югаційна жовтяниця
 - C. Атрезія жовчовивідних протоків
 - D. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором
 - E. Вроджений гепатит
- 33.** При проведенні патронажу дитини 5-ти років медсестра виявила наступні проблеми: млявість, незначний нежить та кашель. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на незміненому фоні шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях, збільшення потиличних, задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Краснуха
 - B. Скарлатина
 - C. Кір
 - D. Геморагічний васкуліт
 - E. Атопічний дерматит
- 34.** У пацієнта при копрологічному дослідженні випорожнень було виявлено наявність стеатореї, креатореї, амілореї. Отримані результати свідчать про:
- A. *Екзокринну недостатність підшлункової залози
 - B. Підвищення секреції шлунка
 - C. Наявність кишкового дисбіозу
 - D. Нормальний результат копрологічного дослідження
 - E. Ендокринну недостатність підшлункової залози
- 35.** Пацієнт скаржиться на постійний біль в епігастрії, загальну слабкість, відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Який метод обстеження є найінформативнішим у диференціальній діагностиці виразкової хвороби та раку шлунка?
- A. *Гістродуоденоскопія з біопсією
 - B. Цитологічне дослідження промивних вод шлунка
 - C. Рентгенологічне обстеження
 - D. Дослідження шлункової секреції з гістаміном
 - E. Дослідження калу на приховану кров
- 36.** Новонародженій дитині, яка перебуває у відділенні патології новонароджених з діагнозом вродженої пневмонії, внутрішньовенно 2 рази на добу вводиться антибіотик пеніцилінового ряду, захищений клавулановою кислотою, а саме:
- A. *Амоксиклав
 - B. Ампіокс
 - C. Амікацин
 - D. Ампіцилін
 - E. Амоксицилін
- 37.** У хворого 37-ми років скарги на біль у грудній клітці, який посилюється під час дихання, кашлю, нахилу тулуба у здоровий бік, та на непродуктивний кашель із посиленням під час рухів. Рухомість грудної клітки обмежена з ураженого боку. При аускультативній легенів - шум тертя плеври. Яку патологію можна припустити у пацієнта?
- A. *Сухий плеврит
 - B. Гострий бронхіт
 - C. Бронхоектатична хвороба
 - D. Хронічний бронхіт
 - E. Стенозуючий ларингіт

- 38.** Дитині 2 роки. Протягом останніх днів відзначались катаральні явища, головний біль, сіпання м'язів, млявість, потім з'явився біль в хребті, рідкі випорожнення. На шостий день захворювання знову підвищилася температура тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$, з'явився параліч нижніх кінцівок. В анамнезі при народженні пологова травма, профілактичні щеплення не проводились. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Поліомієліт
 - B. Шигельоз
 - C. Менінгококова інфекція
 - D. Ротавірусна інфекція
 - E. Внутрішньомозкова травма
- 39.** Дитині 7 днів, народилась масою 4200 г, довжина тіла 59 см. Пологи стрімкі, в потиличному передлежанні. В ділянці потиличної кістки пальпується пухлина м'якої консистенції, обмежена цією кісткою, не болюча. При пальпації підчутно флюктуацію і немовби валик по периферії. Загальний стан не порушений. Про яку пологову травму свідчать дані симптоми?
- A. *Цефалогематома
 - B. Водянка головного мозку
 - C. Запалення головного мозку
 - D. Підшкірний крововилив
 - E. Пологова пухлина
- 40.** Хворий 32-х років з вогнепальним пораненням стегна звернувся по допомогу на прийом до хірурга поліклініки. Скаржиться на наростаючий біль та набряк, пов'язка стала тісною та врізалась в тканини. З рани виділяється геморагічна рідина, при пальпації - крепітація. Який діагноз?
- A. *Газова гангрена
 - B. Абсцес
 - C. Фурункул
 - D. Флегмона
 - E. Правець
- 41.** Медична сестра оглядає потерпілого на місці автопригоди. Він скаржиться на біль в правому підребер'ї. Вкажіть, що має припустити медична сестра, якщо при огляді вона виявила симптом "Іванця-Киванця":
- A. *Розрив селезінки
 - B. Розрив печінки
 - C. Розрив тонкого кишечника
 - D. Розрив шлунка
 - E. Розрив сечового міхура
- 42.** Медична сестра приймального відділення оглядає чоловіка 34-х років, який отримав травму в побуті. При огляді виявлено в середній третині лівого стегна рану 4×2 см, з рваними краями, з якої повільно витікає кров темного кольору. Який метод тимчасової зупинки кровотечі застосує медична сестра?
- A. *Накладання стискальної пов'язки
 - B. Згинання кінцівки в суглобі
 - C. Накладання джгута вище рани
 - D. Накладання джгута нижче рани
 - E. Підняття кінцівки вгору
- 43.** Вивчення динаміки явищ є важливим складником аналізу здоров'я та діяльності системи охорони здоров'я. Назвати, які показники застосовують для аналізу динаміки?
- A. *Темп росту, абсолютний приріст, темп приросту
 - B. Показник співвідношення, наочності, інтенсивності
 - C. Середні величини, відносні величини
 - D. Відносні величини, абсолютні величини

Е. Мода, медіана, частота, амплітуда

44. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на виробництві "якісних" електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тону, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- А. *Марганець
- В. Карбофос
- С. Бензол
- Д. Тетраетил свинець
- Е. Дихлоретан

45. У приймальне відділення ЦРЛ доставили потерпілого 30-ти років після дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілий у непритомному стані, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 97/хв., із носа і вух витікає рідина червоного кольору. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- А. *Перелом основи черепа
- В. Перелом лицевої частини черепа
- С. Перелом склепіння черепа
- Д. Субдуральна гематома
- Е. Струс мозку

46. Назвіть симптом, який характерний для латентної форми спазмофілії і проявляється короткочасною зупинкою дихання внаслідок больового подразнення голкою:

- А. *Симптом Маслова
- В. Симптом Пастернацького
- С. Симптом Філатова
- Д. Симптом Керніга
- Е. Симптом Щоткіна-Блюмберга

47. У хірургічне відділення надійшов хворий 35-ти років з діагнозом: гострий апендицит. Операція буде виконуватись під інгаляційним наркозом. Хворий вдома поїв 3 години тому. Як медична сестра у даному випадку повинна готувати шлунково- кишковий тракт пацієнта?

- А. *Відсмоктати шлунковий вміст
- В. Зробити сифонну клізму
- С. Поставити очисну клізму
- Д. Дати проносні засоби
- Е. Зробити премедикацію

48. Між старшою медичною сестрою ендокринологічного відділення та завідувачем зазначеного відділення виникла конфліктна ситуація з приводу розподілу відпусток на наступний рік між співробітниками відділення до Дня медичного працівника. Зазначте тип конфлікту:

- А. *Міжособистий конфлікт
- В. Внутрішньогруповий конфлікт
- С. Безособистісний конфлікт
- Д. Міжгруповий конфлікт
- Е. Внутрішньоособистий конфлікт

49. У потерпілого з колотою раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря зі свистом заходить крізь рану у плевральну порожнину. Хворий скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, наростаючу задиху, запаморочення. При огляді: ціаноз шкіри обличчя та розширення вен ший. Аускультативно: дихання справа не вислуховується. У якому невідкладному втручанні повинна взяти участь медична сестра у даному випадку?

- А. *Проведення плевральної пункції
- В. Інтубація трахеї та штучна вентиляція легень
- С. Проведення вагосимпатичної блокади

- D. Накладання оклюзійної пов'язки на грудну клітку
- E. Проведення міжребрової новокаїнової блокади

50. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A. *Вартість медичних послуг
- B. Співвідношення збуту й цін
- C. Показники повторних купівель
- D. Загальні та відносні витрати
- E. Імовірні стратегії конкурентів

51. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відзначаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Гострий гематогенний остеомієліт
- B. Гострий артрит колінного суглоба
- C. Флегмона правої гомілки
- D. Вивих правого колінного суглоба
- E. Перелом правого колінного суглоба

52. Пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні. Загальний стан вкрай тяжкий, свідомість відсутня. Пульс частий, напружений. АТ- 160/110 мм рт.ст. Під час аускультатії серця - шум тертя перикарда. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. У повітрі запах аміаку. Рівень креатиніну в крові - 1060 мкмоль/л. Для якого стану це характерно?

- A. *Уремична кома
- B. Алкогольна кома
- C. Гіпоглікемічна кома
- D. Аддісоновий криз
- E. Гіперглікемічна кома

53. Впродовж двох тижнів дитину 3-х років турбував сухий кашель, незначні виділення з носа. Стан дитини погіршився, кашель набув спазматичного характеру. Напади кашлю закінчуються блюванням. Запідозрено кашлюк. Критеріями легкої форми захворювання є:

- A. *Частота нападів кашлю - до 15 на добу, репризів до 5
- B. Частота нападів кашлю - 1-2 на добу, репризів немає
- C. Частота нападів кашлю - більше 25 на добу, репризів більше 10
- D. Частота нападів кашлю - до 25 на добу, репризів до 10
- E. Напади закінчуються блюванням, крововиливом в слизові, носові кровотечі

54. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38,2°C, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Тиреотоксикоз
- B. Гіпотиреоз
- C. Гіпертонічна хвороба
- D. –
- E. Інфаркт міокарда

55. Медичне страхування - це система організаційних та фінансових заходів забезпечення охорони здоров'я людей. Що таке медичне страхування з позиції економіки?

- A. *Створення соціального грошового фонду
- B. Організація дослідження ринку медичних послуг
- C. Оплата послуг із резервів промислових підприємств

- D. Ведення пацієнтами тарифної системи оплати за послуги
- E. Систематизація оплати послуг за рахунок держави і людини

56. Пацієнтка 32-х років доставлена в приймальне відділення з нападом ниркової кольки. Взяли сечу на загальний аналіз. Які зміни в сечі найтипівіші для сечокам'яної хвороби у разі ниркової кольки?

- A. *Свіжих еритроцити, кристали солей
- B. Протеїнурія, циліндрурія
- C. Лейкоцитурія, слиз
- D. Вилужені еритроцити, циліндри
- E. Бактеріурія, глюкозурія

57. Горизонтальний розподіл праці передбачає:

- A. *Розділення всієї роботи на складові компоненти
- B. Розподіл роботи серед осіб різного фаху
- C. Розподіл роботи серед аналогічних ланок
- D. Розподіл всієї роботи на однакові процедури
- E. Розподіл роботи серед осіб однакового фаху

58. У дитини 5-ти років важкий стан, шкіра бліда, на ній крововиливи, системне ураження лімфатичних вузлів, збільшення печінки, селезінки, біль у кістках і суглобах.

В аналізі крові - різна кількість незрілих клітин, бластні клітини у лейкоцитарній формулі, гемоглобін - 80 г/л, еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$. Визначте захворювання:

- A. *Лейкоз
- B. Гемофілія
- C. Геморагічний васкуліт
- D. Тромбоцитопенія
- E. Хвороба Верльгофа

59. Дитині 3 роки. Часто хворіє на респіраторні інфекції. Малорухлива. Швидко втомлюється. Об'єктивно: дитина підвищеного живлення, відзначається блідість шкірних покривів, знижений тургор тканин. Дихання через ніс утруднене, дихає ротом. При пальпації відзначаються болючі, не спаяні з навколишніми тканинами лімфовузли. Зів блідий, мигдалики гіпертрофовані, виступають з-за дужок. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. При рентгенологічному обстеженні виявлено збільшення вилочкової залози. Який діагноз є найбільш імовірним?

- A. *Лімфатико-гіпопластичний діатез
- B. Алергічний діатез
- C. Нервово-артритичний діатез
- D. Ексудативно-катаральний діатез
- E. Геморагічний діатез

60. Ви старша медична сестра дитячого дошкільного закладу, де захворіла дитина з підозрою на дизентерію. Протягом якого часу будете спостерігати за дітьми, які були в контакті з хворим?

- A. *7 днів
- B. 9 днів
- C. 14 днів
- D. 21 дня
- E. 10 днів

61. Сімейна медична сестра складає план проведення I ревакцинації проти дифтерії, кашлюку та правця згідно з «Календарем профілактичних щеплень в Україні». Дітей якого віку вона запросить до дитячої поліклініки у кабінет щеплень?

- A. *18 місяців
- B. 3 місяці
- C. 6 місяців

- D. 3 роки
- E. 12 місяців

- 62.** Дитині 5 років. Скарги на біль в горлі, головний біль, нежить, слезоточивість, світлобоязнь, підвищення температури тіла до 39°C, висипання на шкірі. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок має місце плямисто-папульозний висип з тенденцією до зливання на незміненому фоні шкіри. З анамнезу відомо, що висип в перший день з'явився за вухами, потім на обличчі, на другий день на тулубі, кінцівках. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Кір
 - B. Менінгококцемія
 - C. Краснуха
 - D. Скарлатина
 - E. Вітряна віспа
- 63.** У нейрохірургічному відділенні перебуває пацієнт з черепно-мозковою травмою та наростаючим набряком мозку. Що буде запропоноване лікарем для лікування цього ускладнення?
- A. *Дегідратаційну терапію
 - B. Баротерапію
 - C. Фізіотерапію
 - D. Оксигенотерапію
 - E. Механотерапію
- 64.** Дитині 8 років. Протягом останнього тижня мали місце симптоми гострого циститу. Мати за медичною допомогою не зверталась, проводила дитині зігрівальні ванни. Вчора дитина поскаржилася на загальну слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до 38,9° C, біль попереку, сеча стала каламутна з пластівцями та осадом. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Пієлонефрит
 - B. Цистит
 - C. Гломерулонефрит
 - D. Сечокислий інфаркт нирок
 - E. Сечокам'яна хвороба
- 65.** Старша медична сестра, отримує готові лікарські засоби з аптеки. Визначте перший етап товарознавчого аналізу готових лікарських засобів (ГЛЗ):
- A. *Перевірка супровідної документації на лікарські засоби
 - B. Перевірка штрих-коду лікарського засобу
 - C. Проведення органолептичного контролю упаковки ліків
 - D. Перевірка відповідності найменувань і кількості лікарських засобів
 - E. Перевірка маркування ГЛЗ
- 66.** У хворого на гострий інфаркт міокарда на ЕКГ реєструється шлуночкова екстрасистоія. Лікування за призначенням лікаря слід почати з введення:
- A. *Лідокаїну гідрохлориду
 - B. Обзидану
 - C. Кордарону
 - D. Новокаїнамідю
 - E. Верапамілу
- 67.** Хворого 39-ти років госпіталізовано в хірургічне відділенні з масивною крововтратою внаслідок шлунково-кишкової кровотечі. Ризик виникнення якого шоку має цей пацієнт?
- A. *Геморагічного
 - B. Цитратного
 - C. Анафілактичного
 - D. Кардіогенного

Е. Гемотрансфузійного

- 68.** Як відомо, матеріали володіють рядом властивостей. Як називається здатність матеріалу набувати нової форми під дією сили і зберігати цю форму після припинення дії сили?
- А. *Пластичність
 - В. Міцність
 - С. Пружність
 - Д. Твердість
 - Е. Втома
- 69.** До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), належить:
- А. *Цироз печінки
 - В. Хронічний гастрит
 - С. Хронічний панкреатит
 - Д. Гіпертонічна хвороба I стадії
 - Е. Нирковокам'яна хвороба
- 70.** Пацієнт 19-ти років скаржиться на біль у правому колінному суглобі. Вважає себе хворим з дитинства, часто відзначає носові кровотечі. Об'єктивно: правий колінний суглоб припухлий, болючий при пальпації. Під час видалення зуба виникла сильна кровотеча. Який препарат введе медсестра пацієнту за призначенням лікаря щоб зупинити кровотечу?
- А. *Антигемофільна плазма
 - В. Еритроцитарна маса
 - С. Тромбоцитарна маса
 - Д. Фізіологічний розчин
 - Е. Поліглокін
- 71.** Медсестра хірургічного відділення здала на стерилізацію перев'язувальний матеріал. Вкажіть температурний режим і тривалість стерилізації перев'язувального матеріалу у паровому стерилізаторі:
- А. *При температурі 120°C, 45 хв.
 - В. При температурі 100°C, 90 хв.
 - С. При температурі 180°C, 20 хв.
 - Д. При температурі 132°C, 10 хв.
 - Е. При температурі 150°C, 20 хв.
- 72.** Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?
- А. *Крепітація
 - В. Шум тертя плеври
 - С. Дрібноміхурцеві хрипи
 - Д. Шум тертя перикарда
 - Е. Плевроперикардальний шум
- 73.** Хворого госпіталізовано в терапевтичне відділення з діагнозом сухого плевриту. Хворого турбує біль у правій половині грудної клітки, посилюється при глибокому вдиху; шум тертя плеври відчувається долонею. Якого положення слід надати пацієнту?
- А. *На правому боці
 - В. На лівому боці
 - С. Напівсидяче
 - Д. На спині
 - Е. На животі

- 74.** Старшій медичній сестрі травматологічного відділення, для підвищення якості медичної допомоги, постійно необхідно здійснювати процес контролю за діяльністю підлеглих. Назвіть правильний порядок етапів цього контролю:
- A. *Визначення стандарту, об'єкту контролю, порівняння стандарту з об'єктом
 - B. Визначення об'єкта контролю, порівняння стандарту з об'єктом, аналіз і висновки
 - C. Визначення об'єкта контролю, аналіз і висновки
 - D. Виявлення недоліків та їх усунення
 - E. Визначення стандарту, аналіз, вживання заходів щодо усунення недоліків
- 75.** У хворого 25-ти років восени з'явився біль в епігастрії, що виникає через 1,5-2 год. після вживання їжі та вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш імовірне?
- A. *Виразкова хвороба 12-палої кишки
 - B. Хронічний панкреатит
 - C. Діафрагмальна кила
 - D. Хронічний холецистит
 - E. Виразкова хвороба шлунка
- 76.** Службові організаційні документи встановлюють конкретні функції, права й обов'язки на певний час. До них НЕ належать:
- A. *Накази
 - B. Правила
 - C. Положення
 - D. Статути
 - E. Інструкції
- 77.** В статистичному відділі обласної клінічної лікарні медична сестра - статист здійснює обчислення захворюваності в хірургічному відділенні за другий квартал. Назвіть медичний документ, за яким медична сестра вивчає показник захворюваності у відділенні:
- A. *Статистична карта вибулого зі стаціонару Ф-066-о
 - B. Листок лікарських призначень Ф-004-о
 - C. Журнал реєстрації амбулаторних хворих Ф-074-о
 - D. Медична карта стаціонарного хворого Ф-003-о
 - E. Статистичний талон Ф-025-о
- 78.** Пацієнт звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки під очима. В сечі - гематурія, протеїнурія. Хворіє десять днів після перенесеної ангіни. Яке лабораторне дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
- A. *Аналіз сечі за Нечипоренком
 - B. Аналіз сечі на глюкозу
 - C. Аналіз сечі на амілазу
 - D. Біохімія крові
 - E. Загальний аналіз крові
- 79.** У пульмонологічне відділення надійшов пацієнт, якому поставили попередній діагноз бронхіальна астма. Яка тріада клінічних ознак може характеризувати дане захворювання?
- A. *Експіраторна задишка, сухі хрипи, скловидне харкотиння
 - B. Задишка, сухий кашель, кровохаркання
 - C. Інспіраторна задишка, клекочуче дихання, вологі хрипи
 - D. Задишка, вологі хрипи, крепітація
 - E. Змішана задишка, кашель, крепітація
- 80.** В приймальне відділення поліклініки звернувся пацієнт 38-ми років з пораненням шкіри та м'яких тканин лівого стегна. З'ясовано, що пацієнт працює лісником, поранився під час проведення земляних робіт. Відомо, що протягом 4-х останніх років пацієнт не отримував

жодних щеплень. Який препарат слід використати для екстреної профілактики правця у даного пацієнта?

- A. *Правцевий анатоксин
- B. Протиправцеву сироватку
- C. АКДС
- D. Протиправцевий імуноглобулін
- E. Правцевий анатоксин та протиправцеву сироватку

81. Під час обстеження пацієнта медсестра- бакалавр провела топографічну перкусію. Що визначають за допомогою даного обстеження?

- A. *Межі органів
- B. Функціональні шуми
- C. Патологічні рефлекси
- D. Флюктуацію
- E. Звуки в симетричних ділянках

82. Головний лікар міської лікарні провів медичну нараду в зв'язку з підвищенням післяопераційної смертності. Було прийнято рішення виявити та проаналізувати причини цього явища. Яку форму керування використав головний лікар?

- A. *Експертну форму
- B. Корпоративну форму
- C. Лінійну форму
- D. Функціональну форму
- E. Колективну форму

83. Старша медична сестра відділення обговорює принципи формування оплати праці медичних працівників. Пояснює молодим спеціалістам, що таке посадовий оклад:

- A. *Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці
- B. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу
- C. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язаних з режимом або умовами праці
- D. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника
- E. Премія за швидкість виконаної роботи

84. Для забезпечення лікувального харчування хворих у відділенні старша медична сестра повинна оформити і відправити до харчоблока лікарні відповідний документ. Вкажіть цей документ:

- A. *Порційна вимога
- B. Звіт про рух хворих за добу
- C. Журнал обліку хворих
- D. Список хворих, яких госпіталізували у відділення протягом доби
- E. Листок лікарських призначень

85. У відділення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надійшли пахучі лікарські засоби. Які особливості їх зберігання необхідно знати?

- A. *Зберігати ізольовано, у герметично закритій тарі, роздільно за найменуваннями
- B. У прохолодному місці, в щільно закупореній тарі з матеріалів, непроникних для водяної пари
- C. В упаковці з полімерної плівки при кімнатній температурі
- D. В сухому приміщенні, у герметично закупореній тарі, залитій парафіном
- E. В промисловій упаковці в захищеному від світла місці

86. Медична сестра обстежує пацієнтку із забрудненою колото-різаною раною правої ступні, в зв'язку з чим була введена протиправцева сироватка. Раптово стан пацієнтки різко погіршився: з'явилися різка слабкість, часте серцебиття, задишка. Об'єктивно: блідість шкіри, холодний піт, частий пульс слабого наповнення 100/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. В зв'язку з чим відбулося різке погіршення стану пацієнтки?

- A. *Гострим анафілактичним шоком
- B. Відстроченим больовим шоком
- C. Гострим геморагічним шоком
- D. Сироватковою хворобою
- E. Гострим інфекційно-токсичним шоком

87. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

- A. *Визначення амілази крові
- B. Аналіз калу на приховану кров
- C. Оглядовий знімок черевної порожнини
- D. Зняття ЕКГ
- E. Загальний аналіз крові

88. Головній медсестрі як працівнику приватної медичної установи необхідно визначити економічний прибуток при наданні медичних послуг та медичної допомоги. В чому його відмінність від звичайного прибутку?

- A. *Це максимальний прибуток від реалізації послуг, достатній для розширення бізнесу
- B. Максимальний прибуток від реалізації послуг
- C. Достатній для продовження роботи в даній галузі
- D. Той, що задовольняє керівника медичної установи
- E. Достатній для продовження роботи в даній галузі, але замалий для її розширення

89. Як відомо, товари маркуються різними знаками. Які знаки призначені для інформування про способи поводження з товарами?

- A. *Маніпуляційні знаки
- B. Попереджувальні знаки
- C. Розмірні знаки
- D. Експлуатаційні знаки
- E. Компонентні знаки

90. За обов'язковістю виконання медичні стандарти бувають:

- A. *Законодавчі
- B. Міжнародні
- C. Локальні
- D. Національні
- E. Регіональні

91. У хворого 42-х років після апендектомії в ранньому післяопераційному періоді виникли нудота, блювання. Який препарат використовують для зняття цих симптомів?

- A. *Церукал
- B. Промедол
- C. Атропін
- D. Седуксен
- E. Фенобарбітал

92. До сімейної медичної сестри звернулася мати з дитиною 4-х років. Зі слів матері дитина хворіє другий день. Температура тіла - 38,5°C. При огляді медсестра виявили наступні проблеми: гіперемована шкіра обличчя, блідість носо-губного трикутника, біль у горлі, яскрава гіперемія носогорла, мигдаликів, гній в лакунах, зниження апетиту, порушення сну. На помірно гієремований шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Скарлатина
- B. Менінгококова інфекція
- C. Вітряна віспа

- D. Кір
- E. Краснуха

93. Старша медична сестра хірургічного відділення проводить інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у відділенні. Як часто вона повинна стежити за його виконанням?

- A. *Кожен день
- B. Через день
- C. Один раз на місяць
- D. Один раз на тиждень
- E. Один раз на три дні

94. До медсестри звернувся чоловік, у якого після напруження раптово виник різкий біль в лівій пахвинній ділянці. При огляді медсестра виявила в пахвинній ділянці випинання розміром 2-3 см, різко болюче, щільної консистенції. Вправити випинання не вдалося. Яку першочергову допомогу надасть медсестра хворому?

- A. *Холод на нижню частину живота, викликати швидку допомогу
- B. Ввести спазмолітичні засоби, викликати швидку допомогу
- C. Ввести знеболювальні засоби, холод на нижню частину живота
- D. Холод на нижню частину живота, знеболити; термінова госпіталізація
- E. Ввести спазмолітичні засоби, грілка на нижню частину живота

95. Вкажіть, що з перерахованого є найбільш характерним симптомом здавлення головного мозку при внутрішньо-мозковій кровотечі:

- A. *''Світлий проміжок''
- B. Кровотеча з носа та вух
- C. Короткочасна втрата свідомості
- D. Диплопія (двоїння в очах)
- E. Розлад дихання

96. Силікоз є найрозповсюдженішою формою пневмоконіозів із важким перебігом. Виникає від вдихання пилу кремнезему, що містить *БЮ-1* у вільному стані. Які скарги може виявити медична сестра на I етапі медсестринського процесу?

- A. *Задишка, біль у грудній клітці, кашель
- B. Загальна слабкість, тремор кінцівок, біль у суглобах
- C. Біль в животі, нудота, блювання
- D. Задишка, біль у серці, шум у вухах
- E. Загальна слабкість, втрата апетиту, біль у грудній клітці

97. У приймальному відділенні ЦРЛ під час обстеження хворого з підозрою на гострий перитоніт лікар відзначає посилення болю під час повільного натискання кистю правої руки на передню черевну стінку протягом 2-3 секунд з наступним різким відведенням руки. Це є позитивний симптом:

- A. *Щоткіна-Блюмберга
- B. Грекова-Ортнера
- C. Ровзінга
- D. Мюссі-Георгієвського
- E. Образцова

98. До медичної сестри звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на появу щільного набряку на обличчі, шії, верхній половині тулуба без свербежу, головний біль, загальну слабкість, сльозотечу, утруднене дихання. Характерні ознаки з'явилися протягом останніх 2-х годин після вживання полуниці. Об'єктивно: пульс - 72/хв., ритмічний, АТ- 120/80 мм рт.ст. Для якої патології характерні вказані симптоми?

- A. *Набряк Квінке
- B. Анафілактичний шок

- C. Сироваткова хвороба
- D. Кропив'янка
- E. Бронхіальна астма

99. Хворий 27-ми років був збитий автомобілем і отримав перелом правого стегна. Прибула швидка допомога. Виберіть, що слід використати потерпілому з метою надання невідкладної допомоги:

- A. *Шину Дітерікса
- B. Шину Крамера
- C. Шину Еланського
- D. Шину Башмакова
- E. Шину Белера

100. Медична сестра запідозрила в дитини 2-х місяців пілоростеноз. Які з перерахованих нижче симптомів навели її на цю думку?

- A. *Блювання "фонтаном"
- B. Пронози
- C. Повільне збільшення маси тіла
- D. Блювання за об'ємом, меншим від кількості спожитої їжі
- E. Блювання після народження

101. У працівника фарбового заводу неприємний смак в роті, переймоподібний біль в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Об'єктивно: шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів - смужка сірувато-бузкового кольору. Лабораторно виявлено: в крові - анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубину; в сечі - підвищений вміст порфірину. Яке можливе отруєння?

- A. *Хронічне отруєння свинцем
- B. Хронічне отруєння марганцем
- C. Хронічне отруєння бензолом
- D. Хронічне отруєння ртуттю
- E. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем

102. У хлопчика 10-ти місяців під час крику з'явилось шумне дихання, ціаноз шкіри, холодний піт, настала короткочасна зупинка дихання, тонічні судоми в руках і ногах. Через декілька хвилин хлопчик знов став активним. При огляді виявлені ознаки рахіту, температура тіла - 36,6°C. Який препарат необхідно призначити в першу чергу після нападу?

- A. *Глюконат кальцію
- B. Вітамін B
- C. Вітамін C
- D. Оксидутират натрію
- E. Фінлепсин

103. Хлопчик 12 років. Хворіє 2-й день. За 3 тижні до даного захворювання перехворів на респіраторну інфекцію. Госпіталізований з вираженою геморагічною висипкою на шкірі розгинальних поверхонь верхніх і нижніх кінцівок, сідницях. Висипка симетрична, має тенденцію до злиття. Температура тіла - 37,8°C. Спостерігається набряк і болючість великих суглобів, летючий біль у суглобах. В аналізі крові помірний лейкоцитоз, анемія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. *Геморагічний васкуліт
- B. Алергічний дерматит
- C. Ревматизм
- D. Гемофілія
- E. Менінгококцемія

104. Пацієнт 27-ми років надійшов до приймального відділення. З анамнезу відомо, що 7 днів тому під час роботи на городі пошкодив сапою ногу. По допомогу не звертався. Об'єктивно: стан

хворого важкий, визначається тризм, ригідність потиличних м'язів. В яке відділення повинна транспортувати пацієнта медична сестра для подальшого лікування?

- A. *Реанімаційне
- B. Хірургічне
- C. Інфекційне
- D. Терапевтичне
- E. Неврологічне

105. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- A. *Постнеонатальна смертність
- B. Неонатальна смертність
- C. Перинатальна смертність
- D. Загальний показник смертності
- E. Рання неонатальна смертність

106. Якщо на органопрепаратах немає вказівок на етикетці або інструкції щодо зберігання, то їх слід зберігати при температурі:

- A. *0-5 градусів
- B. 18-22 градуси
- C. 0 градусів
- D. 10-14 градусів
- E. 23-25 градусів

107. Медична сестра-бакалавр приймального відділення проводить пацієнту електрокардіографічне дослідження серця. Який активний електрод слід поставити у п'ятому міжребровому проміжку зліва по середній паховій лінії?

- A. *У5
- B. У3
- C. У2
- D. У4
- E. У6

108. Пацієнт 49-ти років доставлений в хірургічне відділення з різаною раною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що необхідно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

- A. *Сироватку пацієнта та еритроцити донора
- B. Еритроцити пацієнта і розчин желатину
- C. Сироватку пацієнта і сироватку донора
- D. Сироватку пацієнта і розчин поліглюкіну
- E. Еритроцити пацієнта і сироватку донора

109. Захворюваність харчовими токсикоінфекціями серед населення міста в 2019 році (по місяцях року): січень - 3, квітень - 3, липень -10, жовтень - 4, лютий - 2, травень - 4, серпень -12, листопад - 2, березень - 2, червень - 6, вересень -11, грудень -1. Лікар дав завдання медичній сестрі графічно зобразити сезонність харчової токсикоінфекції. Який вид графіка слід використати?

- A. *Радіальна діаграма
- B. Стовпчикова діаграма
- C. Картограма
- D. Лінійна діаграма
- E. Картодіаграма

110. Медична сестра-бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Який з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

- A. *Симптом Труссо

- В. Симптом Мебіуса
- С. Симптом Ортнера
- Д. Симптом Галанта
- Е. Симптом Грефе

111. Пацієнт під час введення розчину анальгіну раптово відчув жар, різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: стан тяжкий, шкіра бліда, ЧДР- 28/хв., ЧСС- 100/хв., АТ- 70/20 мм рт.ст. Який препарат слід ввести пацієнту в першу чергу?

- А. *Адреналін
- В. Дофамін
- С. Кордіамін
- Д. Димедрол
- Е. Супрастин

112. Пацієнт 75-ти років послизнувся на сходах і впав на лівий бік. Скаржиться на різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформацію в ділянці ключиці. Медсестра надає першу допомогу. Якою пов'язкою вона виконає іммобілізацію?

- А. *Хрестоподібною
- В. Зворотньою
- С. Вельпо
- Д. Колосовидною
- Е. Черепащачою

113. Вкажіть, будь ласка, що є основним завданням ціноутворення:

- А. *Покриття витрат виробництво продукції і одержання прибутку
- В. Визначення балансу попиту і пропозиції
- С. Визначення мінімальної ціни пропозиції
- Д. Визначення максимальної ціни попиту
- Е. Покриття витрат виробництва

114. Якими основними якостями повинна володіти медична сестра для забезпечення її діяльності в ролі успішного менеджера?

- А. *Професійно-діловими, адміністративно-організаційними, соціально-психологічними, моральними
- В. Адміністративно-діловими, моральними, організаційними
- С. Професійно-стратегічними, прогностичними, моральними, соціально-психологічними
- Д. Професійно-діловими, гуманістичними, духовними
- Е. Професійно-діловими, духовними, управлінсько-лідерськими

115. Медсестру викликали до пацієнтки, яка знепритомніла. У неї дихання Куссмауля, різкий запах ацетону з рота, шкіра суха, тургор її знижений, очні яблука м'які. Печінка при пальпації болюча і щільна. Пульс - 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнткою?

- А. *Кетоацидотична кома
- В. Мозкова кома
- С. Гіпоглікемічна кома
- Д. Гіперосмолярна кома
- Е. Уремична кома

116. В приймальне відділення надійшла пацієнтка 42-х років зі скаргами на різкий біль в животі та поперековій ділянці зліва, часте сечовипускання, невеликими порціями. Біль з'явився раптово, раніше відзначались подібні напади. При огляді: шкіра блідого кольору, вкрита холодним потом. Живіт м'який при пальпації, здутий, позитивний симптом Пастернацького. В сечі виявлені свіжі еритроцити в значній кількості. Поставте попередній діагноз:

- А. *Сечокам'яна хвороба
- В. Гострий панкреатит
- С. Травма нирок

- D. Пієлонефрит
- E. Гломерулонефрит

117. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Везикулопустульоз
- B. Герпес-інфекція
- C. Фурункульоз
- D. Псевдофурункульоз
- E. Пухирчатка новонароджених

118. В ендокринологічному відділенні лікується пацієнт із захворюванням щитоподібної залози. Які з перерахованих нижче ознак можуть характеризувати мікседему?

- A. *Загальмованість, мерзлякуватість
- B. Дратівливість, відчуття жару, схуднення
- C. Тахікардія, болючість при пальпації щитоподібної залози
- D. Тремор кінцівок, екзофтальм
- E. Збільшення щитоподібної залози, захриплість голосу

119. Медсестру викликали в приймальне відділення, щоб вона допомогла приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A. *36%
- B. 56%
- C. 25%
- D. 18%
- E. 42%

120. Головний лікар ЦРЛ попередив головну медичну сестру про проведення перевірки усіх відділень лікарні щодо дотримання на робочих місцях наступних вимог: освітлення, температурного режиму, вологості та інших чинників середовища, що впливають на здоров'я та працездатність працівників. Зазначте дані вимоги до робочого місця працівників:

- A. *Гігієнічні вимоги
- B. Інформаційні вимоги
- C. Економічні вимоги
- D. Естетичні вимоги
- E. Організаційні вимоги

121. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A. *Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- C. Нової теми досліджень
- D. Регламенту
- E. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

122. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту спостерігається повне порушення функції мови, слуху, втрата пам'яті та параліч нижніх кінцівок. Він був направлений до спеціалізованого лікувального закладу для отримання комплексної медико-соціальної та психологічної допомоги. Який вид допомоги необхідно обрати для даного пацієнта?

- A. *Паліативно-хоспісна допомога
- B. Диспансерна допомога
- C. Амбулаторно-поліклінічна допомога

- D. Стационарна допомога
- E. Медико-санітарна допомога

123. У приймальне відділення був доставлений чоловік 37-ми років з діагнозом гіпоглікемічна кома. Виберіть, з якого з наведених заходів необхідно починати невідкладну допомогу при гіпоглікемічній комі:

- A. *Внутрішньовенне струминне введення 40% р-ну глюкози
- B. Внутрішньовенне струминне введення інсуліну
- C. Внутрішньовенне краплинне введення 10% р-ну глюкози
- D. Внутрішньовенне струминне введення 5 % р-ну глюкози
- E. Внутрішньовенне краплинне введення 5% р-ну глюкози

124. В дитячу лікарню машиною швидкої допомоги доставлена п'ятирічна дитина. Зі слів матері, захворювання почалося раптово вночі зі значного погіршення загального стану. Дитина стала неспокійна, плаче, температура тіла підвищилась до 38,0°C, з'явився гавкаючий кашель, дихання стало глибоким і частим, його чути на відстані, голос хриплий, сиплий. Який невідкладний стан можна припустити?

- A. *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- B. Астматичний стан
- C. Гострий бронхіт
- D. Пневмонія
- E. Ангіна

125. Головна медична сестра районної лікарні проводить лекцію на тему: «Маркетинг у системі охорони здоров'я». Які основні функції виконує маркетинг?

- A. *Аналітична, виробнича, збутова, управлінська
- B. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- C. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- D. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- E. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

126. У приймальне відділення бригада швидкої медичної допомоги доставила хворого 37-ми років з діагнозом отруєння миш'яковмісними сполуками. Виберіть комплекс антидотної терапії у разі даної інтоксикації:

- A. *Унітіол, тетацін кальцію
- B. Унітіол, хлорид кальцію
- C. Тетацін кальцію, адреналін
- D. Адреналін, дипіроксим
- E. Баралгін, дипіроксим

127. Медична сестра працює в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) x 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- A. *Поширеність захворювань
- B. Інфекційна захворюваність
- C. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- D. Госпітальна захворюваність
- E. Первинна захворюваність

128. На третю добу післяопераційного періоду у пацієнта 72-х років раптово виник біль за грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, задишка, тахікардія. Шийні вени набрякли. Який стан можна припустити?

- A. *Тромбоемболію легеневої артерії
- B. Набряк легень
- C. Кардіогенний шок
- D. Інфаркт міокарда

Е. Гіпертонічний криз

- 129.** Мешканка Закарпатської області скаржиться на відчуття тиснення в ділянці шиї, загальну слабкість, зниження працездатності, утруднене ковтання, захриплість голосу, стовщення шиї. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?
- А. *Ендемічного зобу
 - В. Аутоімунного тиреоїдиту
 - С. Гіпотиреозу
 - Д. Раку щитоподібної залози
 - Е. Дифузного токсичного зобу
- 130.** Вранці при огляді дітей в дитячому садочку медична сестра виявила у 5- річної дитини підвищену температуру тіла - $37,5^{\circ}\text{C}$, круглої форми та різної величини папульозно-везикульозний висип на волосистій частині голови та тілі. Яке захворювання можна припустити?
- А. *Вітряну віспу
 - В. Трихофітію
 - С. Кір
 - Д. Скарлатину
 - Е. Краснуху
- 131.** Забійник із профстажем 14 років (75% робочого часу працює відбійним молотком) має скарги на відчуття холоду, слабкість, біль і оніміння кистей, біль в ліктьових і променево-зап'ястних суглобах, в шийному відділі хребта, поганий сон, періодичний ниючий біль в ділянці серця. Розвиток якого захворювання можна припустити на підставі скарг хворого?
- А. *Вібраційну хворобу
 - В. Остеохондроз хребта
 - С. Остеоартроз ліктьових суглобів
 - Д. Неврит ліктьового нерва
 - Е. Реактивний поліартрит
- 132.** Які вироби медичного призначення слід зберігати в сухих закритих приміщеннях на відстані не менш 1 м від опалювальних приладів?
- А. *Вироби із пластичних мас
 - В. Вироби із кераміки
 - С. Вироби із металу
 - Д. Вироби із кераміки і скла
 - Е. Вироби із скла
- 133.** В дитячу поліклініку прийшла мати з 5- річною дитиною для проведення антропометрії. За якою формулою перевіряється маса тіла дитини?
- А. $*10+(2xп)$
 - В. $30+5(п - 1)$
 - С. $20+(п - 10)$
 - Д. $20+(4 \times п)$
 - Е. $30+4(п - 1)$
- 134.** Медична сестра палати новонароджених пологового будинку обстежила здорову новонароджену дитину віком 1 день та підрахувала частоту серцевих скорочень. Якою вона має бути приблизно?
- А. *140 за хвилину
 - В. 80 за хвилину
 - С. 120 за хвилину
 - Д. 100 за хвилину
 - Е. 180 за хвилину
- 135.** Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні.

Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Суха гангрена
- B. Термічний опік IV ст.
- C. Хімічний опік III ст.
- D. Волога гангрена
- E. Хімічний опік II ст.

136. У приймальне відділення звернулася хвора 38-ми років зі скаргами на біль у верхній половині живота, багаторазове блювання. Біль з'явився після прийому смаженого бекону. Об'єктивно: ЧСС- 102/хв., пальпаторно спостерігається напруження м'язів та біль в правому підребер'ї, який віддає в праву лопатку. Живіт здутий, тяжкість під правим ребром, гіркий присмак у роті. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. *Гострий холецистит
- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий перитоніт
- D. Гострий апендицит
- E. Мезентеріальний тромбоз

137. До приймального відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібний інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A. *УЗД органів черевної порожнини
- B. Кров на визначення рівня холестерину
- C. Кров на діастазу
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

138. Хворий 33-х років, який працює на лікєро-горілчаному заводі у лабораторії, надійшов у приймальне відділення з такими симптомами: порушення мови, ходи, пам'яті. При огляді: шкіра бліда, із синюшним відтінком, на дотик холодна, липка, волога. Що розвинулося у хворого?

- A. *Отруєння етиловим спиртом
- B. Отруєння парами ртуті
- C. Бензолова інтоксикація
- D. Астено-невротичний синдром
- E. Отруєння свинцем

139. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми «Ринок медичних послуг». Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- A. *Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька
- B. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька
- C. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- D. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- E. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська

140. При проведенні пальпації перикардіальної ділянки медична сестра виявила наявність «серцевого горба» та зміщення верхівкового поштовху вліво. Такі ознаки можуть вказувати на:

- A. *Гіпертрофію лівих відділів серця
- B. Перикардит
- C. Аортальний стеноз
- D. Гострий міокардит
- E. Недостатність мітрального клапану

141. Пацієнт 45-ти років перебуває на Лікуванні з приводу варикозно розширених вен нижніх

кінцівок. Під час обіду в їдальні жваво розмовляв. Раптом почав задихатись, схопився руками за шию. Які медсестринські втручання, відповідно до стандартизованого плану догляду за пацієнтом із стороннім тілом в дихальних шляхах, повинна здійснити медична сестра?

- A. *Прийом Геймліха
- B. Трахеостомію
- C. Прекардіальний удар
- D. Потрійний прийом Сафара
- E. ШВЛ "рот до рота"

142. В дитячий стаціонар надійшла дитина у віці 1 рік 2 місяців, з генералізованими судомою та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

- A. *Спазмофілія. Судоми
- B. Спазмофілія, ларингоспазм
- C. Рахіт залишкових явищ
- D. Рахіт, гострий період. Судоми
- E. Гіпервітаміноз B. Судоми

143. Дослідження спрямоване на вивчення здоров'я жінок-робітниць хімічних виробництв України. Який метод спостереження (за повнотою охоплення) доцільно використати в даному випадку?

- A. *Вибірковий
- B. Дробний
- C. Повний
- D. Одночасний
- E. Суцільний

144. Медична сестра працює в центрі медичної статистики. При вивченні захворюваності на грип використовує статистичні талони. Що це за метод вивчення захворюваності?

- A. *Звернення за лікарською допомогою
- B. Спеціальне вибіркове дослідження
- C. Опитування
- D. Медичний огляд окремих груп населення
- E. Амбулаторне дослідження

145. Медсестра-бакалавр працює в центрі медичної статистики. Показники, що відображають питому вагу, структуру, розподіл, склад явища, належать до:

- A. *Показників екстенсивності
- B. Загальних показників
- C. Показників наочності
- D. Показників інтенсивності
- E. Показників співвідношення

146. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

- A. *Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених мийних засобів
- B. Кожного дня вологим способом без застосування мийних засобів
- C. Залежно від забруднення приміщення
- D. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених мийних засобів
- E. Кожного дня із застосуванням пілососу

147. У доношеного хлопчика на початку третьої доби життя з'явилась жовтушність шкіри і слизових. Загальний стан задовільний. Печінка і селезінка не збільшені. Сеча і випорожнення мають звичайний колір. У мами і дитини група крові перша, резус- позитивна. Вміст непрямого білірубіну в сироватці крові -108 мкмоль/л. В сечі відсутні уробілін і жовчні пігменти. Якому

стану відповідають наведені ознаки?

- A. *Фізіологічна жовтяниця
- B. Сепсис
- C. Гепатит А
- D. Гемолітична хвороба новонародженого
- E. Гепатит В

148. Медсестра протитуберкульозного диспансеру проводить профілактику туберкульозу. Що передбачає специфічна профілактика?

- A. *Вакцинація, ревакцинація, хіміопротифілактика
- B. Обстеження контактних осіб в осередках туберкульозної інфекції
- C. Флюорографічне обстеження населення
- D. Санітарно-просвітня робота
- E. Ветеринарний нагляд за домашніми тваринами

149. Виберіть, що з наведеного є основною відмінністю організації охорони здоров'я від інших типів організацій:

- A. *Складне визначення та вимірювання результатів і невідкладність роботи
- B. Робота в організації не потребує надзвичайно високої спеціалізації
- C. Специфічний споживач
- D. Складність та одноманітність роботи
- E. Низький рівень фінансування

150. Працівники лабораторії з виготовлення вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металічний присмак у роті, кровоточивість ясен, підвищене слиновиділення, сильний біль у животі та інші диспепсичні явища, порушення сну, хитку ходьбу, різке зниження серцевої діяльності. Отруєння якою речовиною викликало зазначені прояви?

- A. *Ртуть
- B. Тетраетилсвинець
- C. Толуол
- D. Марганець
- E. Свинець