

1 За рік в місті народилося 1257 дітей, померло 1863 мешканців міста. Чому дірівнює природний приріст?

- A. *606
- B. 1257
- C. 606
- D. 1863
- E. 3120

2 Пацієнт 50-ти років потрапив у терапевтичне відділення з підозрою на інтоксикацію свинцем. При подальшому обстеженні діагноз підтверджений, виявлено інтоксикація середнього ступеня важкості. Вкажіть препарати, які найбільш доцільно використати для виведення свинцю з організму:

- A. *Тетацин кальцію 10% та пентацин 5 %
- B. Препарати заліза та міді
- C. Препарати заліза та вітаміни групи В
- D. Вітаміни групи В та кобальту
- E. Препарати заліза та 40% розчин глюкози

3 Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрижі. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Хвороба Іщенко-Кушинга
- B. Ревматична хвороба
- C. Акромегалія
- D. Гіпертонічна хвороба
- E. Гіпотиреоз

4 До Вас звернувся працівник аптеки з питанням: "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

- A. *У захищенному від світла і перепадів температури місця, відносній вологості 65%
- B. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні
- C. В темному прохолодному приміщенні
- D. При температурі 23°C та при вологості повітря не менше 50%
- E. Е. В сухому прохолодному приміщенні

5 У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- A. *Тетраду Фалло
- B. Дефект міжпередсердної перегородки
- C. Відкриту аортальну протоку
- D. Дефект міжшлуночкової перегородки
- E. Фіброеластоз міокарда

6 Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження.

дження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A. *Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником
- C. Нової теми досліджень
- D. Регламенту
- E. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я

7 Для якої гострої хірургічної патології характерні: переймоподібний біль у животі, нудота, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів?

- A. *Гостра кишкова непрохідність
- B. Перфоративна виразка шлунка
- C. Гострий панкреатит
- D. Гострий холецистит
- E. Гострий апендицит

8 Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

- A. *Поточна
- B. Попередня
- C. Цільова
- D. Одномоментна
- E. Облікова

9 Дитині 7 років. Скарги на загальну слабкість, підвищення температури до 38,2°C. При огляді виявлено на шкірі дрібно-крапковий висип на гіперемійованому фоні, крім носо-тубного трикутника, язик яскраво малинового кольору, прояви катаральної ангіни. Про яке захворювання можна думати в першу чергу?

- A. *Скарлатина
- B. Червона висипка
- C. Алергічний дерматит
- D. Kip
- E. Крапивниця

10 У пацієнтки 27-ми років після вживання їжі в їдаліні через 2 години виникли слабість, нудота, часте блювання, біль в животі. Об'ективно: язик обкладено білим нальотом, температура - 38°C, з рота неприємний запах, живіт м'який болючий в епігастрії. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?

- A. *Промити шлунок
- B. Направити на Ко-дослідження шлунка
- C. Покласти грілку
- D. Дати знеболюючі засоби
- E. Покласти міхур з льодом

11 Ви головна медична сестра. Для досягнення цілей лікувальної установи Ви здійснююте функції управління. Основні функції управління, це:

- A. *Планування, організація, мотивація, контроль
- B. Планування, організація
- C. Планування, контроль

- D. Організація, мотивація
- E. Організація, контроль

12 Ви старша медична сестра відділення обговорюєте принципи формування оплати праці медичних працівників. Поясніть молодим спеціалістам що таке посадовий оклад:

- A. *Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці
- B. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу
- C. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язані з режимом або умовами праці
- D. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника
- E. Премія за швидкість виконаної роботи

13 Медсестра урологічного відділення пояснює пацієтові, що сечу для дослідження за методом Зимницького пацієнт повинен збирати:

- A. *Кожну порцію через 3 години
- B. Добову кількість сечі
- C. Середню порцію сечі
- D. Вечірню та ранішню порції сечі
- E. Ранішню порцію сечі

14 У хворого 25-ти років восени з'явились болі в епігастрії, що виникають через 1,5- 2 год. після вживання їжі, і вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш ймовірно?

- A. *Виразкова хвороба 12-палої кишки
- B. Виразкова хвороба шлунка
- C. Хронічний холецистит
- D. Діафрагмальна кила
- E. Хронічний панкреатит

15 До медсестри сімейного лікаря звернулась пацієнка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту що виникли після стресової ситуації. Пацієнка збуджена, обличчя гіперемоване, Рз- 94/хв., АТ-190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. *Дибазол
- B. Дицинон
- C. Строфантин
- D. Анальгін
- E. Кофеїн

16 Серед впливу на формування смертності немовлят виділяють декілька факторів, серед яких є якість надання медичної допомоги. Яка допомога впливає на цей показник?

- A. *Акушерсько-гінекологічна та педіатрична
- B. Невідкладна
- C. Швидка
- D. Педіатрична
- E. Акушерсько-гінекологічна

17 В приймальне відділення поступила пацієнта 42-х років, зі скаргами на різкий біль в животі та поперековій ділянці зліва, почащений сечопуск, невеликими порціями. Біль з'явився раптово, раніше відзначались подібні приступи. При огляді: шкіра блідого кольору, вкрита холодним потом. Живіт м'який при пальпації, здутий, позитивний симптом Пастернацького. В сечі виявлені свіжі еритроцити в значній кількості. Поставте попередній діагноз:

- A. *Сечокам'яна хвороба
- B. Травма нирок
- C. Гострий панкреатит
- D. Гломерулонефрит
- E. Піелонефрит

18 Пацієнт 28-ми років перебуває у хірургічному відділенні з приводу вогнепального поранення правої гомілки. Об'ективно: на 3-ю добу після поранення виник розпираючий біль у ділянці рани, швидко нарastaє набряк; з рани виділяються пухирці газу, невелика кількість сукровичної рідини, що має неприємний запах. Вкажіть симптом, який є характерною ознакою для даного захворювання:

- A. *Симптом "лігатури"
- B. Симптом "Троянова-Тренделенбурга"
- C. Симптом "прилиплої п'яти"
- D. Симптом "переміжної кульгавості"
- E. Симптом "Ларрея"

19 У хворого відкритий перелом стегна ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

- A. *Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B. Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- C. Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D. Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- E. Шина, знеболити, джгут, пов'язка

20 Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'ективно: шкіра бліда, набряк повік, АТ- 170/100 мм рт.ст., Р§- 90/хв., тони серця приглушенні, симптом Пастернацького - позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A. *Аналіз сечі за Нечипоренком
- B. Загальний аналіз крові
- C. Аналіз сечі на глюкозу
- D. Аналіз сечі на діастазу
- E. Аналіз сечі за Зимницьким

21 Ви працюєте старшою медичною сестрою терапевтичного відділення міської лікарні №3. Назвіть основний документ, що юридично і фактично підтверджує медикаментозне лікування хворих:

- A. *Листок лікарських призначень
- B. Зошит обліку виконань маніпуляцій
- C. Листок призначень лікарями наркотичних лікувальних засобів
- D. Журнал реєстрації хворих відділення
- E. Вимога накладна

22 Старша медична сестра терапевтичного відділення провела санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів. Для цього вона зібрала хворих у холі, де розповідала про необхідність дотримання особистої гігієни, про зберігання продуктів від родичів, про режим у відділенні. Яку форму та метод санітарно-просвітньої роботи вона використала?

- A. *Форму групову, усний метод
- B. Форму масову, друкований метод
- C. Форму наочну, комбінований метод
- D. Форму комбіновану, наочний метод
- E. Форму індивідуальну, наочний метод

23 Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати по-ранених після пожежі. Потерпілій 28-ми років, отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A. *36%
- B. 56%
- C. 42%
- D. 18%
- E. 25%

24 Старша медсестра зробила зауваження медсестрі маніпуляційного кабінету з приводу неправильного зберігання інсуліну. Запаси інсуліну слід зберігати:

- A. *В холодильнику при температурі від $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$ %
- B. В сейфі для зберігання медикаментів групи А
- C. В холодильнику при температурі від $+0^{\circ}\text{C}$ до $+2^{\circ}\text{C}$
- D. В шафі для медикаментів на верхній полиці
- E. В холодильнику при температурі від -5°C до -8°C

25 На обліку в жіночій консультації знаходяться жінки, яких поставлено на облік у різні терміни вагітності - до 3-х місяців - 45%, до 5 місяців - 40%, а 15% - до 8 місяців вагітності. Який відсоток жінок поставлено на облік своєчасно?

- A. *45%
- B. 40%
- C. 55%
- D. 15%
- E. 85%

26 Ви працюєте медичною сестрою в медико-санітарній частині заводу. Які заходи Вам необхідно здійснити для проведення профілактичних медичних оглядів працюючих?

- A. *Скласти список працюючих, які підлягають медичному огляду та забезпечити їх явку
- B. Попередити виникнення нещасних випадків
- C. Виявити ранні ознаки впливу виробничих умов і шкідливих факторів на здоров'я
- D. Розробити заходи для попередження нещасних випадків
- E. Розробити заходи по оздоровленню працюючих

27 При виявленні нестачі, зіпсованості, бою медичних товарів, приймальний акт необхідно складати:

- A. *В 3-х примірниках
- B. В 6-х примірниках
- C. В 4-х примірниках
- D. В 2-х примірниках
- E. В 5-х примірниках

28 Першим етапом надання медичної допомоги сільському населенню є сільська лікарська дільниця. Які медичні установи забезпечують надання медичної допомоги на даному організаційному етапі?

- A. *Фельдшерсько-акушерський пункт, дільнична лікарня, лікарська амбулаторія
- B. Дитяча лікарня, центральна районна лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт
- C. Диспансер, обласна лікарня, діагностичний центр
- D. Центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна станція, пологовий будинок
- E. Районна поліклініка, районний диспансер, пологовий будинок

29 До медпункту заводу доставлено потерпілого з венозною кровотечею з нижньої третини передпліччя. Виберіть оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі:

- A. *Накладання стискаючої пов'язки
- B. Накладання судинного шва
- C. Накладання артеріального джгута
- D. Пальцеве перетискання судин
- E. Прошивання судини в рані

30 Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла - 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечопуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелющі помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Сечокислий інфаркт нирок
- B. Гломерулонефрит
- C. Статевий криз
- D. Вульвовагініт
- E. Пієлонефрит

31 Хворий відчув раптовий кінджальний біль в епігастральній ділянці. Блювання не принесло полегшення. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Температура тіла - 36,7°C, АТ- 110/70 мм рт.ст. Рз- 63/хв, при пальпації різка болісність в епігастрії, живіт дошкоподібний. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Проривна виразка шлунка
- B. Гострий апендицит
- C. Гострий панкреатит
- D. Шлунково-кишкова кровотеча
- E. Гострий холецистит

32 У жінки 24-х років після загального переохолодження з'явилися скарги на інтенсивний біль у попереку, підвищення температури тіла до 38,5°C. При огляді симптом Пастернацького позитивний з обох боків. В загальному аналізі сечі: лейкоцитурія, бактеріурія. Який найімовірніший діагноз?

- A. *Гострий пієлонефрит

- В. Гострий гломерулонефрит
- С. Аднексит
- Д. Позаматкова вагітність
- Е. Гострий апендицит

33 Медсестра сімейного лікаря за призначенням надає невідкладну допомогу пацієнту із гіпертонічним кризом. Які препарати будуть найбільш ефективні у даному випадку?

- А. *Клофелін, лазикс
- В. Ізоптин, резерпін
- С. Раунатин, анальгін
- Д. Гепарин, фенігідин
- Е. Седуксен, допегіт

34 Хворий звернувся зі скаргами на кашель з виділенням харкотиння вигляду малинового желе, задишку та біль в правій половині грудної клітки. Під час огляду у пацієнта виявлено: схуднення, бліда шкіра з сірим відтінком, набряк шиї та обличчя, збільшенні надключичні лімфатичні вузли. Яке захворювання слід запідозрити?

- А. *Рак легенів
- В. Пневмонію
- С. Бронхоектатичну хворобу
- Д. Туберкульоз легенів
- Е. Емфізему легенів

35 Старша медична сестра читає у відділенні лекцію на тему: "Саморозвиток та самовдосконалення" Що передбачає саморозвиток?

- А. *Самоосвіту, самооцінку, самоконтроль
- Б. Щоденні вправи за певною програмою
- С. Вказівка вищого начальства
- Д. Усунення особистих недоліків
- Е. Досягнення запланованих показників

36 У хворої виник сильний біль у правій здухвинній ділянці, нудота, одноразове блювання. Температура тіла - 37,5°C, Р§- 100/хв. При пальпації виражений біль та напруження м'язів у правій здухвинній ділянці. Позитивний симптом Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. *Гострий апендицит
- В. Проривна виразка шлунка
- С. Гострий панкреатит
- Д. Кишкова непрохідність
- Е. Гострий холецистит

37 У хірургічному відділенні лікується хворий, якому проведена резекція шлунка у зв'язку зі стенозом воротаря. В чому полягатиме профілактика застійної пневмонії у такого пацієнта?

- А. *Проводити дихальну гімнастику
- Б. Надати сидячого положення
- С. Вводити сечогінні засоби
- Д. Часто провірювати палату
- Е. Дотримуватись суворого ліжкового режиму

38 Робітник-поліграфіст 49-ти років звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру, загальну слабкість, запаморочення та втрату апетиту. Об'єктивно: сіро-зелений відтінок обличчя, сіро-бузкова облямівка на яснах. Зі сторони шлунково-кишкового тракту: постійні кольки в області епігастрію, періодичні закрепи. У крові - ознаки гіпохромної анемії. У сечі - підвищена кількість гематопорфіруну. Яке захворювання у пацієнта?

- A. *Отруєння свинцем
- B. Хронічний ентероколіт
- C. Хронічний гастрит
- D. Вегето-судинна дистонія
- E. Гіпохромна анемія

39 Які основні функції виконує управління організаціями охорони здоров'я?

- A. *Стратегічне планування, організацію, мотивацію, контроль
- B. Планування, облік, контроль
- C. Збір інформації, розробку стратегії, аналіз, контроль
- D. Аналіз, планування, організацію, контроль
- E. Аналіз, прийняття рішення, організацію виховання, контроль

40 Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

- A. *Аналітична, виробнича, збутова, управлінська
- B. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- C. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова
- D. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- E. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова

41 Ви складаєте план проведення I ревакцинації проти дифтерії, кашлюку та правця згідно "Календаря профілактичних щеплень в Україні". Дітей якого віку Ви запросите до дитячої поліклініки у кабінет щеплень?

- A. *18 місяців
- B. 3 місяці
- C. 3 роки
- D. 6 місяців
- E. 12 місяців

42 Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на операції виготовлення «якісних» електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружніх рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тонусу, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- A. *Марганець
- B. Карбофос
- C. Тетраетилсвинець
- D. Дихлоретан
- E. Бензол

43 У дитини 12-ти років скарги на загальну слабкість, температура тіла - $37,5^{\circ}C$, болі в горлі. При огляді зіву мигдалики збільшенні, набряклі, гіперемійовані, з на-

шаруваннями. Яке дослідження дозволить Вам провести диференційну діагностику між ангіною та дифтерією?

- A. *Взяття мазка з зіву та носу на ВЬ
- B. Взяття матеріалу на кишкову групу
- C. Взяття мазку з ротоглотки на паличку Борде-Жангу
- D. Взяття слизу з носової частини глотки на наявність вірусів
- E. Взяття харкотиння на бактеріологічне дослідження

44 Дитина 7-ми років хворіє другу добу, $T = 39,5^{\circ}\text{C}$, скарги на головний біль, слабкість, повторне блювання, біль при ковтанні. Стан важкий. До середини ший спостерігається набряк. Шкіра над зоною набряку не змінена, при натисканні ямка не залишається, набряк має характер желе. На мигдаликах, піднебінні нашарування сірого кольору, які знімаються важко, залишаючи кровоточиву поверхню. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. *Дифтерія мигдаликів, токсична форма
- B. Некротична ангіна
- C. Набряк Квінке
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Лакунарна ангіна

45 У пацієнта, який хворіє на цукровий діабет, після пропущеного прийому їжі поступово з'явились почуття голоду, загальна слабкість, психомоторне збудження, втрата свідомості. АТ- 130/80 мм рт.ст., тахікардія. Яке лабораторне дослідження необхідно провести в першу чергу?

- A. *Визначення вмісту глюкози крові
- B. Загальний аналіз сечі
- C. Печінкові проби
- D. Біохімічний аналіз крові
- E. Загальний аналіз крові

46 Медсестру викликали до пацієнтки, яка знепритомніла. У неї дихання Куссмауля, різкий запах ацетону з рота, шкіра суха, очні яблука м'які. Печінка при пальпації болюча і щільна. Пульс - 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнтою?

- A. *Кетоацидотична кома
- B. Гіперосмолярна кома
- C. Гіпоглікемічна кома
- D. Уремічна кома
- E. Мозкова кома

47 До приймального відділення лікарні була доставлена жінка з ознаками гострої інтоксикації ртуттю. Назвіть речовини, які слід використати у даному випадку як антидоти:

- A. *Унітіол, сукцимер, натрію тіосульфат
- B. Камфора, кофеїн, кордіамін, корглікон
- C. Норадреналін, поліглюкін, мезатон
- D. Тетацин кальцію, пентацин
- E. Строфантин, корглікон

48 Ви медична сестра статистичного відділу лікарні. При складанні статистичного звіту необхідно виділити одиницю обліку тимчасової непрацездатності. Виберіть її:

- A. *Листок непрацездатності

- В. Талон амбулаторного пацієнта
- С. Акт обстеження
- Д. Журнал обліку випадків непрацездатності
- Е. Довідка лікаря

49 Від чого залежить якість надання медичної допомоги?

- A. *Стандартизація медичної допомоги
- В. Фінансування медичного закладу
- С. Медичного обладнання
- Д. Відповіальності медичних працівників
- Е. Наявність типових укомплектованих медичних закладів

50 В приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт без свідомості, шкіра бліда, суха, очні яблука м'які. Дихання зі значними рідкими дихальними рухами, яке супроводжується глибоким шумним вдихом. Цей тип дихання має назву:

- A. *Куссмауля
- В. Біота
- С. Ядуха
- Д. Чейна-Стокса
- Е. Інспіраторна задишка

51 Ви старша медична сестра хірургічного відділення, проводите інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у відділенні. Як часто Ви повинні стежити, за його виконанням?

- A. *Щоденно
- В. Щотижня
- С. Щорічно
- Д. Щомісячно
- Е. Щоквартально

52 Медична сестра хірургічного відділення за власним бажанням переводиться до оперблоку. Назвіть вид інструктажу, який проведе з нею старша медична сестра оперблока:

- A. *Первинний
- В. Позаплановий
- С. Цільовий
- Д. Вступний
- Е. Повторний

53 У хворого порушення серцевого ритму, при якому протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

- A. *Миготлива аритмія
- В. Пароксизмальна тахікардія
- С. Синусова тахікардія
- Д. Синусова аритмія
- Е. Атріовентрикулярна блокада

54 Ви головна медична сестра лікарні. Назвіть фінансовий документ медичного закладу, в якому відображені прибутки і витрати на майбутній фінансовий рік, вказані джерела дохідної частини і статті витрат:

- A. *Кошторис закладу
- B. Пояснювальна записка
- C. Фінансовий звіт
- D. Фінансовий запит
- E. План зростання виробництва

55 Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат лікар призначить ввести хворому?

- A. *Кордіамін
- B. Адреналін
- C. Фенобарбітал
- D. Мезатон
- E. Еуфілін

56 Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на:

- A. *Формування здорового способу життя
- B. Збір статистичних даних про стан здоров'я населення
- C. Оптимізація управління охорони здоров'я
- D. Розробка заходів з охорони довкілля
- E. Надання медичної допомоги на засадах ПМСД

57 З позиції функціонального призначення управлінські рішення можуть бути:

- A. *Організаційними
- B. Колективними
- C. Рекомендаційними
- D. Внутрішніми
- E. Директивними

58 До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофталм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38.2° Г. пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. *Тиреотоксикоз
- B. Стенокардія
- C. Інфаркт міокарда
- D. Гіпотиреоз
- E. Гіпertonічна хвороба

59 Сторож будівельного майданчика отримав виробничу травму внаслідок завалу: бетонний стовпець придавив праву нижню кінцівку. З анамнезу: стиснення кінцівки тривало понад 7 годин. Надаючи невідкладну допомогу, медична сестра провела знеболення. Вкажіть її першочергову дію, яку слід здійснити перед звільненням нижньої кінцівки пацієнта:

- A. *Накласти джгут
- B. Накласти еластичний бінт
- C. Охолодити кінцівку
- D. Провести іммобілізацію
- E. Накласти асептичну пов'язку

- 60** Яку долікарську допомогу слід надати дитині при носовій кровотечі?
- A. *У сидячому положенні нахилити голову уперед, зробити передню тампонаду
 - B. У сидячому положенні нахилити голову назад, зробити передню тампонаду
 - C. У лежачому положенні закапати в ніс розчин перекису водню
 - D. Внутрішньовенне введення розчину амінокапронової кислоти
 - E. У лежачому положенні нахилити голову уперед, зробити передню тампонаду
- 61** У хлопчика 10-ти місяців під час крику з'явилось шумне дихання, ціаноз шкіри, холодний піт, настала короткочасна зупинка дихання, тонічні судоми в руках і ногах. Через декілька хвилин хлопчик знов став активним. При огляді виявлені ознаки рапіту, температура тіла - 36,6°C. Який препарат необхідно призначити в першу чергу після нападу?
- A. *Глюконат кальцію
 - B. Вітамін I
 - C. Вітамін C
 - D. Фінлепсин
 - E. Оксигемоглобін натрію
- 62** При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:
- A. *Вартість медичних послуг
 - B. Загальні та відносні витрати
 - C. Показники повторних купівель
 - D. Співвідношення збуту й цін
 - E. Імовірні стратегії конкурентів
- 63** У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?
- A. *Кожен випадок хвороби серцево- судинної системи, виявлений на медичному огляді
 - B. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
 - C. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
 - D. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням
 - E. Кожен випадок захворювання серцево- судинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- 64** У підлітка 15-ти років, що хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишki, на фоні зникнення болю з'явились холодний липкий піт, блювання, блюватні маси у вигляді "кавової гущі", слабкість, блідість шкіри, тахікардія, зниження артеріального тиску, запаморочення. Який стан найбільш імовірний?
- A. *Шлунково-кишкова кровотеча
 - B. Пенетрація виразки
 - C. Гостра судинна недостатність
 - D. Перфорація виразки
 - E. Шок
- 65** Аналіз фінансового положення медичних установ дозволяє відслідкувати тенденції її розвитку і дати оцінку комерційній діяльності. Зовнішній фінансовий аналіз діяльності установи базується на:
- A. *Офіційній фінансовій звітності установи

- B. Даних податкової інспекції
- C. Показниках дебіторської заборгованості
- D. Рівня рахунку грошових коштів в банках
- E. Величині інвестицій

66 Грошові суми, які відображають рівень повернення затрат медичних закладів за виконання територіальних програм обов'язкового медичного страхування називаються:

- A. *Тарифи на медичні послуги
- B. Державні ціни
- C. Вільні ціни
- D. Ринкові ціни
- E. Договірні ціни

67 У кардіологічне відділення поступив пацієнт з трансмуральним гострим інфарктом міокарда. Стан його різко погіршився, свідомість порушена, шкіра блідо-цианотична, холодна. Пульс на променевих артеріях не знайдено. АТ- 80/50 мм рт.мт., тони серця глухі. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- A. *Кардіогенний шок
- B. Гостра ниркова недостатність
- C. Набряк легенів
- D. Пневмонія
- E. Аритмія

68 Дитина 12-ти років захворіла раптово, підвищилася температура тіла до 38,3°C, з'явилися болі у животі, часті випорожнення, тенезми, випорожнення рідкі, з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається біль у лівій клубовій ділянці. Сигмовидна кишка пальпується у вигляді щільного, болючого тяжу, бурчить. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. *Дизентерія
- B. Аскаридоз
- C. Холера
- D. Сальмонельоз
- E. Вірусна інфекція

69 Як називається вид медичної допомоги, що надається хворим, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах?

- A. *Стаціонарна медична допомога
- B. Амбулаторно-поліклінічна медична допомога
- C. Реабілітаційна медична допомога
- D. Санаторно-курортна медична допомога
- E. Екстрена медична допомога

70 Після закінчення медичного коледжу Ви влаштувались на роботу в хірургічне відділення на посаду операційної медсестри. Вкажіть антисептичний розчин для передопераційної обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна:

- A. *0,5% розчин аміаку
- B. 3% розчин перекису водню
- C. 85% розчин мурашиної кислоти
- D. 1% розчин хлоргексидину біглюконату

E. 5% розчин діоциду

71 Хвора потрапила в приймальне відділення із скаргами на слинотечу, нудоту блювання, біль у животі, слізозоточивість, порушення зору. Ці явища виникли після знищування мух і комарів за допомогою хлорофосу. Черговий лікар поставив діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот необхідно застосувати?

- A. *Атропіну сульфат
- B. Тетацин кальцію
- C. Тіосульфат натрію
- D. Унітіол
- E. Кокарбоксилаза

72 Пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні. Загальний стан вкрай тяжкий, свідомість відсутня. Пульс частий, напружений. АТ- 160/110 мм рт.ст. Під час аускультації серця - шум тертя перикарду. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. У повітрі запах аміаку. Рівень креатиніну в крові - 1060 мкмоль/л. Для якого стану це характерно?

- A. *Уремічна кома
- B. Алкогольна кома
- C. Аддісоновий криз
- D. Гіперглікемічна кома
- E. Гіпоглікемічна кома

73 У відділення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надійшли паучі лікарські засоби. Які особливості їх зберігання необхідно знати?

- A. *Зберігати ізольовано, у герметично за-\ критій тарі, роздільно за найменуваннями
- B. В упаковці з полімерної плівки при кімнатній температурі
- C. В сухому приміщенні, у герметично закупореній тарі, залитій парафіном
- D. В промисловій упаковці в захищеному від світла місці
- E. У прохолодному місці, в щільно закупореній тарі з матеріалів, непроникних для водяної пари

74 До медсестри звернувся пацієнт, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,2-37,5°C, холодний нічний піт, слабкість, погіршення апетиту, постійне покашлювання. Яке лабораторне дослідження є основним у діагностиці туберкульозу?

- A. *Дослідження харкотиння на БК
- B. Аналіз харкотиння на атипові клітини
- C. Загальний аналіз крові
- D. Загальний аналіз харкотиння
- E. -

75 Головні лікарі лікарень ставляться до своїх підлеглих по-різному. Основними типами поведінки керівників за ознакою відносин із підлеглими є:

- A. *Автократичний, демократичний, ліберальний
- B. Демократичний, партократичний, монархічний
- C. Демократичний, ліберальний, анархічний
- D. Анархічний, автократичний, партократичний
- E. Охлократичний, демократичний, ліберальний

76 Головна медична сестра пояснює пацієнту про те, що медичне страхування поділяється за формами. На які форми?

- A. *Обов'язкове та добровільне
- B. Індивідуальне та групове
- C. Безкоштовне та платне
- D. Сімейне та виробниче
- E. Примусове та добровільне

77 У стаціонар доставлений потерпілий 57-ми років із переломом ребер. Яке положення слід надати потерпілому?

- A. *Напівсидяче
- B. На животі
- C. Лежаче
- D. Сидяче
- E. На боці

78 У хворого 29-ти років в ранньому післяопераційному періоді виникла аспірація шлунковим вмістом. Чим небезпечне дане ускладнення?

- A. *Розвитком пневмонії
- B. Розвитком гастриту
- C. Розвитком циститу
- D. Розвитком ангіни
- E. Евентрацією

79 Ви старша медсестра дитячого дошкільного закладу, де захворіла дитина 3-х років на кір. Скільки триватиме в даному випадку карантин?

- A. *21 день
- B. 14 днів
- C. 9 днів
- D. 17 днів
- E. 30 днів

80 Оглядаючи дівчинку без свідомості, лікар виставив діагноз гіпоглікемічної коми. Які симптоми з перерахованих нижче характерні?

- A. *Розвивається гостро, шкіра бліда, "холодний піт, тонус м'язів підвищений, тахікардія
- B. Різка дегідратація, висока осмолярність крові, виражена неврологічна симптоматика
- C. Розвивається поступово; шкіра, слизові сухі, "діабетичний рум'янець"
- D. Дихання глибоке, гучне (Куссмауля); запах ацетону у повітрі
- E. Тонус м'язів, очних яблук, артеріальний тиск знижені

81 Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений, температура тіла - 38,5°C, біль у суглобах, підщелепні лімфатичні вузли збільшенні. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовто-білого кольору обмежені, нашарування які легко віддаляються шпателем. Перераховані симптоми вказують на:

- A. *Лакунарна ангіна
- B. Фолікулярна ангіна
- C. Катаральна ангіна
- D. Дифтерія зіва
- E. Гостра респіраторна вірусна інфекція

82 З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- A. *Спеціальне вибіркове дослідження
- B. Профілактичний
- C. Поточний
- D. Медичний огляд окремих груп
- E. Загальний

83 Робітник 42-х років, що працює на коксохімічному комбінаті, порушив техніку безпеки, ввійшов до замкненого приміщення для зберігання бензолу. Після виходу з приміщення відчув себепогано: з'явилося почуття сп'яніння, сонливість, головний біль, нудота, блювання, слабкість у м'язах, порушення ходи. В медпункті знепритомнів. При проведенні обстеження пацієнта медсестра повинна звернути увагу на шкіру, яка набуває кольору:

- A. *Сіро-синього
- B. Червоного
- C. Землисто-блідого
- D. Алебастрового
- E. Жовтяничного

84 Хвору турбує відчуття розпирання, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, відрижка, нудота, гіркий присmak у ротовій порожнині. При обстеженні живота виявлено позитивні симптоми Кера, Ортнера з правого боку. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Хронічного холециститу
- B. Хронічного коліту
- C. Хронічного гастриту
- D. Хронічного панкреатиту
- E. Пептичної виразки

85 Хворий 32-х років, 12 років працював шліфувальником лопастей на турбінному заводі. Потрапив до профпатолога із скаргами на оніміння, поколювання, відчуття повзання комах, ниючий біль у дистальних відділах рук, підвищена мерзляківськість пальців кистей в спокійному стані, після роботи і вночі. Ці ж прояви з'являються під час охолодження, у разі зміни атмосферного тиску, при виконанні тяжкої фізичної роботи. Після тривалих перерв у роботі неприємні відчуття в руках зникають. Яке професійне захворювання у шліфувальника найбільш вірогідне?

- A. *Вібраційна хвороба
- B. Хвороба Бехтерева
- C. Поліневріт
- D. Остеоартроз
- E. Хвороба Рейно

86 Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- A. *Налоксон
- B. Мезатон
- C. Атропін
- D. Прозерин

E. Адреналін

87 Згідно результатів бактеріологічного обстеження поліклініки, старша медсестра поліклініки прийняла певні рішення щодо посилення протиепідемічного режиму. Якому рівню управління відповідають ці рішення?

- A. *Оперативному
- B. Координаційному
- C. Тактичному
- D. Перспективному
- E. Стратегічному

88 У пацієнта з мітральним стенозом раптово почався кашель з рожевим пінистим харкотинням. Об'єктивно: на обличчі рум'янець з синюшним відтінком губ та кінчика носа. В легенях дихання послаблене, в нижніх відділах вологі хрипи. Частота дихальних рухів - 28/хв. Тони серця глухі, миготлива аритмія, частота серцевих ско-роочень - 120/хв. Пульс - 92/хв., АТ- 105/60 мм рт.ст. Який стан виник у пацієнта?

- A. *Набряк легень
- B. Істерична астма
- C. Серцева астма
- D. Бронхіальна астма
- E. Спонтанний пневмоторакс

89 До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

- A. *Цироз печінки
- B. Хронічний гастрит
- C. Нирковокам'яна хвороба
- D. Хронічний панкреатит
- E. Гіпертонічна хвороба I стадії

90 У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирі мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Везикулопустульоз
- B. Пухирчатка новонароджених
- C. Фурункульоз
- D. Герпес-інфекція
- E. Псевдофурункульоз

91 По обов'язковості виконання медичні стандарти бувають:

- A. *Законодавчі
- B. Міжнародні
- C. Національні
- D. Регіональні
- E. Локальні

92 Ви головна медична сестра ЦРЛ. Проводите заняття на тему "Правець!". З якого віку починають проводити планову імунізацію усьому населенню проти правця?

- A. *3-3 місяців
- B. 3-5 місяців

- C. 3 4 місяців
- D. 3 6 місяців
- E. 3 2 місяців

93 Постраждалий 24-х років, отримав електротравму на виробництві. З чого необхідно розпочати першу невідкладну допомогу?

- A. *Звільнити потерпілого від дії електричного струму
- B. Надання оксигенотерапії
- C. Непрямого масажу серця
- D. Накладання асептичної пов'язки
- E. ШВЛ

94 При вивченні захворюваності на грип використовувались статистичні талони. Що це за метод вивчення захворюваності?

- A. *Звернення за лікарською допомогою
- B. Опитування
- C. Спеціальне вибіркове дослідження
- D. Медичний огляд окремих груп населення
- E. Амбулаторне дослідження

95 Ви працюєте в центрі медичної статистики. Облік всіх захворювань (гострих і хронічних), які зареєстровані у населення певної території за певний період, визначає:

- A. *Загальна захворюваність
- B. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання
- C. Госпітальна захворюваність
- D. Інфекційна захворюваність
- E. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

96 З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

- A. *Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- B. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- C. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "6+"
- D. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"
- E. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"

97 Пацієнт 60-ти років з діагнозом IХС: гострий коронарний синдром. Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабкість AT- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різноваліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів лікар застосує для корекції гемодинаміки?

- A. *Дофамін
- B. Строфантин
- C. Ефедрин
- D. Атропін
- E. Мезатон

98 Пацієнт 52-х років, поступив у приймальне відділення з такими проблемами: сильний біль у ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку,

тривалістю більше 30 хв. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. *Інфаркт міокарда
- B. Остеохондроз
- C. Набряк легень
- D. Пневмонію
- E. Стенокардію

99 У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести внутрішньовенно протисудомний препарат у дозі:

- A. *0,5% сибазон 0,8 мл
- B. 0,5% діазепам 0,2 мл
- C. 0,5% діазепам 2,5 мл
- D. 0,5% сибазон 0,5 мл
- E. 0,5% седуксен 0,5 мл

100 В дитячій поліклініці №2 за звітний період було щеплено 2337 дітей, прочитано 1000 лекцій в навчальних закладах з питань зниження захворюваності, створення сприятливих умов для нормального розвитку та навчання дітей. Який характер носять проведені заходи?

- A. *Первинно-профілактичні
- B. Медичні
- C. Змішані
- D. Амбулаторно-поліклінічні
- E. Лікувально-діагностичні

101 Вкажіть, яким органом проводиться акредитація ЛПЗ:

- A. *Спеціальними акредитаційними комісіями
- B. Облздороввідділом
- C. Виконкомом ради народних депутатів
- D. Міністерством охорони здоров'я
- E. Органами виконавчої влади на місцях

102 Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

- A. *Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів
- B. Кожного дня із застосуванням пилососу
- C. По мірі забруднення приміщення
- D. Кожного дня вологим способом без застосування миючих засобів
- E. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

103 Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

- A. *Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів
- B. Ціна та собівартість медичних послуг
- C. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- D. Собівартість медичних послуг і suma витрат за видатковими статтями кошторису
- E. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

104 Пацієнт 49-ти років доставлений в хірургічне відділення з різаною раною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що необхідно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

- A. *Сироватку пацієнта та еритроцити донора
- B. Еритроцити пацієнта і сироватку донора
- C. Еритроцити пацієнта і розчин желатину
- D. Сироватку пацієнта і сироватку донора
- E. Сироватку пацієнта і розчин поліглюкіну

105 У пацієнта через деякий час після введення цефтриаксону набрякло обличчя, повіки стали тяжкими, перешкоджають відкриванню очей, утруднене дихання. Іу- би збільшилися. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A. *Набряк Квінке
- B. Кропив'янка
- C. Бронхоспазм
- D. Анафілактичний шок
- E. Сироваткова хвороба

106 Медсестра інфекційної лікарні приготувала все необхідне для взяття мазку із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження якого захворювання проводиться дана процедура?

- A. *Кашлюк
- B. Червона висипка
- C. Kip
- D. Скарлатина
- E. Дифтерія

107 Дитині 2 роки. Скарги матері на те, що у дитини мають місце: i° – 38,7°C, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу, блідість, періо- ральний ціаноз. При аускультації ослаблене дихання, дрібноміхурцеві хрипи. Яке захворювання можна запідоzрити?

- A. *Гостра пневмонія
- B. Бронхіальна астма
- C. Гострий ларингіт
- D. Назофарингіт
- E. Гострий бронхіт

108 Медична сестра бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Які з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

- A. *Симптом Трусско
- B. Симптом Мебіуса
- C. Симптом Грефе
- D. Симптом Галанта
- E. Симптом Ортнера

109 До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., Р§- 96/хв. Язык сухий, живіт дошко- подібний. Симптоми подразнення очер-

вини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- A. *Оглядова рентгенографія
- B. Лапароцентез
- C. Іригоскопія
- D. Колоноскопія
- E. УЗД

110 Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилася чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Суха гангрена
- B. Хімічний опік III ст.
- C. Волога гангрена
- D. Хімічний опік II ст.
- E. Термічний опік IV ст.

111 Дільничний педіатр, оглядаючи 5-річну дитину, виставив діагноз кору, катаральний період. Вкажіть який з перерахованих симптомів нижче допоміг у виставленні діагнозу:

- A. *Білі дрібні плями на слизовій щік
- B. Свербіж шкіри
- C. Збільшення задньошийних лімфатичних вузлів
- D. Везикулярний висип на шкірі
- E. Біло-сірі плівки на мигдаликах

112 У дитини, хворої на холецистохолангіт, визначається болючість унаслідок постукування ребром долоні по правій реберній дузі. Такий симптом носить назву:

- A. *Позитивного симптуму Ортнера
- B. Позитивного симптуму Кера
- C. Позитивного симптуму Оппенгейма
- D. Позитивного симптуму Гротта
- E. Позитивного симптуму Мерфі

113 На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну складає 300 мкмоль/л за рахунок непрямої фракції. Група крові дитини - В(ІІ) Юі(+)\ У матері - кров групи 0(1) Ші(+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

- A. *Гемолітична хвороба новонароджених за системою АБО
- B. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором
- C. Вроджений гепатит
- D. Атрезія жовчовивідних протоків
- E. Кон'югаційна жовтяниця

114 Хворий 45-ти років, скаржиться на постійний біль у правій пахвинній ділянці наявність пухлиноподібного утворення, яке не вправляється у черевну порожнину. Утворення уперше виявив 3 роки тому, не турбувало і самостійно втягувалось в черевну порожнину. При пальпації: живіт болючий у нижніх відділах. Симптом ка- шльового поштовху негативний. Яке захворювання у цього хворого?

- A. *Защемлена грижа
- B. Пухлина пахвинної ділянки

- C. Хронічний апендицит
- D. Гострий апендицит
- E. Кишкова непрохідність

115 Дитина 4-х років відвідує дитячий садок. Захворіла на вітряну віспу. Який період ізоляції потребує дитина?

- A. *До 5-ти днів, від появи останніх висипань
- B. 14 днів з моменту захворювання
- C. 3 дні з моменту появи висипань
- D. 21 день
- E. 22 дні

116 При огляді хлопчика 14-ти років спостерігаються: блідість шкіри з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з довгим свистячим видихом. Хрипи чути на відстані. Грудна клітка здута. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми:

- A. *Напад бронхіальної астми
- B. Гострий бронхіт
- C. Крупозна пневмонія
- D. Стафілококова пневмонія
- E. Хронічний бронхіт

117 Пацієнтки 34-х років, звернулась до лікаря зі скаргами на сильний біль у лівш поперековій ділянці, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Об'єктивно: у лівій поперековій ділянці пальпується болючий інфільтрат розміром 3,5x6,5 см. Шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленувато-сірий гній та некротичні маси. Вкажіть діагноз:

- A. *Карбункул
- B. Бешиха
- C. Паранефрит
- D. Флегмона
- E. Гідраденіт

118 При огляді дитини 2-х років Ви виявили, що стан її тяжкий, температура тіла - 39 4° С "зірчасті" геморагічні висипання на сідницях та стегнах. Про яке захворювання слід подумати?

- A. *Менінгококцемія
- B. Поліморфна еритема
- C. Геморагічний васкуліт
- D. Туберкульозний менінгіт
- E. Тромбоцитопенія

119 У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A. *УЗД органів черевної порожнини
- B. Кров на визначення рівня холестерину
- C. Кров на діастазу
- D. Загальний аналіз сечі
- E. Загальний аналіз крові

120 Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Гострий гематогенний остеоміеліт
- B. Вивих правого колінного суглоба
- C. Флегмона правої гомілки
- D. Гострий артрит колінного суглоба
- E. Перелом правого колінного суглоба

121 У дитини 4,5 років скарги на підвищення температури тіла до 38,0°C, млявість, зниження апетиту, появу висипань на тілі. Хворіє 3-й день. Об'єктивно: на шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках, крім долонь та стоп, висипання у вигляді папул, кірочок, везикул (однокамерних, з прозорим вмістом, з пупкоподібним вдавленням), які розміщуються на незміненій шкірі. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

- A. *Вітряну віспу
- B. Натуральну віспу
- C. Краснуху
- D. Скарлатину
- E. Kip

122 Мати 4-річного хлопчика скаржиться на появу у дитини рожевої дрібно папульозної висипки по всьому тілу. Елементи висипки не зливаються. При об'єктивному обстеженні у хлопчика виявлені збільшені підщелепні, задньошийні і потиличні лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними не змінена. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

- A. *Краснуха
- B. Скарлатина
- C. Вітряна віспа
- D. Алергічний дерматит
- E. Kip

123 Ви - медсестра-бакалавр гастроентерологічного відділення, спостерігаєте за пацієнтом з загостренням виразкової хвороби шлунка. До якого найінформативнішого методу дослідження Ви підготуєте пацієнта?

- A. *Фіброгастродуоденоскопія
- B. УЗД органів черевної порожнини
- C. Дуоденальне зондування
- D. Шлункове зондування
- E. Рентгеноскопія шлунка

124 Пацієнта 32-х років з черепно-мозковою травмою доставлено в приймальне відділення лікарні. Під час клінічного обстеження пацієнта Ви встановили: потерпілий непритомний, з зовнішнього слухового проходу та носових ходів повільно витікає рідина рожевого кольору, навколо орбітальні гематоми. Поставте діагноз:

- A. *Перелом основи черепа
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Стиснення мозку
- D. Струс мозку
- E. Внутрішньочерепна гематома

125 При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: (число мертвонароджених + число дітей, які померли в постнатальний період) х 1000 число дітей, які народилися живими і мертвими). Як називається розрахований показник?

- A. *Перинатальна смертність
- B. Мертвонароджуваність
- C. Питома вага дітей, які померли в постнатальний період
- D. Акушерська смертність
- E. Малюкова смертність

126 До медичної сестри школи звернулася 9-річна дитина, із скаргами на млявість, погіршення апетиту, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді, волосся тъмяне, посічене, нігті ламкі. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?

- A. *Залізодефіцитної анемії
- B. Гемолітичної анемії
- C. Апластичної анемії
- D. Гострої лейкемії
- E. Геморагічного васкуліту

127 Пацієнт поступив з кровотечею, яка тривала впродовж 2 днів з різаної рани на долоні. Шкіра бліда. На правій руці пов'язка просякла кров'ю. Колінний та надп'ятково-гомілковий суглоби збільшенні, деформовані, рухи в них обмежені. Аналіз крові: тромбоцити - $320 \cdot 10^9/\text{л}$, тривалість кровотечі за Дуке - 3 хв., час згортання крові - 24 хв. Який діагноз у хворого?

- A. *Гемофілія А
- B. Постгеморагічна анемія
- C. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпуря
- D. Гемолітична анемія
- E. Геморагічний васкуліт

128 В травмпункт доставлений пацієнт 23-х років, який 40 хвилин тому впав на вулиці зі скутера. Об'єктивно: в середній третині лівого стегна набряк, крововилив, патологічна рухливість. Вкажіть абсолютну ознаку перелому:

- A. *Крепітація
- B. Біль
- C. Гіперемія
- D. Пружисті рухи
- E. Вимушене положення кінцівки

129 Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми «Ринок медичних послуг». Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- A. *Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька
- B. Гнформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- C. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- D. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька
- E. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська

130 На чолі організації стоїть керівник. При якому типі управління він здійснює всі функції управління?

- A. *Лінійний тип управління

- B. Матричний тип управління
- C. Лінійно-штабний тип управління
- D. Розгалужений тип управління
- E. Функціональний тип управління

131 Ви працюєте медсестрою в школі. Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас звернувся хлопчик 12-ти років, який скаржиться на підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$, набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. Яке ускладнення розвинулось у дитини?

- A. *Гломерулонефрит
- B. Інфекція сечових шляхів
- C. Цистит
- D. Пухлина нирки
- E. Сечокам'яна хвороба

132 Постраждалий отримав множинні травми. Накладений дренаж за Бюлау. При якій патології він використовується?

- A. *Клапаний пневмоторакс
- B. Защемлена грижа
- C. Черепно-мозкова травма
- D. Розрив печінки
- E. Гострий апендицит

133 У юнака 19-ти років через 2 тижні після ангіни з'явилися летючі болі і припухливість великих суглобів, підвищення температури до 38°C , серцебиття, еритематозні висипання на шкірі. У крові: лейкоцитоз, ШОЕ-30 мм/год. С-реактивний білок «+++». Клінічна картина дозволяє запідозрити:

- A. *Ревматичну хворобу V
- B. Ревматоїдний артрит
- C. Хворобу Рейтера
- D. Бактеріальний артрит
- E. Реактивний артрит

134 У дівчинки 4-х років млявість, не збільшується маса тіла. Шкіра бліда, суха, лущиться, ламкість волосся, нігтів. Періодично тахікардія, задишка. Тони серця глухі, систолічний шум на верхівці серця. Збільшенні печінка та селезінка. Відстає у фізичному розвитку. У загальному аналізі крові знижена кількість гемоглобіну та еритроцитів. Такий стан діагностують при:

- A. *Анемії
- B. Ревматизмі
- C. Лейкозі
- D. Гіпотрофії
- E. Гемофілії

135 При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

- A. *Протеїнурія
- B. Лейкоцитурія
- C. Поява «активних лейкоцитів»
- D. Еритроцитурія
- E. Зрушенні pH сечі в лужну сторону

136 Медична сестра-бакалавр проводить клінічне обстеження постраждалого 30-ти років після падіння з мотоцикла. Постраждалий скаржиться на біль в правій нозі.

Об'єктивно: на передній поверхні гомілки рана з кістковими відламками, кровотеча незначна. Відмічається наявність рухів поза ділянкою суглоба, вимушене положення та деформація кінцівки в зоні ушкодження. Установіть попередній діагноз:

- A. *Відкритий перелом правої гомілки
- B. Рана м'яких тканин правої гомілки
- C. Закритий вивих правої гомілки
- D. Закритий перелом правої гомілки
- E. Відкритий вивих правої гомілки

137 Пацієнт під час введення розчину анальгіну раптово відчув жар, різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: стан тяжкий, шкіра бліда, ЧДР- 28/хв., ЧСС- 100/хв., АТ- 70/20 мм рт.ст. Який препарат слід ввести пацієнту в першу чергу?

- A. *Адреналін
- B. Кордіамін
- C. Димедрол
- D. Супрастин
- E. Дофамін

138 Дитині 8 років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та 8-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

- A. *Сколіоз грудного відділу хребта
- B. Лордоз грудного відділу хребта
- C. Залишкові явища перенесеного рапіту
- D. Хондродистрофію
- E. Кіфоз грудного відділу хребта

139 Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) \times 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- A. *Поширеність захворювань
- B. Госпітальна захворюваність
- C. Інфекційна захворюваність
- D. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- E. Первина захворюваність

140 Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, задишка, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- A. *Анафілактична реакція
- B. Септичний шок
- C. Гемолітична реакція
- D. Пірогенна реакція
- E. Цитратний шок

141 В стаціонарі хворий 36-ти років готується до операції з приводу гострого перитоніту. Який симптом характерний при цьому захворюванні?

- A. *Щоткіна-Блюмберга

- В. Ортнера-Грекова
- С. Роздольського
- Д. Мейо-Робсона
- Е. -

142 Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякло. У верхній третині стегна відчувається крепітация та патологічна рухливість. Рз- 120/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

- A. *Шок II ступеня
- B. Шок I ступеня
- C. Шок IV ступеня
- D. Шок III ступеня
- E. Передагонія

143 Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

- A. *Крепітация
- B. Шум тертя плеври
- C. Шум тертя перикарду
- D. Дрібноміхурцеві хрипи
- E. Плевроперикардіальний шум

144 Медсестра в праві розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта тільки:

- A. *За згодою пацієнта та у випадках передбачених законом
- B. Будь-коли, бо на медсестер правило лікарської таємниці не поширюється
- C. З дозволу лікуючого лікаря
- D. На прохання родичів
- E. За своїми переконаннями

145 Ви старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

- A. *Тарифна система та нормування праці
- B. Посадовий оклад, тарифна ставка
- C. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- D. -
- E. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд

146 В населеному пункті при вивчені смертності серед населення було встановлено, що причиною смерті в 34% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% - новоутворення. Визначте статистичний характер наведених показників:

- A. *Екстенсивні
- B. Співвідношення
- C. Наочності
- D. Інтенсивні
- E. Наочності та співвідношення

147 В хірургічне відділення поступила пацієнта 63-х років зі скаргами на біль і посмикування м'язів в ділянці колотої рани лівої стопи, яку отримала 5 днів тому, коли

випадково наступила на цвях. Вкажіть клінічну ознаку при подальшому обстеженні та прогресуванні захворювання:

- A. *"Сардонічна посмішка"
- B. Симптом Грефе
- C. Гнівний погляд
- D. Обличчя "Гіппократа"
- E. Симптом "окулярів"

148 Кесонна хвороба - захворювання, яке розвивається внаслідок роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску. Основним фактором патогенезу кесонної хвороби є:

- A. *Емболія кровоносних судин
- B. Ангіоспазм
- C. Обструкція бронхів
- D. Зменшення легеневої вентиляції
- E. Тромбоз кровоносних судин

149 Ви працюєте в кабінеті медичної статистики ЛПЗ. Що є одиницею спостереження при вивченні госпітальної захворюваності?

- A. *Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу будь-якого захворювання
- B. Кожний випадок гострого захворювання
- C. Кожний випадок звертання хворого до лікаря з приводу будь-якого захворювання
- D. Кожний випадок захворювання хворого
- E. Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу захворювання з хірургічним втручанням

150 Комунальні заклади охорони здоров'я є формальними організаціями. Назвіть головні риси формальної організації:

- A. *Свідома координація дій двох або більше осіб для досягнення певних результатів
- B. Відсутність єдності в діях її членів
- C. Постійна згода всіх членів організації з будь-якими рішеннями керівника
- D. Постійний твердий тиск на її членів з метою поліпшення якості роботи
- E. Наявність посадових інструкцій і приписів