

- 1.** До сільської амбулаторії звернувся пацієнт, у якого забинтовано кожний палець окремо. Як називається ця пов'язка?
- A. \*«Лицарська рукавичка»
  - B. Повертаюча
  - C. Дезо
  - D. Колова
  - E. Спіральна
- 2.** Пацієнт 34 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на висип, свербіння, печіння, попрілість та біль у ділянці правої гомілки. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки на шкірі з'явився осередок ураження розміром із долоню. Візуально: шкіра гіперемована, межі ураження чіткі, везикуло-пустульозні елементи на периферії осередку ураження. Яке захворювання можна припустити?
- A. \*Екзема
  - B. Атопічний дерматит
  - C. Крапивниця
  - D. Токсикодермія
  - E. Нейродерміт
- 3.** Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:
- A. \*Дезінфекції
  - B. Стерилізації
  - C. Сортуванню
  - D. Утилізації
  - E. Передстерилізаційній обробці
- 4.** Фельдшер сільської амбулаторії проводить обстеження вагітної жінки. Термін вагітності 30 тижнів. Положення плода поздовжнє, II позиція, задній вид, головне передлежання. Де найліпше буде прослуховуватись серцебиття плода в цьому разі?
- A. \*Справа, нижче пупка
  - B. Справа, вище пупка
  - C. Зліва, нижче пупка
  - D. Зліва, вище пупка
  - E. На рівні пупка
- 5.** У пацієнта, який раніше хворів на виразкову хворобу шлунка, під час підняття важких предметів виникли «кинджальний біль» в епігастрії, виражена слаб кість, блювання. Шкірні покриви вкриті холодним липким потом, АТ - 90/50 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні такі ознаки?
- A. \*Перфорація виразки шлунка
  - B. Пенетрація виразки шлунка
  - C. Малігнізація виразки шлунка
  - D. Гострого холециститу
  - E. Гострого панкреатиту
- 6.** Яке захворювання можна припустити, ураховуючи такі показники загального аналізу крові пацієнта: еритроцити -  $1,3 \cdot 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобін - 60 г/л, кольоровий показник - 1,3, лейкоцити -  $4,6 \cdot 10^9/\text{л}$ , тромбоцити -  $180-10^9/\text{л}$ , ШОЕ- 15 мм/год, діаметр еритроцитів - 12 мкм, у мазку крові наявні тільця Жоллі і кільця Кебота?
- A. \* $\text{B}_{12}$ -дефіцитна анемія
  - B. Гострий лейкоз
  - C. Хронічний лімфолейкоз

- D. Апластична анемія
- E. Залізодефіцитна анемія

7. Визначте основну клінічну ознаку, характерну для нападу бронхіальної астми:

- A. \*Задишка з утрудненим видихом
- B. Зупинка дихання
- C. Зупинка серця
- D. Задишка з утрудненим вдихом
- E. Порушення свідомості

8. У дитини 14 років діагностована алкогольна кома. За якою шкалою оцінюється ступінь тяжкості коми?

- A. \*Біазго
- B. Сільвермана
- C. Апгар
- D. Шкаріна
- E. Мазуріна

9. У дитини 5 років лабораторно діагностовано ентеробіоз. Укажіть збудника цього захворювання:

- A. \*Гострик
- B. Аскарида
- C. Бичачий ціп'як
- D. Волосоголовець
- E. Токсокара

10. Дитина 10 років скаржиться на задуху, нападоподібний настирливий кашель, які найчастіше посилюються вночі. Об'єктивно: емфізематозна грудна клітка, під час аускультації - різноналіберні сухі свистячі хрипи. Попередній діагноз - бронхіальна астма. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?

- A. \*Спірометрія
- B. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки
- C. Загальний аналіз крові
- D. Загальний клінічний аналіз мокротиння
- E. Бронхоскопія

11. Під час обстеження вагітної жінки на 38-му тижні вагітності виявлено невідповідність розташування дна матки терміну вагітності; виявлено декілька великих частин і велика кількість дрібних під час пальпації живота; 2 точки ясного вислуховування серцебиття плода. Для якої вагітності це характерно?

- A. \*Багатоплідна
- B. Недоношена
- C. Переношена
- D. Завмерша
- E. Пролонгована

12. У дитини 3 років, яка хворіє ГРВІ, раптово вночі з'явився грубий гавкаючий кашель, інспіраторна задишка, осипливість голосу, дисфагії не спостерігається. Яке ускладнення розвинулось у дитини?

- A. \*Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- B. Справжній круп

- C. Епіглотит
- D. Гострий обструктивний бронхіт
- E. Бронхіальна астма

13. Яку артерію використовують найчастіше для дослідження властивостей пульсу?

- A. \*Променеву
- B. Сонну
- C. Стегнову
- D. Аорту
- E. Скроневу

14. Дитина від доношеної вагітності народилася з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження з'явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін - 100 мкмоль/л. Група крові матері - В (III), Rh (-), дитини - 0 (I), Rh (+). Який діагноз найімовірніший у цьому разі?

- A. \*Гемолітична хвороба новонароджених
- B. Сепсис новонароджених
- C. Фізіологічна жовтяниця
- D. Уроджений гепатит
- E. Атрезія жовчовивідних шляхів

15. Дитина 12 років хворіє на скарлатину протягом 10 діб. Які зміни на шкірі можна виявити на цьому етапі захворювання в місцях попереднього розгашовувння висипу?

- A. \*Лущення
- B. Рубець
- C. Кірочка
- D. Виразка
- E. -

16. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, він зблід і раптово втратив свідомість. Який стан виник у дитини?

- A. \*Непритомність
- B. Гостра серцева недостатність
- C. -
- D. Геморагічний шок
- E. Гостра дихальна недостатність

17. Пацієнту необхідно провести рентгенологічне дослідження шлунка. Яку контрастну речовину найчастіше використовують для цього?

- A. \*Барієву суміш
- B. Холевід
- C. Білітраст
- D. Урографін
- E. Білігност

18. У дитини спостерігається виражена сонливість, дезорієнтація в просторі і часі, знижена реакція на зовнішні подразнення, під час пробудження мляво і повільно відповідає на запитання і одразу засинає. Який тип порушення свідомості у дитини?

- A. \*Ступор
- B. Глибока кома

- C. Делірій
- D. -
- E. Помірна кома

19. Фельдшер сільської амбулаторії веде III період строкових пологів у жінки 25 років. Які заходи слід провести під час кровотечі в цьому періоді пологів, якщо плацента відокремилася, а послід не виділяється?

- A. \*Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
- B. Увести утеротонічні засоби
- C. Здійснити ручне відокремлення плаценти
- D. Виконати зовнішній масаж матки
- E. Накласти шов за Лосицькою

20. Укажіть вік дитини, коли відбувається перший фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі крові:

- A. \*5 днів
- B. 5 місяців
- C. 1 день
- D. 5 тижнів
- E. 5 років

21. У дитини 2 років припускають латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для цого захворювання?

- A. \*Хвостека
- B. Кера
- C. Керніга
- D. Ортнера
- E. Брудзинського

22. Після обстеження пацієнтки 25 років з'ясувалось, що у неї затримка менструації, виявлена пігментація шкіри на обличчі та білій лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене до розмірів курячого яйця, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- A. \*Вагітність маткова
- B. Ендометріоз матки
- C. Ендометрит
- D. Вагітність позаматкова
- E. Пухлина матки

23. Пацієнка 20 років скаржиться на загальну слабкість, дратівливість, серцепебиття, підвищену збудливість, поганий сон. Під час огляду: витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тремор кінцівок. Пульс - 120/хв., АТ - 150/90 мм рт. ст. Яке обстеження доцільно провести насамперед?

- A. \*Визначення рівня тироксину, трийодтироніну в крові
- B. Дослідження ревмопроб
- C. Визначення рівня холестерину в крові
- D. Визначення рівня глюкози в крові
- E. Визначення рівня ліпідів

24. До фельдшера сільської амбулаторії звернулась мати 5-річної дитини. Скарги: у дитини раптово підвищилась температура тіла до 40°C, дитина млява, мало-рухлива, на шкірі з'явилася висипка геморагічного характеру, зірчастої форми,

підвищується над поверхнею шкіри, не зникає після натискання. Який діагноз найімовірніший?

- A. \*Менінгококцемія
- B. Вітряна віспа
- C. Скарлатина
- D. Кір
- E. Краснуха

25. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася першовагітна жінка в терміні вагітності 38 тижнів, у якої 2 години тому почалися перейми кожні 10 хвилин по 20-25 секунд. Положення плода повздовжнє, сіднички плода притиснуті до входу в малий таз. Навколоплідні води не виливалися. У якому періоді пологів перебуває роділля?

- A. \*Першому періоді
- B. Загроза передчасних пологів
- C. Передвіsnikiv пологів
- D. Третьому періоді
- E. Другому періоді

26. У роділлі в I періоді пологів виник різкий головний біль, порушення зору, АТ - 170/100 мм рт. ст. На висоті однієї з потуг у неї виникла короткочасна втрата свідомості та судоми. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A. \*Еклампсія
- B. Прееклампсія важкого ступеня
- C. Прееклампсія середнього ступеня
- D. Прееклампсія легкого ступеня
- E. Відшарування плаценти

27. У пацієнтки під час обстеження виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів належить ця патологія?

- A. \*Передракових станів
- B. Злоякісні пухлини
- C. Трофобластична хвороба
- D. –
- E. Доброякісні пухлини

28. Яке дихання під час аускультації легень вислуховується у здорової дитини 7 місяців?

- A. \*Пуерильне
- B. Везикулярне
- C. Ослаблене
- D. Бронхіальне
- E. Жорстке

29. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 37 років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або простукуванні передньої стінки лобової пазухи, особливо у разі натисканні на верхньовнутрішній кут очної ямки. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Гострий фронтит
- B. Гострий риніт
- C. Гострий гайморит
- D. Гострий етмоїдит

E. Гострий сфеноїдит

30. Який метод дослідження сечі використовують для визначення концентраційної і фільтраційної здатності нирок?

- A. \*За Зимницьким
- B. -
- C. За Нечипоренко
- D. За Аддіса-Каковського
- E. За Амбурже

31. Під час огляду в дзеркалах виявлено: шийка матки гіпертрофована, на передній губі її відзначається пухлина у вигляді «цвітної капусти», кровоточить під час дотику. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. \*Рак шийки матки
- B. Ерозований ектропіон
- C. Дисплазія шийки матки
- D. Ерозія шийки матки
- E. Поліп шийки матки

32. Дитина 7 місяців перебуває на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко, манна каша). Надійшла до стаціонару з підвищеною температурою до 37,8°C, короткочасними нападами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту II ступеня. Позитивні симптоми Ерба, Труссо, Маслова. Визначте патологічний стан, що спровокував судоми:

- A. \*Спазмофілія
- B. Епілепсія
- C. Ниркова еклампсія
- D. -
- E. Менінгоенцефаліт

33. Пацієнт 40 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на раптовий гострий біль у поперековій ділянці зліва, що іrrадіює в статеві органи, стегно, часті позиви на сечовипускання. Хворий збуджений, блідий, часто змінює положення тіла. Яку патологію можна припустити у пацієнта?

- A. \*Напад ниркової коліки
- B. Гострий цистит
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Гострий піелонефрит
- E. Гостра ниркова недостатність

34. Яка тріада симптомів найбільш характерна для гострого піелонефриту?

- A. \*Лихоманка, біль у попереку, дизурія
- B. Біль у кістках, суглобах, м'язах
- C. Спрага, арефлексія, нудота
- D. Блювання, діарея, біль у животі
- E. Дизурія, гематурія, ніктурія

35. До жіночої консультації звернулася першовагітна жінка. Із анамнезу з'ясувалося, що перші рухи плода вона відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Який термін вагітності?

- A. \*24 тижні
- B. 32 тижні

- C. 20 тижнів
- D. 16 тижнів
- E. 28 тижнів

36. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 32 років зі скаргами на появу на шкірі тулуба та кінцівок висипки різного розміру, червоного кольору, значне свербіння шкіри, що з'явились після вживання полуниці. Пульс - 80/хв., АТ -120/70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні такі ознаки?

- A. \*Крапивниця
- B. Анафілактичний шок
- C. Гостра серцева недостатність
- D. Набряк Квінке
- E. Гостра судинна недостатність

37. Пацієнту перед операцією лікар призначив очисну клізму. Яке положення необхідно надати пацієнту для проведення процедури?

- A. \*На лівому боці
- B. Стоячи
- C. На правому боці
- D. На спині
- E. На животі

38. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік зі скаргами на порушення зору, ковтання, мовлення, виражену сухість у роті. Температура тіла нормальнa. З анамнезу відомо, що три дні тому їв консервовані гриби домашнього приготування. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Ботулізм
- B. Гострий менінгіт
- C. Поліомієліт
- D. Отруєння метиловим спиртом
- E. Дифтерія глотки

39. До фельдшера медпункту звернувся робітник зі скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, загальну слабкість. Біль спочатку локалізовувся в епігастрії, потім перемістився в здухвинну ділянку. Позитивні симптоми Сітковського, Бартом'є-Міхельсона. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Гострий апендицит
- B. Гострий ентероколіт
- C. Гостра кишкова непрохідність
- D. Гострий піелонефрит
- E. Гострий панкреатит

40. Під час масивних переливань крові необхідно проводити профілактику циритатного шоку. Який препарат застосовується для цього?

- A. \*10% розчин кальцію хлориду
- B. 25% розчин сульфату магнію
- C. 0,9% розчин натрію хлориду
- D. 10% розчин натрію хлориду
- E. 40% розчин глюкози

41. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 27 років зі скаргами на різкий тяжнучий біль у нігтьовій фаланзі II пальця правої кисті. Хворіє протягом 3 днів.

Об'єктивно: дистальна фаланга набрякла, гіперемована, пальпаторно - різко болюча. Попередній діагноз - панарицій. Яке знеболення треба провести перед розтином панарицію?

- A. \*Аnestезія за Лукашевичем-Оберстом
- B. Аnestезія за О. В. Вишневським
- C. Аnestезія за методом Волковича
- D. Аnestезія за методом Кохера
- E. Аnestезія за Школьниковим-Селівановим

42. Фельдшер ЕМД приймає пологи у жінки 25 років у медичному транспорті. У третьому періоді пологів, за 15 хвилин після народження дитини, почалась незначна кровотеча. Ознаки відокремлення плаценти позитивні. Крововтрата 200 мл. Що з наведеного треба зробити насамперед?

- A. \*Запропонувати роділлі потужитись
- B. Провести зовнішній масаж матки
- C. Виділити плаценту зовнішніми прийомами
- D. Провести ручне відділення плаценти
- E. Ввести окситоцин

43. Дитина 5 років перебуває у тяжкому стані. Об'єктивно: збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів, щільні фібринозні сірувато-блілі плівки на них, у разі спроби зняття яких спостерігається кровоточивість слизової оболонки. Укажіть найімовірніший попередній діагноз:

- A. \*Дифтерія глотки
- B. Гострий фарингіт
- C. –
- D. Гострий тонзиліт
- E. Скарлатина

44. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася жінка, яка годує дитину груддю зі скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, розпираючий біль у правій молочній залозі. Під час огляду - залоза збільшена, гіперемована, під час пальпації - ущільнена, болісна. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. \*Гострий мастит
- B. Фіброаденома молочної залози
- C. Фурункул молочної залози
- D. Мастопатія
- E. Гіpermастія

45. У роділлі триває III період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл крові, кровотеча триває. Під час огляду материнської поверхні плаценти виявлена відсутність однієї дольки. Яка тактика в такому разі?

- A. \*Ручна ревізія порожнини матки
- B. Введення утеротонічних засобів
- C. Притиснення черевної аорти кулаком
- D. Огляд пологових шляхів у дзеркалах
- E. Зовнішній масаж матки

46. У дитини 3 місяців виявлені такі симптоми: неспокій, підвищена пітливість, облисіння потилиці, стійкий червоний дермографізм, м'язова гіпотенція, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?

- A. \*Початковий
- B. Залишкових явищ
- C. Розпалу
- D. Реконвалесценції
- E. Термінальний

47. Фельдшер ЕМД надає першу допомогу на місці події потерпілому чоловікові, який унаслідок необережності поранив склом ліве передпліччя. Під час огляду в середній третині лівого передпліччя на передній поверхні виявлена глибока рана 4х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі доцільно обрати у цьому разі?

- A. \*Давляча пов'язка
- B. Пальцьове притискання артерії
- C. Оклюзійна пов'язка
- D. Згинання кінцівки в суглобі
- E. Надання кінцівці підвищеного положення

48. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 57 років, який працює бурильником. Скаржиться на ніючий біль у кистях рук, що найбільше турбує вночі, відчуття повзання мурашок, мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, спостерігається поблідніння пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Вібраційна хвороба
- B. Інтоксикаційна полінейропатія
- C. Діабетична полінейропатія
- D. Синдром Рейно
- E. Реактивний артрит

49. У пацієнта 28 років, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово виник біль у епігастральній ділянці, блювання «кавовою гущею». АТ - 80/40 мм рт. ст. Які з наведених заходів треба застосувати насамперед?

- A. \*Покласти міхур із льодом на живіт
- B. Покласти грілку на живіт
- C. Промити шлунок
- D. Увести кордіамін
- E. Дати випити гарячу каву

50. Під час розкриття шийки матки на 4 см у роділлі відійшли води. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A. \*Раннє
- B. Вчасне
- C. –
- D. Запізнілє
- E. Передчасне

51. Пацієнка скаржиться на дзвін у вухах, порушення слуху, періодичні запаморочення, порушення рівноваги. У неї припускають лабіrintит. Лабіrintит - це запалення:

- A. \*Внутрішнього вуха
- B. Соскоподібного відростка
- C. Середнього вуха
- D. Зовнішнього вуха

E. Слухової труби

52. Пацієнт 70 років скаржиться на кашель із виділенням мокротиння у вигляді «малинового желе», зниження апетиту, схуднення на 15 кг протягом останніх півроку, задишку, що посилюється під час фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що він палить приблизно 35 років. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. \*Рак легень
- B. Пневмонія
- C. Бронхеоктатична хвороба
- D. Туберкульоз легень
- E. Бронхіальна астма

53. Новаонародженій дитині віком 3 днів заплановано щеплення проти туберкульозу. Який шлях введення вакцини БЦЖ?

- A. \*Внутрішньошкірний
- B. Внутрішньом'язовий
- C. Підшкірний
- D. Пероральний
- E. Внутрішньовенний

54. Роділля перебуває у першому періоді пологів. Передбачувальна маса плода 4500 г. Перейми різко болісні, матка у вигляді «піщаного годинника», роділля занепокоєна. Яку допомогу повинен надати фельдшер сільської амбулаторії?

- A. \*Припинити пологову діяльність
- B. -
- C. Інгаляція киснем
- D. Ввести кровозупинні препарати
- E. Покласти міхур із льодом на низ живота

55. Пацієнт 34 років скаржиться на біль під час дефекації, появу слизу та крові у випорожненнях протягом півроку, хронічне порушення випорожнень. Який метод обстеження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- A. \*Ректороманоскопія
- B. УЗД ОЧП
- C. Гастроскопія
- D. ФГДС
- E. Цистоскопія

56. У дитини 5 років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищеннем температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання в цьому разі є енцефаліт?

- A. \*Вітряна віспа
- B. Скарлатина
- C. Кашлюк
- D. Паротит
- E. Ентеровірусна інфекція

57. У дитини 4 років констатована біологічна смерть. Серед наведених ознак виберіть основний діагностичний критерій біологічної смерті:

- A. \*Симптом «котячого ока»
- B. Наявність дихання за відсутності серцевої діяльності

- C. Зміна кольору шкіри
- D. Симптом «білої плями»
- E. Симптом «джгута»

58. Пацієнту призначено переливання крові. Під час визначення групи крові за допомогою цоліклонів аглютинація відбулася лише з цоліклоном анти-А. Яка група крові у пацієнта?

- A. \*A (II)
- B. B (III)
- C. AB (IV)
- D. –
- E. O (I)

59. Яке обстеження найдоцільніше провести пацієнту з припущенням на хронічний панкреатит?

- A. \*Аналіз сечі на альфа-амілазу
- B. Дуоденальне зондування
- C. Колоноскопію
- D. Холецистографію
- E. Фіброгастроескопію

60. Роділля перебуває у II періоді пологів. На фоні дуже сильної половогої діяльності жінка відчула різкий біль у животі, раптово перейми припинилися, жінка втратила свідомість. АТ - 70/40 мм рт. ст. Жінка бліда, вкрита холодним потом. Яке ускладнення пологів виникло?

- A. \*Розрив матки, що відбувся
- B. Надмірно сильна полкова діяльність
- C. Вторинна слабкість полової діяльності
- D. Передчасне відшарування плаценти
- E. Загроза розриву матки

61. Під час обстеження хворої дитини 8 років виявлено несиметричні підшкірні крововиливи різного розміру та кольору. У крові - виражена тромбоцитопенія. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Хвороба Верльгофа
- B. Крапивниця
- C. Гемофілія А
- D. Хвороба Шенлейна-Геноха
- E. Сепсис

62. Роділля 24 роки перебуває у першому періоді пологів. Після 8 годин нормальної полової діяльності перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився. Яка патологія полової діяльності виникла у роділлі?

- A. \*Вторинна слабкість полової діяльності
- B. Дискоординована полкова діяльність
- C. Патологічний прелімінарний період
- D. Первина слабкість полової діяльності
- E. Надмірно сильна полкова діяльність

63. Дівчинка 3 місяців втратила за 2 доби 500 г маси тіла внаслідок блювання та діареї. Під час огляду шкіра у дитини сірувато-ціанотичного кольору, риси обличчя загострені, рефлекси знижені. Для якого патологічного стану характерні такі клінічні

ознаки?

- A. \*Ексикозу
- B. Рахіту
- C. Гіперглікемічної коми
- D. Печінкової коми
- E. Спазмофілії

64. Дезінфекція, яка проводиться в осередку інфекції після видалення з нього джерела інфекції, називається:

- A. \*Вогнищева заключна
- B. Комбінована
- C. Профілактична
- D. Вогнищева поточна
- E. –

65. У пацієнта під час транспортування в реанімаційне відділення у коматозному стані спостерігається гучне, нечасте дихання з глибоким шумним вдихом та посиленім видихом. Визначте патологічний тип дихання:

- A. \*Дихання Куссмауля
- B. Тахіпное
- C. Брадипное
- D. Дихання Біота
- E. Дихання Чейна-Стокса

66. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася мати з 6-місячною дитиною. Мати скаржиться, що у дитини нежить, кашель, світлобоязнь, підвищення температури тіла, слізотеча, дитина відмовляється від їжі, з'явився висип на обличчі, потім на ший, а згодом на тулуబі і нижніх кінцівках. Хворіє 3-ю добу. Під час огляду: ознаки кон'юнктивіту, на шкірі рясний висип плямисто-папульозного характеру, місцями зливається. Який найімовірніший діагноз?

- A. \*Кір
- B. Менінгококцемія
- C. Скарлатина
- D. Краснуха
- E. Туберкульоз шкіри

67. У чоловіка 42 років виник напад задухи із затрудненим видихом. Напад триває понад 12 годин, не піддається корекції бронходилляторами. Пацієнт у свідомості, але його реакції загальмовані, шкіра ціанотична, шийні вени набухші, грудна клітка роздута. Аускультивно: дихання ослаблене, вислуховуються зони «німої легені», ЧД - 45/хв, пульс частий, гіпотонія. Ці симптоми характерні для:

- A. \*Астматичний статус, II стадія
- B. Астматичний статус, III стадія
- C. Напад серцевої астми
- D. Гострий стснозуючий ларинготрахеїт
- E. Астматичний статус, I стадія

68. Після народження дитини у роділлі за 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення з піхви. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

- A. \*Ознака Шредера
- B. Ознака Кюстнера-Чукалова

- C. Ознака Клейна
- D. Ознака Штрасмана
- E. Ознака Альфельда

69. Фельдшера сільської амбулаторії викликали до пацієнта 46 років, у якого після фізичного навантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іrrадіацією в праве плече. З'явились нудота та блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язык сухий, обкладений жовтим нальотом, склери субіктеричні. Позитивний симптом Ортнера. Для якої патології характерні такі ознаки?

- A. \*Жовчної коліки
- B. гострого гепатиту
- C. Ниркової коліки
- D. Гострого гастриту
- E. Гострого панкреатиту

70. До фельдшера сільської амбулаторії звернулась пацієнта 49 років зі скаргами на слабкість, головний біль, порушення менструального циклу, ріст волосся на обличчі. Об'єктивно: диспластичне ожиріння з перерозподілом підшкірно- жирової клітковини на обличчі, шиї та тулубі, рожеві смуги на шкірі нижньої частини живота. АТ - 180/100 мм рт. ст. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Хвороба Іценко-Кушинга
- B. Ожиріння
- C. Акромегалія
- D. Феохромоцитома
- E. Гігантізм

71. Пацієнт 36 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на озноб, підвищення температури тіла, сухий кашель, виражений біль у правій половині грудної клітки. Займає вимушене положення - лежить на правому боці. Попередній діагноз - сухий плеврит. Які аускультивні ознаки характерні для цієї патології?

- A. \*Шум тертя плеври
- B. Крепітация
- C. Везикулярне дихання
- D. –
- E. Сухі свистячі хрипи

72. Пацієнту з діагнозом попереково- крижовий радикуліт призначено діадинамотерапію (ДДТ). Укажіть електроди, які застосовують під час проведення ДДТ

- A. \*Свинцеві металеві пластини
- B. Випромінювачі
- C. Аплікатори
- D. Конденсаторні пластини
- E. Скліні вакуумні

73. Фельдшер сільської амбулаторії під час обстеження вагітної жінки, яку треба взяти на облік, встановив: термін вагітності - 30 тижнів, положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Розміри тазу: 24-26-28-18. Під час піхвового дослідження міс досягається, діагональна кон'югата - 11 см. Оцініть розміри таза у жінки:

- A. \*Загальнорівномірнозвужений таз
- B. Плоскорахітичний таз
- C. Простий плоский таз

- D. Загальнозвужений плоский таз
- E. Нормальний таз

74. Фельдшер сільської амбулаторії здійснює серцево-легеневу реанімацію жінці 38 років. Який вид травми найчастіше виникає під час проведення непрямого масажу серця?

- A. \*Перелом ребер
- B. Колапс легень
- C. Ушкодження обличчя
- D. Ушкодження трахеї
- E. Перелом хребта

75. Пацієнта, який отримує інсульнотера- пію, потрібно попередити про специфічне ускладнення, яке може виникнути в результаті постійного введення інсулуїну в одне й теж саме місце. Назвіть це ускладнення:

- A. \*Ліподистрофія
- B. Інфільтрат
- C. Бешиха
- D. Абсцес
- E. Гематома

76. На підставі даних анамнезу та результатів лабораторного обстеження у пацієнта діагностовано вірусний гепатит. Який механізм передачі цього захворювання?

- A. \*Фекально-оральний
- B. Повітряно-крапельний
- C. Трансмісивний
- D. Контактний
- E. Вертикальний

77. За якого виду передлежання плаценти родорозрішення проводиться тільки шляхом кесаревого розтину?

- A. \*Центральне
- B. Асинклітичне
- C. Крайове
- D. Бокове
- E. Синклітичне

78. Чоловік 43 років, який працює на м'ясокомбінаті, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо літкових, та попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшенні печінка та селезінка; температура тіла - 37,8°C, пульс - 100/хв., АТ - 90/50 мм рт. ст., олігурія. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. \*Лептоспіroz
- B. Висипний тиф
- C. Бруцельоз
- D. Вірусний гепатит
- E. Черевний тиф

79. Пацієнт госпіталізований до гематологічного відділення з припущенням на гострий лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення в цьому

разі?

- A. \*Стернальна пункция
- B. ЕКГ
- C. Бактеріологічне дослідження крові
- D. Біохімічний аналіз крові
- E. Коагулограма

80. У дитина, яка народилася на 35-му тижні гестації виявлені множинні вади розвитку: мікроцефалія, катараракта, глухота та вроджена вада серця. З анамнезу відомо, що мати під час вагітності перехворіла на інфекцію, яка супроводжувалась плямистою висипкою, збільшенням лімфатичних вузлів та незначною інтоксикацією. Яке інфекційне захворювання матері стало найімовірнішою причиною патології у дитини?

- A. \*Краснуха
- B. Цитомегаловірусна інфекція
- C. Герпетична інфекція
- D. Токсоплазмоз
- E. Хламідійна інфекція

81. Пацієнтці призначено діадинамотерапію. Яке захворювання є протипоказанням для цього методу електролікування?

- A. \*Тромбофлебіт
- B. Невралгія
- C. Нейроміозит
- D. Остеохондроз
- E. Деформуючий артроз

82. У дівчинки 9 років відзначається дратівливість, порушення сну, зміна почерку, порушення ходи. За місяць до цього перехворіла на гострий бактеріальний тонзиліт. Під час огляду спостерігається м'язова гіпотенія, мимовільні скорочення мімічної мускулатури і пальців рук. Яку патологію можна припустити?

- A. \*Ревматична хорея
- B. Гострий ревматичний міокардит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Епілепсія
- E. –

83. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт зі скаргами на появу частих, рідких, водянистих випорожнень, що нагадують рисовий відвар, багаторазове блювання, виражену слабкість, зниження температури тіла до 35,2°C. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Холера
- B. Ботулізм
- C. Шигельоз
- D. Ієрсиніоз
- E. Черевний тиф

84. Роділля народила хлопчика масою 4000 г. Протягом 30 хв. ознак відокремлення плаценти немає, з'явились незначні кров'янисті виділення. Яка акушерська тактика в цьому разі?

- A. \*Ручне відокремлення плаценти і видалення посліду
- B. Вичікувальна тактика
- C. Виконати зовнішній масаж матки

- D. Застосувати зовнішні прийоми видалення посліду
- E. Увести утеротонічні засоби

85. Перелом якої з наведених кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

- A. \*Плечової
- B. П'яткової
- C. Надколінка
- D. Променевої
- E. Великогомілкової

86. Чоловік під час пожежі отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A. \*36%
- B. 25%
- C. 18%
- D. 56%
- E. 42%

87. З чого треба розпочати медичну допомогу пацієнту з відкритим переломом правого стегна, ускладненого артеріальнюю кровотечею?

- A. \*З накладання кровоспинного джгута
- B. З туалету рани та накладання пов'язки
- C. З накладання транспортної шини
- D. З уведення знеболюючих засобів
- E. З активно-пасивної профілактики правця

88. До фельдшера медпункту звернувся робітник, у якого на роботі раптово виник напад задухи. З анамнезу відомо, що він хворіє на бронхіальну астму. Що вислуховується в легенях під час аускультації у разі нападу бронхіальної астми?

- A. \*Сухі свистячі хрипи
- B. Пуерильне дихання
- C. Вологі хрипи
- D. Крепітация
- E. Шум тертя плеври

89. Пацієнт 63 років скаржиться на переймоподібний біль у животі, затримку дефекації та невідходження газів. Об'єктивно: язик сухий, живіт твердий, болісний. Під час пальпації виявлено позитивний симптом Валя, «шум плеску». Який найімовірніший діагноз?

- A. \*Гостра кишкова непрохідність
- B. Гострий гастрит
- C. Гострий холецистит
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий апендицит

90. У чоловіка 20 років констатована клінічна смерть. Фельдшер проводить йому серцево-легеневу реанімацію. Що з наведеної свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- A. \*Пульсація на сонній артерії
- B. Відсутність свідомості
- C. Зниження температури тіла

- D. Пасивні рухи грудної клітки
- E. Розширення зіниць

91. Оцінювання стану новонародженої дитини за шкалою Апгар треба проводити на:

- A. \*1-й і 5-й хвилині життя
- B. 3-й і 7-й хвилині життя
- C. 4-й і 8-й хвилині життя
- D. 5-й і 9-й хвилині життя
- E. 2-й і 6-й хвилині життя

92. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт, який впав із драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки наявність рани з незначною кровотечею. Під час накладання пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Ці симптоми характерні для:

- A. \*Відкритого перелому
- B. Розтягнення зв'язок
- C. Розриву зв'язок
- D. Вивиху
- E. Закритого перелому

93. Під час патронажу здорової доношеної дитини віком 5 діб фельдшер сільської амбулаторії помітив кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини, набряк вульви та збільшення грудних залоз. Який перехідний стан виник у дитини?

- A. \*Статевий криз
- B. Токсична еритема
- C. Фізіологічна еритема
- D. Фізіологічна жовтяниця
- E. Сечокислий інфаркт

94. Під час проведення зовнішнього акушерського обстеження роділлі було визначено: під час II прийому Леопольда справа від пупка пальпуються щільна, округла, балотуюча частина плода; зліва - м'яка, з нечіткими контурами; під час III прийому Леопольда - передлегла частина плода відсутня. Визначте розташування плода в порожнині матки:

- A. \*Поперечне положення, II позиція
- B. Поздовжнє положення, головне передлежання, I позиція, передній вид
- C. Поперечне положення, I позиція
- D. Поздовжнє положення, тазове передлежання, I позиція, передній вид
- E. Поздовжнє положення, головне передлежання, II позиція, задній вид

95. У пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні, лікар припустив цукровий діабет та призначив зібрати аналіз сечі для оцінки глюкозурії. У цьому разі сечу треба зібрати:

- A. \*Протягом доби
- B. Свіжовиділену
- C. Протягом 12 годин
- D. Протягом 8 годин
- E. Протягом 3 годин

**96.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 35 років зі скаргами на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , озноб, пітливість, виражену слабкість, задишку, серцебиття, біль у горлі під час ковтання, кровоточивість ясен. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Пальпуються збільшені шийні та підщелепні лімфатичні вузли. Пульс 96/хв., ритмічний, АТ - 90/60 мм рт. ст. Живіт м'який, печінка + 5 см, нижче края реберної дуги. У аналізі крові виявлено: еритроцити  $-1,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобін –  $50 \text{ г/л}$ , лейкоцити  $-15 \cdot 10^9/\text{л}$ , бластні клітини  $-80\%$ , ШОЕ -  $60 \text{ мм/год}$ . Сформулюйте попередній діагноз:

- A. \*Гострий лейкоз
- B. Лімфогранулематоз
- C. Хронічний лімфолейкоз
- D. Гемофілія
- E. Хронічний мієлолейкоз

**97.** Фельдшера ЕМД викликали до жінки 35 років, яка годину тому випила 300 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті та епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Яка перша допомога в цьому разі?

- A. \*Промити шлунок холодною водою через зонд
- B. Промити шлунок розчином перманганату калію
- C. Промити шлунок розчином соди через зонд
- D. Викликати блювання
- E. Промити шлунок теплою водою

**98.** У пацієнта 55 років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг у пацієнта немає. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- A. \*Хронічний лімфолейкоз
- B. Гострий лейкоз
- C. Хронічний мієлолейкоз
- D. Гіпопластична анемія
- E. Лімфогранулематоз

**99.** До сільської амбулаторії звернулася мати з дитиною віком 12 років. Дитина скаржиться на виражений біль у верхньому відділі живота, який виникає після споживання їжі, відрижку кислім, печію. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, під час пальпації живіт м'який, болісний в епігаstralльній ділянці. Печінка не збільшена. Яке додаткове інструментальне дослідження є найінформативнішим для встановлення діагнозу в цьому разі?

- A. \*Фіброгастроуденоскопія
- B. Ректороманоскопія
- C. Колоноскопія
- D. УЗД ОЧП
- E. Холецистографія

**100.** Під час огляду пацієнта виявлено такі симптоми: витрішкуватість, позитивні симптоми Грефе, Мебіуса, Штельвага. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Тиреотоксикоз
- B. Ендемічний зоб
- C. Цукровий діабет
- D. Акромегалія
- E. Мікседема

**101.** Під час бімануального обстеження вагітної жінки виявлено, що матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, асиметрична, у лівому куті матки пальпується випинання. Матка м'якої консистенції, але під час обстеження скоротилася та ущільнилася, після припинення подразнення знову стала м'якою. Які ознаки вагітності виявлені у жінки?

- A. \*Піскачека і Снегірьова
- B. Горвіца-Гегара
- C. Губарєва-Гаусса
- D. Гентера і Піскачека
- E. Снегірьова і Гентера

**102.** Назвіть інструмент, що використовується під час дослідження ходів нориці та введення дренажів:

- A. \*Гудзикуватий зонд
- B. Коловорот
- C. Спіця Кіршнера
- D. Ложечка Фолькмана
- E. Троакар

**103.** Пацієнта скаржиться на свербіння шкіри впродовж тижня, частіше вночі. Об'єктивно: у міжпальцевих проміжках, на животі та сідницях численні висипання у вигляді «парних» везикул, розчухи. Для якого захворювання це характерно?

- A. \*Короста
- B. Атопічний дерматит
- C. Рожевий лишай
- D. Екзема
- E. Алергічний дерматит

**104.** Вагітна жінка в терміні вагітності 35-36 тижнів звернулася на сільської амбулаторії. Вагітність перебігала на фоні прееклампсії. Загальний стан середнього ступеня тяжкості, шкіра бліда, пульс - 98/хв., АТ - 140/90 мм рт. ст. Матка збільшена відповідно строку вагітності, напружена, асиметрична, болюча зліва від дна матки під час пальпації. Серцебиття плода - 160-170/хв., глухе. Який імовірний діагноз?

- A. \*Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- B. Загроза розриву матки
- C. Гіпертонія матки
- D. Передлежання плаценти
- E. Загроза передчасних пологів

**105.** Пацієнт скаржиться на сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння «мушок» перед очима, АТ - 220/110 мм рт. ст. Такі ознаки характерні для:

- A. \*Гіпертонічного кризу
- B. Діабетичної коми
- C. Гіпоглікемічної коми
- D. Печінкової коми
- E. Анафілактичного шоку

**106.** Вагітна жінка 25 років надійшла до пологового будинку у терміні вагітності 40 тижнів. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ - 100 см; ВДМ - 42 см. Положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малій таз. Серцебиття плода приглушене, 160/хв. Перейми почалися 6 годин тому, болісні; відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Яке ускладнення виникло в пологах у жінки?

- A. \*Загроза розриву матки
- B. Повний розрив матки
- C. Емболія навколоплідними водами
- D. Кінець I періоду пологів
- E. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

**107.** Пацієнту проводять дуоденальне зондування. Який подразник необхідно застосувати для отримання міхурової жовчі?

- A. \*33% розчин магнію сульфату
- B. -
- C. 5% розчин етилового спирту
- D. 9% відвар сухої капусти
- E. 0,2% розчин кофеїну

**108.** Чоловік 23 років скаржиться на загальну слабкість, нездужання, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5°C, сухий кашель. Хворіє другий день. Об'єктивно: загальний стан задовільний, перкуторний звук над легенями ясний, дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи. ЧДД - 16/хв. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС - 72/хв. АТ -120/80 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A. \*Гострий бронхіт
- B. Вогнищева пневмонія
- C. Бронхіальна астма
- D. Ексудативний плеврит
- E. ХОЗЛ

**109.** Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, біль у попереку. Об'єктивно: набряки на обличчі, позитивний симптом Пастернацького, АТ - 160/90 мм рт. ст. Попередній діагноз - гострий гломерулонефрит. Укажіть, які зміни в сечі найбільш характерні для цього захворювання:

- A. \*Протеїнурія та гематурія
- B. Лейкоцитурія та протеїнурія
- C. Бактеріурія та циліндрурія
- D. Лейкоцитурія та циліндрурія
- E. Лейкоцитурія та оксалатурія

**110.** Потерпілий під час ДТП чоловік втратив свідомість. Спостерігається лікворея та кровотеча з вух та носа, брадикардія. Яке пошкодження можна припустити?

- A. \*Перелом основи черепа
- B. Стиснення головного мозку
- C. Забій головного мозку
- D. Перелом склепіння черепа
- E. Струс головного мозку

**111.** Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб?

- A. \*Гістеросальпінографія
- B. Вимірювання базальної температури
- C. Біопсія ендометрія
- D. Бімануальне дослідження
- E. -

**112.** Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми: поліурія, полідипсія, поліфагія, втрата маси тіла?

- A. \*Цукрового діабету
- B. Пієлонефриту
- C. Лейкозу
- D. Анемії
- E. Гломерулонефриту

**113.** У пацієнта спостерігається підвищення температури тіла, головний біль, багаторазове блювання, ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Як називається цей синдром?

- A. \*Менінгеальний
- B. Бульбарний
- C. Поліневритичний
- D. Вертеброгенний
- E. Гіпоталамічний

**114.** Який розмір площини таза називають акушерською або справжньою кон'югатою?

- A. \*Прямий розмір площини входу в малий таз
- B. Прямий розмір широкої частини порожнини малого таза
- C. Поперечний розмір площини входу в малий таз
- D. Прямий розмір вузької частини порожнини малого таза
- E. Поперечний розмір широкої частини порожнини малого таза

**115.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 30 років, який годину тому отримав ножове поранення нижньої кінцівки. З рані в ділянці гомілки витікає кров темно-червоного кольору, рівномірно струєю. Це характерно для:

- A. \*Венозної кровотечі
- B. Капілярної кровотечі
- C. Пульсуючої кровотечі
- D. Артеріальної кровотечі
- E. –

**116.** Фельдшер сільської амбулаторії виконує дитині внутрішньошкірну пробу Манту. Яку анатомічну ділянку необхідно використати для проведення проби?

- A. \*Внутрішню поверхню передпліччя
- B. Підлопаткову ділянку
- C. Зовнішню поверхню передпліччя
- D. Передньозовнішню поверхню стегна
- E. Латеральну поверхню живота

**117.** До фельдшера сільської амбулаторії звернулася мати дитини 3 місяців зі скаргами на зменшення кількості молока, неспокій та зменшення сечовипускання у дитини. Після проведення зважування дитини та розрахунків виявлено дефіцит маси тіла, який складає 16%. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- A. I ступінь гіпотрофії
- B. II ступінь паратрофії
- C. III ступінь гіпотрофії
- D. I ступінь паратрофії
- E. II ступінь гіпотрофії

**118.** Під час переливання еритроцитарної маси пацієнту, який перебуває в непримому стані, фельдшер помітив, що з катетера сечового міхура виділяється сеча бурого забарвлення. Про що найімовірніше свідчить поява бурого забарвлення сечі?

- A. \*Гемотрансфузійний шок
- B. Травматичний шок
- C. Посттравматична лихоманка
- D. Алергічна реакція
- E. Цитратний шок

**119.** У наслідок поранення шиї у чоловіка раптово з'явились різка блідість шкіри, сильний біль і свистячий звук із рані. Припинились серцева діяльність та дихання. Який потологічний стан можна припустити?

- A. \*Повітряна емболія
- B. Гостра анемія
- C. Жирова емболія
- D. Шок
- E. Асфіксія

**120.** У дитини 5 років температура тіла 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болісний під час пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болісна. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Шигельоз
- B. Холера
- C. Ботулізм
- D. -
- E. Черевний тиф

**121.** Пацієнт 23 років перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилося сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип гарячки у пацієнта?

- A. \*Гектична
- B. Інтермітуоча
- C. Хвилеподібна
- D. Ремітуоча
- E. Неправильна

**122.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт зі скаргами на озноб, підвищення температури тіла до 39,5°C, біль у правій половині грудної клітки, пов'язаний з актом дихання, сухий кашель, головний біль. Захворів гостро. Об'єктивно: рум'янець на щоках, частота дихання - 28/хв., під час пальпації грудної клітки виявлено посилене голосове тримтіння справа, перкуторно - притуплення перкуторного звука справа, аускультивно - крепітация справа. Пульс - 96/хв., АТ - 100/60 мм рт. ст. Який попередній діагноз?

- A. \*Негоспітальна пневмонія
- B. Гострий бронхіт
- C. Туберкульоз легень
- D. Рак легень
- E. Сухий плеврит

**123.** Як називається положення пацієнта в ліжку, за якого він самостійно не може змінити положення свого тіла?

- A. \*Пасивне

- B. Вимушене
- C. Активне
- D. Положення Фаулера
- E. Положення Сімса

**124.** Під час дослідження мокротиння виявлені еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- A. \*Бронхіальна астма
- B. Негоспітальна пневмонія
- C. Туберкульоз легень
- D. Гострий бронхіт
- E. Сухий плеврит

**125.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на схуднення, біль у ділянці промежини. Упродовж останніх 6 місяців у нього спостерігався дискомфорт під час акту дефекації, були незначні кровотечі, діарея чергувалася із закрепами. Під час пальцевого ректального дослідження виявлено бугристе ущільнення, малорухоме під час пальпації. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Рак прямої кишки
- B. Парапроктит
- C. Геморой
- D. Аналльна тріщина
- E. Поліп прямої кишки

**126.** Пацієнта 39 років скаржиться на біль у суглобах рук і ніг, підвищення температури тіла, загальну слабкість, схуднення. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на обличчі - гіперемія у вигляді «метелика». У крові виявлено LE-клітини. Для якого захворювання це характерно?

- A. \*Системний червоний вовчак
- B. Подагра
- C. -
- D. Вузликовий періартеріт
- E. Дерматополіміозит

**127.** Пацієнт 70 років скаржиться на біль у надлобковій ділянці, відчуття переповнення сечового міхура, неможливість самостійного акту сечовипускання протягом 12 год. Яку допомогу необхідно надати пацієнту?

- A. \*Провести катетеризацію сечового міхура
- B. Поставити очисну клізму
- C. Поставити гіпертонічну клізму
- D. На ділянку сечового міхура покласти міхур із льодом
- E. Увести сечогінні препарати

**128.** До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 45 років зі скаргами на слабкість, підвищення температури до 38,0°C, наявність болісного утворення на задній поверхні шиї. Об'єктивно: на шкірі шиї інфільтрат синюшно-багряного кольору з декількома гнійними «голівками». Яку патологію можна припустити?

- A. \*Карбункул
- B. Абсцес
- C. Флегмона
- D. Бешиха

**E. Фурункул**

**129.** Укажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода, якщо під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки виявлено: положення плода повздовжне, I позиція, передній вид, головне передлежання:

- A. \*Нижче пупка ліворуч
- B. Вище пупка ліворуч
- C. Вище пупка праворуч
- D. На рівні пупка
- E. Нижче пупка праворуч

**130.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся потерпілий чоловік із ножовим пораненням грудної клітки. Під час огляду виявлено, що під час вдиху повітря крізь рану вільно входить у плевральну порожнину і виходить з неї під час видиху, чути «свист». Які з наведених заходів слід застосувати насамперед?

- A. \*Накласти оклюзійну пов'язку
- B. Надати горизонтального положення
- C. Увести кровоспинні препаратори
- D. Застосувати давлячу пов'язку
- E. Застосувати транспортну іммобілізацію

**131.** Який метод транспортування пацієнта з припущенням на травму хребта?

- A. \*Лежачи на щиті
- B. Лежачи на лівому боці
- C. Сидячи на кріслі
- D. Лежачи на правому боці
- E. У положенні «жаби»

**132.** Чоловік, який отримав травму обличчя під час бійки, не може широко відкрити рот, розмовляти. Об'єктивно: нижня щелепа висунута вперед, відзначається гіперсалівація. Який найімовірніший діагноз?

- A. \*Вивих нижньої щелепи
- B. Струс головного мозку
- C. Перелом нижньої щелепи
- D. Перелом верхньої щелепи
- E. Вивих верхньої щелепи

**133.** Пацієнт 45 років скаржиться на слабкість, серцебиття, задишку, появу заїдів у куточках рота, випадіння волосся, спотворення смаку, нюху, утруднення ковтання сухої твердої їжі. Шкіра бліда, зеленуватого відтінку, суха, язик червоний з атрофією сосочків. У клінічному аналізі крові виявлено: мікроцитоз, анізоцитоз. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Залізодефіцитна анемія
- B. Ві<sub>2</sub>-дефіцитна анемія
- C. Гострий лейкоз
- D. Гемолітична анемія
- E. Гіпотиреоз

**134.** Пацієнт гостіталізований до лікарні з рясною кровоточею, яка почалася після екстракції зуба. З анамнезу з'ясувалось, що пацієнт хворіє на гемофілію А. Який препарат найдоцільніше використовувати для лікування такої кровотечі?

- A. \*Кріопреципітат

- B. Аскорутин
- C. Вікасол
- D. Хлорид кальцію
- E. Амінокапронова кислота

**135.** Який біологічний матеріал потрібно взяти у новонародженої дитини для проведення скринінг-тесту на фенілкетонурію?

- A. \*Кров
- B. Піт
- C. Випорожнення
- D. Сlinу
- E. Сечу

**136.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 30 років зі скаргами на біль у літкових м'язах під час ходьби, мерзлякуватість стоп, порушення чутливості, відчуття повзання мурашок. Уважає себе хворим протягом 2 років. В анамнезі - відмороження кінцівок. Палить, зловживає алкоголем. Під час обстеження: шкіра стоп холодна на дотик, пульсація на артеріях стоп відсутня, на підколінній та стегновій - виразна. Сформулюйте попередній діагноз:

- A. \*Облітеруючий ендартерійт
- B. -
- C. Гострий флеботромбоз
- D. Хвороба Рейно
- E. Гострий артеріальний тромбоз

**137.** Дітині 7 років проведена проба Манту. За який проміжок часу слід оцінити її результат?

- A. \*72 год.
- B. 56 год.
- C. 48 год.
- D. 12 год.
- E. 24 год.

**138.** Пацієнта 72 років госпіталізовано до лікарні зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ видно інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

- A. \*Миготлива аритмія
- B. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- C. Синусова тахікардія
- D. Екстрасистолічна аритмія
- E. Синусова аритмія

**139.** Молода жінка звернулась до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на виражений, щільний, блідий набряк обличчя, який не супроводжується свербінням, утруднене дихання, слабкість, тривогу. Стан розвинувся за 30 хвилин після ін'єкції антибіотика. Об'єктивно: виражений набряк обличчя, очні щілини майже закриті, язик не вміщається у роті. Пульс - 100/хв. АТ - 130/90 мм рт. ст. Який патологічний стан можна припустити у пацієнтки?

- A. \*Набряк Квінке
- B. Кропив'янка
- C. Анафілактичний шок

D. Гіпертонічний криз

E. Колапс

**140.** До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на біль за грудиною стискаючого характеру з іrrадіацією в ліву руку, що триває протягом 4 годин і не знімається нітрогліцерином. Ця симптоматика характерна для:

- A. \*Гострого інфаркту міокарда
- B. Нападу стенокардії
- C. Хронічного перикардиту
- D. Гострого ендокардиту
- E. Гострого міокардиту

**141.** У дитини напади кашлю складаються з серії коротких кашльових поштовхів із репризами, які повторюються до 15 разів на добу. Обличчя дитини під час нападу червоніє, шийні вени набухають, язик висувається назовні, кінчик його загинається догори, іноді напад закінчується блюванням. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. \*Кашлюк
- B. Напад бронхіальної астми
- C. Кір
- D. Пневмонія
- E. Ларингіт

**142.** Пацієнт 45 років скаржиться на біль та почервоніння в ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,5°C. У ділянці правої ступні та голівки відзначається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді «язиків полум'я», місцеве підвищення температури. Укажіть, для якого захворювання характерні такі ознаки:

- A. \*Бешиха
- B. Флегмона
- C. Подагра
- D. –
- E. Гострий тромбофлебіт

**143.** Пацієнт скаржиться на кашель із виділенням гнійного мокротиння, особливо вранці, задишку, серцебиття. Хворіє протягом 30 років. Під час огляду кінцівок пальці рук мають вигляд «барабанних паличок», нігті - «годинникових скелець». Для якого захворювання це характерно?

- A. \*Бронхектатична хвороба
- B. Бронхіальна астма
- C. Рак легень
- D. Туберкульоз легень
- E. Ексудативний плеврит

**144.** У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Йому потрібно накласти шину Крамера. Визначте рівні накладання цієї шини:

- A. \*Від кінчиків пальців до внутрішнього краю лопатки протилежної верхньої кінцівки
- B. Від пальців до плечового суглоба
- C. Від пальців до внутрішнього краю лопатки лівої верхньої кінцівки
- D. Від ліктьового суглоба до плечового суглоба
- E. Від променево-зап'ястного суглоба до лопатки протилежної верхньої кінцівки

**145.** Фельдшер ЕМД під час дослідження пульсу пацієнта виявив, що його частота складає 42/хв. Оцініть цей показник:

- A. \*Брадикардія
- B. Тахікардія
- C. Дефіцит пульсу
- D. Гіпертермія
- E. Аритмія

**146.** Бригада ЕМД транспортує пацієнта з гострим інфарктом міокарда до лікарні. Рантово у нього виник напад задухи, з'явилися інспіраторна задишка, кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Стан хворого тяжкий, шкіра бліда, пульс - 100/хв., ритмічний. Аускульта- тивно над легенями вислуховуються вологі середньоміхурцеві хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. \*Набряк легень
- B. Кардіогенний шок
- C. Негоспітальна пневмонія
- D. Тромбоемболія легеневої артерії
- E. Легенева кровотеча

**147.** У гінекологічне відділення доставлена пацієнка зі скаргами на переймоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після 8-тижневої затримки менструації, запаморочення. АТ - 85/55 мм рт. ст. Симптом Щоткіна-Блюмберга слабкопозитивний. Матка збільшена до 5 тижнів вагітності, ліва маткова труба збільшена, різко болісна. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

- A. \*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- B. Метросальпінгографія
- C. Кульдоскопія органів малого таза
- D. Гістероскопія органів малого таза
- E. Діагностичне вишкібання стінок порожнини матки

**148.** Пацієнт 63 років скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній частині живота, нудоту, багаторазове блювання. Під час пальпації живота спостерігається різкий біль в епігастрії і лівому підребер'ї, позитивний симптом Мейо- Робсона. Яке захворювання можна припустити?

- A. \*Гострий панкреатит
- B. Гострий холецистит
- C. Гострий апендицит
- D. Гостра кишкова непрохідність
- E. Перфоративна виразка шлунка

**149.** Комплекс заходів, спрямованих на запобігання проникненню мікроорганізмів у рану і в організм загалом, називається:

- A. \*Асептика
- B. Антисептика
- C. Дезінфекція
- D. Інфекційна безпека
- E. Інфекційний контроль

**150.** Пацієнт 48 років за декілька хвилин після введення звичайної дози інсуліну відчув голод, тремтіння рук, а потім втратив свідомість. Шкіра бліда, волога, судомні посмікування м'язів. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A. \*Гіпоглікемічна кома
- B. Кетоацидотична кома
- C. Гіперосмолярна кома
- D. Печінкова кома
- E. Уремічна кома