

1. Який метод ціноутворення є доцільним під час розрахунку вартості одного відвідування?
- A. *Витратний
 - B. За шкалою ресурсів
 - C. Погодинної оплати
 - D. Фінансових ресурсів
 - E. Гонорарний
2. До гематолога звернулася жінка 38 років зі скаргами на загальну слабкість, головокружіння, мерехтіння мушок перед очима, ламкість нігтів, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки бліді, пульс - 90/хв., тони серця звучні, систолічний шум над усіма аускультивними точками. Hb - 85 г/л, еритроцити-3, 0- 10^{12} /л, КП- 0,7; лейкоцити -5,5- 10^9 /л, анізоцитоз, мікроцитоз. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Залізодефіцитна анемія
 - B. Гемолітична анемія
 - C. Гострий лейкоз
 - D. Гемофілія
 - E. Тромбоцитопенічна пурпуря
3. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на біль у животі з переважною локалізацією в правій здухвинній ділянці. Попередній діагноз - гострий апендицит. Які зміни в загальному аналізі крові характерні для цієї патології?
- A. *Лейкоцитоз
 - B. Лімфоцитоз
 - C. Еритроцитоз
 - D. Меноцитоз
 - E. Тромоцитоз
4. Перша фаза процесу управління - це розробка та прийняття управлінського рішення. Який із наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?
- A. *Попередній
 - B. Направляючий
 - C. Заключний
 - D. Поточний
 - E. Фільтруючий
5. Під час клінічного обстеження потерпілої жінки 48 років, яка отримала травму голови внаслідок побиття, виявлено: свідомість збережена, скарги на нездужання, сильний головний біль, запаморочення, нудоту. Який патологічний стан можна припустити?
- A. *Струс головного мозку
 - B. Перелом основи черепа
 - C. Перелом склепіння черепа
 - D. Вегето-судинна дисфункція
 - E. Забій головного мозку
6. Дитині 7 років була проведена проба Манту. Під час перевірки результатів проби виявлено інфільтрат діаметром 18 мм. Дайте оцінку результату проби:
- A. *Перергічна реакція
 - B. Негативна реакція
 - C. Позитивна реакція
 - D. Неправильно проведена проба

E. Сумнівна реакція

7. У медико-статистичних дослідженнях застосовуються різні методи спостереження. Яким за часом може бути статистичне спостереження?

- A. *Поточне
- B. Типологічне
- C. Суцільне
- D. Варіаційне
- E. Вибіркове

8. Працівник лабораторії опинився в зоні високої концентрації аміносполук у результаті несправності вентиляції. Відчув різку слабкість, запаморочення. Яка перша допомога в цьому разі?

- A. *Забезпечити доступ свіжого повітря
- B. Викликати блювання
- C. Промити шлунок водою
- D. Гарячий душ
- E. Призначити проносні

9. У пацієнта з інфарктом міокарда раптово вночі виник напад задухи, який супроводжувався кашлем із виділенням пінистого мокротиння рожевого кольору. Об'ективно: шкіра і слизові оболонки бліді, акроціаноз, шкіра вкрита холодним липким потом. Аускультивно: відзначаються негучні дрібно- і середньоміхурцеві хрипи в нижніх відділах легень. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. *Набряк легень
- B. Пневмонія
- C. Кардіогенний шок
- D. Бронхіальна астма
- E. Легенева кровотеча

10. У дитини 8 місяців встановлено діагноз паратрофія. Вкажіть основну клінічну ознаку цієї патології:

- A. *Збільшння маси тіла
- B. Діарейний синдром
- C. Прискорений психомоторний розвиток
- D. М'язова гіпотенція
- E. Гіпотермія

11. До приймального віddілення надійшла пацієнта зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. Об'ективно: екзофтальм, набряк повік, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 37,2°C, задишка, тахікардія, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. *Тиреотоксикоз
- B. Гіпотиреоз
- C. IХС
- D. Гіpertонічна хвороба
- E. Інфаркт міокарда

12. Під час мікроскопічного дослідження в мокротині виявлено еозинофільні лейкоцити, кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A. *Бронхіальна астма

- B. Туберкульоз легень
- C. Ексудативний плеврит
- D. Алергічний риніт
- E. Бронхеоктатична хвороба

13. На п'ятому етапі структури процесу управління відбувається контроль та оцінювання процесу і результатів управління, що забезпечує зворотній зв'язок між метою та результатом управління. На яких уміннях і навичках базується цей етап?

- A. *Аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання, корекція процесу і результату, прогнозування

B. Прогнозування, делегування, координування, корекція процесу

C. Аналіз, синтез, оцінювання, прогнозування

D. Синтез, узагальнення, коригування, оцінювання, прогнозування

E. Аналіз, регулювання, координування, прогнозування

14. У післяопераційній палаті перебуває пацієнта 27 років після операції кесаревого розтину з застосуванням епідуральної анестезії. Які тимчасові симптоми можуть спостерігатися в такому разі?

- A. *Втрата чутливості нижніх кінцівок

B. Порушення дихання

C. -

D. Патологічні рефлекси

E. Затримка сечовиділення

15. У чоловіка під час прийому їжі раптово виник сильний кашель, задуха, згодом він втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра ціанотична, пульсація на сонних артеріях слабка, самостійне дихання відсутнє. Яке невідкладне втручання треба застосувати насамперед у цьому разі?

- A. *Прийом Геймліха

B. Прекардіальний удар

C. -

D. Непрямий масаж серця

E. Штучна вентиляція легень

16. Дитина виписана із стаціонару, де перебувала на лікуванні з приводу гострого гломерулонефриту. Скільки часу буде тривати диспансерне спостереження за цією дитиною?

- A. *5 років

B. 6 місяців

C. 7 років

D. 1 рік

E. 3 роки

17. У чоловіка 43 років відзначаються зміни тембру голоса, збільшення носа та губ, кистей рук, стоп. Надлишок якого гормону в організмі може спричинити такі зміни?

- A. *Соматотропного

B. Адренокортикотропного

C. Гонадотропного

D. Антидіуретичного

E. Тиреотропного

18. Дитині 2 роки. Протягом останніх днів відзначалися катаральні явища, головний біль, посмикування м'язів, млявість, потім з'явився біль у хребті, рідкі випорожнення. На шостий день захворювання підвищилася температура тіла до 37,8°C, з'явився параліч нижніх кінцівок. В анамнезі пологова травма. Профілактичні щеплення не проводилися. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Поліомієліт
- B. Внутрішньомозкова травма
- C. Менінгококова інфекція
- D. Ротавірусна інфекція
- E. Шигельоз

19. У чоловіка 34 років діагностовано правосторонній гемоторакс. До якої пункції його потрібно підготувати?

- A. *Плевральної
- B. Люмбалальної
- C. Стернальної
- D. Абдомінальної
- E. Перикардиальної

20. З яких елементів складається вартість медичної послуги?

- A. *Собівартість, прибуток, податки
- B. Витрати на оплату праці, матеріальні витрати
- C. Собівартість, податки, амортизація
- D. -
- E. Собівартість, відрахування на соціальні витрати

21. Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 6 місяців. Який прийом може використати медсестра для попередження аспірації шлункового вмісту під час виймання зонда?

- A. *Перетиснути зонд
- B. Повільно вийняти зонд
- C. Закинути голову назад
- D. Швидко вийняти зонд
- E. Повернути голову набік

22. Пацієнта звернулася до медичного закладу зі скаргами на підвищення температури тіла, втрату апетиту, артралгію, біль у серці, еритематозну висипку на обличчі у вигляді «метелика». Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. *Системного червоного вовчака
- B. Системної склеродермії
- C. Дерматоміозиту
- D. Ревматоїдного артриту
- E. Хронічної ревматичної хвороби серця

23. У пацієнта з термічним опіком у ділянці тильної поверхні правої кисті відзначаються гіперемія шкіри та пухирі, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку?

- A. *II
- B. III-B
- C. III-A
- D. IV
- E. I

- 24.** Укажіть найбільш ефективний інструментальний метод діагностики внутрішньочеревної кровотечі у разі закритої травмі живота:
- A. *Лапароскопія
 - B. Сцинтиграфія
 - C. Рентгенографія
 - D. УЗД
 - E. Термографія
- 25.** Лікар призначив дитині, що хворіє на пневмонію, цефтриаксон в/м в дозі 700 мг. У флаконі 1 г препарату. Медична сестра ввела у флакон 5 мл розчинника. Скільки мл розведеного цефтриаксону повинна ввести дитині медична сестра?
- A. *3,5 мл
 - B. 5 мл
 - C. 4 мл
 - D. 2 мл
 - E. 2,5 мл
- 26.** Як відомо, матеріали володіють рядом властивостей. Як називається здатність матеріалу набувати нової форми під дією сили і зберігати цю форму після припинення дії сили?
- A. *Пластичність
 - B. Втома
 - C. Пружність
 - D. Твердість
 - E. Міцність
- 27.** Під час вивчення смертності серед населення міста було встановлено, що причиною смерті у 30% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% - новоутворення. Визначте статистичний характер наведених показників:
- A. *Екстенсивні
 - B. Співвідношення
 - C. Наочності
 - D. Інтенсивні
 - E. Відносної інтенсивності
- 28.** Що потрібно зробити в післяопераційному періоді з метою профілактики розходження країв операційної рані та евентерациї в тяжкохворих пацієнтів?
- A. *Застосувати бандаж
 - B. Покласти грілку
 - C. Лікувальні фізичні вправи
 - D. Покласти мішечок із піском
 - E. Покласти міхур із льодом
- 29.** Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?
- A. *Кабінет долікарського прийому
 - B. Терапевтичний кабінет
 - C. Кабінет медоглядів
 - D. Кабінет функціональної діагностики
 - E. Денний стаціонар

- 30.** Як називається документ державного зразка, який засвідчує право на провадження медичної практики за умов виконання спеціальних вимог?
- A. *Ліцензія
 - B. Закон
 - C. Розпорядження
 - D. Постанова
 - E. Наказ
- 31.** Головній медчині сестрі для оптимізації роботи ЛПЗ треба збільшити об'єм надання медичних послуг. Який з видів попиту створює резерв для поліпшення якості надання медичної послуги?
- A. *Прихований попит
 - B. Еластичний попит
 - C. Негативний попит
 - D. Стабільний попит
 - E. Нееластичний попит
- 32.** Списання товарів зі складу, термін придатності яких минув або вони стали непридатними, здійснюється на суму:
- A. *Не більше 0,1% від загального товарообігу
 - B. Не менше 0,7% від загального товарообігу
 - C. Не більше 0,5% від загального товарообігу
 - D. Не більше 10% від загального товарообігу
 - E. 50% від загального товарообігу
- 33.** Енергія першого розряду в разі використання біополярного дефібрилятора має становити:
- A. *150-200 Дж
 - B. 200-250 Дж
 - C. 300-350 Дж
 - D. 350-400 Дж
 - E. 250-300 Дж
- 34.** Пацієнт із черепно-мозковою травмою повторно втратив свідомість через 2 години після травми. Під час огляду визначається анізокорія. Яку патологію можна припустити?
- A. *Стиснення головного мозку
 - B. Непритомність
 - C. Забій головного мозку
 - D. Колапс
 - E. Струс головного мозку
- 35.** На сільській лікарській дільниці проводиться флюорографічне обстеження населення. До якого виду медичного огляду належить це обстеження?
- A. *Цільового
 - B. Комплексного
 - C. Попереднього
 - D. Миттєвого
 - E. Періодичного
- 36.** У пацієнтки 55 років скарги на підвищення температури тіла до 38,2°C, загальну слабкість, кашель із незначним виділенням мокротиння, біль у грудній клітці справа

під лопаткою під час глибокого вдоху та кашлі. Аускультивно: ослаблене везикулярне дихання та шум тертя плеври в нижніх відділах справа. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Сухий плеврит
- B. Туберкульоз легень
- C. Рак легень
- D. Негоспітальна низньодольова правобічна пневмонія
- E. Ексудативний плеврит

37. Створення необхідних умов праці та її регламентування є важливою передумовою підвищення ефективності роботи апарату управління. Де фіксуються вимоги до режиму роботи?

- A. *У правилах внутрішнього розпорядку
- B. У статуті організації
- C. В окремо виданому наказі
- D. У графіку роботи організації
- E. У положенні про апарат управління

38. У 4-річного хлопчика відзначається поява рожевого дрібно папульозного висипу по всьому тілу, підвищення температури. Під час огляду виявлені збільшені підщелепні, задньошийні і потиличні лімфовузли, щільні, рухомі, дещо болючі під час пальпації, шкіра над ними не змінена; елементи висипу не зливаються. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. *Краснуха
- B. Вітряна віспа
- C. Кір
- D. Скарлатина
- E. Алергічний дерматит

39. Назвіть симптом, характерний для латентної форми спазмофілії, який проявляється короткосильною зупинкою дихання внаслідок бельового подразнення голкою:

- A. *Симптом Маслова
- B. Симптом Пастернацького
- C. Симптом Щоткіна-Блюмберга
- D. Симптом Керніга
- E. Симптом Філатова

40. У пацієнтки 38 років після внутрішньом'язової ін'єкції в ділянці правої сідниці виник щільний болючий інфільтрат, шкіра над ним гіперемована, набрякла, пальпаторно визначається розм'якшення в центрі інфільтрату. Яку патологію можна припустити?

- A. *Абсцес
- B. Остеомієліт
- C. Фурункул
- D. Карбункул
- E. Флегмона

41. До лікарні госпіталізовано чоловіка 37 років у стані гіпоглікемічної коми. Яка невідкладна медична допомога надається в разі виникнення гіпоглікемічної коми?

- A. *Внутрішньовенне струминне введення 40% р-ну глюкози
- B. Внутрішньовенне струминне введення 5% р-ну глюкози

- C. Внутрішньовенне струминне введення інсуліну
D. Внутрішньовенне краплинне введення 10% р-ну глюкози
E. Внутрішньовенне краплинне введення 5 % р-ну глюкози
- 42.** Укажіть, яке захворювання прямої кишки належить до передракових станів і потребує обов'язкового диспансерного спостереження:
- A. *Поліп прямої кишки
B. Запалення слизової оболонки прямої кишки
C. Нориці прямої кишки
D. Геморой
E. Тріщини прямої кишки
- 43.** У новонародженої дитини на 3-й день життя з'явилася жовтяниця шкіри та слизових оболонок. Загальний стан не порушений, смокче активно, м'язовий тонус задовільний, рефлекси живі. З боку внутрішніх органів змін не виявлено. В аналізі крові: еритроцити - $5,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Hb - 170 г/л; в біохімічному аналізі крові загальний білірубін - 75 мкмоль/л за рахунок непрямого (65 мкмоль/л). Який стан виник у дитини?
- A. *Фізіологічна жовтяниця новонароджених
B. Гемолітична хвороба новонароджених
C. Вірусний гепатит
D. Холецистохолангіт
E. Паренхіматозна жовтяниця
- 44.** Які заходи виконує медична сестра, здійснюючи перший етап диспансерного обслуговування населення?
- A. *Відбір контингентів для диспансеризації
B. Санітарно-оздоровчі заходи
C. Санація осередків хронічної інфекції
D. Санітарно-освітня робота
E. Проведення комплексу лікування
- 45.** Який вид виробничого пилу найчастіше викликає розвиток пневмоконіозу?
- A. *Діоксид кремнію
B. Графіт
C. Алюміній
D. Кокс
E. Мука
- 46.** У результаті самозаймання вугілля в працівників шахти виникло отруєння чадним газом. Який колір шкіри характерний у разі отруєнні чадним газом?
- A. *Малиново-рожевий
B. Сіро-синій
C. Блідий
D. Жовтий
E. Бронзовий
- 47.** На третю добу післяопераційного періоду в пацієнта 72 років раптово виникли біль за грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, задишка, тахікардія. Шийні вени набряклі. Який стан можна припустити в пацієнта?
- A. *Тромбоемболію легеневої артерії
B. Кардіогенний шок

- C. Гіпертонічний криз
- D. Інфаркт міокарда
- E. Набряк легень

48. У дитини 2 років, яка хворіє на пневмонію, під час вимірювання температури тіла медична сестра зафіксувала її підвищення до 38,9°C. Укажіть першочергові дії медичної сестри в цьому разі:

- A. *Фізичні методи охолодження
- B. Антибактеріальна терапія
- C. Протигрибкова терапія
- D. Дезінтоксикаційна терапія
- E. Інгаляції зволоженим киснем

49. Дільнична медична сестра заповнює облікову медичну документацію. Яку форму медичної документації треба заповнити в разі виявлення пацієнта з ознаками інфекційного захворювання?

- A. *Ф - 058/о
- B. Ф - 031/о
- C. Ф- 030/о
- D. Ф - 003/о
- E. Ф - 025/о

50. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який із наведених показників належить до демографічних?

- A. *Народжуваність
- B. Первина захворюваність
- C. Летальність
- D. Травматизм
- E. Інвалідність

51. До стаціонару надійшов пацієнт з ознаками гострого отруєння фосфорорганічними пестицидами. Яку хімічну речовину застосовують для проведення антидотної терапії у разі цієї інтоксикації?

- A. *Атропіну сульфат
- B. Унітіол
- C. Метиленовий синій
- D. Пентацин
- E. Зволожений кисень

52. У хлопчика 4 років спостерігаються масивні кровотечі тривалого характеру після незначних травм. До стаціонару дитина госпіталізована з гемартрозом лівого колінного суглоба. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Гемофілія
- B. Лейкоз
- C. Геморагічний васкуліт
- D. Тромбоцитопенічна пурпуря
- E. Анемія

53. Взаємовідносини між керівником і колективом визначаються стилем керівництва управлінця. Що таке стиль роботи керівника?

- A. *Індивідуальний спосіб, який визначається індивідуально-психологічними

особливостями керівника і підлеглих

- B. Колективний спосіб симбіозу управління та працівників
- C. Індивідуальний спосіб, який визначається видом освіти управління та напрямком діяльності організації
- D. Індивідуальний спосіб, що залежить від моральних якостей, стратегічного мислення та рішучості лідера
- E. Колективний спосіб організації управління, що відповідає соціально-культурним нормам даного етносу

54. Бригадою екстреної медичної допомоги до приймального відділення доставлено пацієнта 37 років, у якого виявлені ознаки отруєння миш'яковмісними сполуками. Виберіть комплекс антидотної терапії у разі цієї інтоксикації:

- A. *Унітіол, тетацин кальцію
- B. Баралгін, дипіроксим
- C. Унітіол, хлорид кальцію
- D. Тетацин кальцію, адреналін
- E. Адреналін, дипіроксим

55. У пацієнта, який хворіє на хронічний гломерулонефрит, у клінічному аналізі сечі виявлені такі зміни: відносна густина - 1,005, білок - 0,99 г/л, еритроцити змінені 15-20 в полі зору. Призначений аналіз сечі за Зимницьким. Які показники відносної густини сечі в пробі за Зимницьким характерні для гіпоізостенурії?

- A. *1,008-1,010
- B. 1,018-1,020
- C. 1,015-1,018
- D. 1,020-1,025
- E. 1,020-1,022

56. Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на:

- A. *Формування здорового способу життя
- B. Оптимізацію управління охорони здоров'я
- C. Розробку заходів з охорони довкілля
- D. Надання медичної допомоги на засадах ПМСД
- E. Збір статистичних відомостей про стан здоров'я населення

57. Медичному персоналу хірургічного відділення треба обробити руки за методом Бруно. Який антисептик слід підготувати та протягом якого часу виконувати обробку рук?

- A. *96% етиловий спирт, протягом 10 хв.
- B. 70% етиловий спирт, протягом 5 хв.
- C. 96% етиловий спирт, протягом 3 хв.
- D. 70% етиловий спирт, протягом 15 хв.
- E. 96% етиловий спирт, протягом 15 хв.

58. Кесонна хвороба - захворювання, яке розвивається внаслідок роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску. Основним фактором патогенезу кесонної хвороби є:

- A. *Емболія кровоносних судин
- B. Зменшення легеневої вентиляції
- C. Ангіоспазм
- D. Обструкція бронхів
- E. Тромбоз кровоносних судин

- 59.** До лікарні надійшов пацієнт із попереднім діагнозом гострий панкреатит. Яке дослідження буде найбільш інформативним для уточнення діагнозу?
- A. *Визначення амілази крові
 - B. Оглядовий знімок грудної клітки
 - C. Загальний аналіз крові
 - D. Зняття ЕКГ
 - E. Оглядовий знімок черевної порожнини
- 60.** Під час первинного патронажу новонародженого сімейна медсестра виявила в дитини задишку, ціаноз шкіри, який посилюється під час плачу, годуванні та дефекації. Яку патологію можна припустити в дитини?
- A. *Вродженну ваду серця
 - B. Анемію
 - C. Пологову травму
 - D. Асфіксію
 - E. –
- 61.** У дитини, що хворіє на холецистохолангіт, визначається біль, який виникає під час постукування ребром долоні по правій реберній дузі. Такий симптом називається:
- A. *Позитивний симптом Ортнера
 - B. Позитивний симптом Гrottа
 - C. Позитивний симптом Мерфі
 - D. Позитивний симптом Оппенгейма
 - E. Позитивний симптом Кера
- 62.** Процес, що спрямований на забезпечення пропорційного і гармонічного розвитку різних сторін об'єкта при оптимальних витратах ресурсів, це:
- A. *Координація
 - B. Планування
 - C. Контроль
 - D. Регулювання
 - E. Мотивація
- 63.** До поліклініки звернувся пацієнт 38 років із пораненням шкіри та м'яких тканин лівого стегна. З'ясувалося, що пацієнт працює лісником, поранився під час проведення земляних робіт. Відомо, що протягом 4-х останніх років пацієнт не отримував жодних щеплень. Який препарат слід використати для екстреної профілактики правця в цьому разі?
- A. *Правцевий анатоксин
 - B. Правцевий анатоксин та протиправцеву сироватку
 - C. АКДС
 - D. Протиправцеву сироватку
 - E. Протиправцевий імуноглобулін
- 64.** Приватний медичний заклад очолює керівник, який виконує всі функції управління. Йому підпорядкований кожен із членів колективу медичної установи. Всі виконують тільки його вказівки. Зазначте тип управління:
- A. *Лінійний тип управління
 - B. Функціональний тип управління
 - C. Лінійно-штабний тип управління
 - D. Матричний тип управління
 - E. Дивізіональний тип управління

65. У новоствореному хірургічному відділенні старша медична сестра повинна застосувати організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління персоналом. Що із наведеної належить до організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів управління?

- A. *Рішення
- B. Покарання
- C. Нагородження
- D. Примус
- E. Мотивація

66. В Україні на неонатальний період припадає 53% випадків смерті немовлят. Який це тип смертності немовлят?

- A. *Тип А
- B. Тип С
- C. Регресивний
- D. Тип В
- E. Прогресивний

67. У хлопчика 4 років за 30 хвилин після укусу бджоли з'явилися занепокоєння, набряк повік та губ, гіперемія та свербіння обличчя, охриплість голосу. Який стан виник у дитини?

- A. *Набряк Квінке
- B. Генералізована кропивниця
- C. Гострий алергічний ларингіт
- D. Анафілактичний шок
- E. Алергічний кон'юнктивіт

68. Завідувачем офтальмологічним відділенням було надано головному лікарю документ, який містить відомості про виконання плану за минулий рік. Укажіть вид документу:

- A. *Звіт
- B. Пояснювальна записка
- C. Розпорядження
- D. Посадова інструкція
- E. Наказ

69. Пацієнт скаржиться на сухий нападоподібний кашель, підвищення температури тіла до 37,5°C. Захворів 3 дні тому, не лікувався. Об'єктивно: над легенями перкуторний звук не змінений, аускультивно - дихання жорстке, ЧДР - 20/хв. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Гострого бронхіту
- B. Бронхіальної астми
- C. Абсцесу легень
- D. Бронхектатичної хвороби
- E. Пневмонії

70. Дитина 3-х місяців за наявними протипоказаннями не була вчасно щеплена вакциною БЦЖ. На теперішній час здорована. За яких умов можна розпочати профілактичні щеплення дитині?

- A. *Після ретельного обстеження та негативної проби Манту
- B. Після ретельного обстеження та позитивної проби Манту
- C. Після наступної планової вакцинації за календарем щеплень

- D. Після ретельного обстеження
- E. Відкласти щеплення до виповнення 7 років

71. Дівчинка 8 років під час проведення забору крові з вени для біохімічного аналізу зблідла, почала повільно опускатися на підлогу, втратила свідомість. Який стан виник у дитини?

- A. *Непритомність
- B. Гіпоглікемічна кома
- C. Гіперглікемічна кома
- D. Анафілактичний шок
- E. Алергічний діатез

72. У пацієнтки, що хворіє на хронічну ревматичну хворобу серця, аускультивно вислуховується послаблення I тону і систолічний шум на верхівці серця. Яке вада серця найбільш імовірна?

- A. *Мітральна недостатність
- B. Тріада Фалло
- C. Дефект міжшлуночкової перегородки
- D. Аортальна недостатність
- E. Мітральний стеноз

73. Пацієнтка скаржиться на гострий біль в епігастральній ділянці, який з'являється через 20-30 хвилин після вживання їжі, блювання на висоті болю, відрижку. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Виразкову хворобу шлунка
- B. Рак шлунка
- C. Виразкову хворобу 12-палої кишki
- D. Гострий гастрит
- E. Хронічний гастрит

74. Один із побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в цьому разі?

- A. *Крепітація
- B. Шум тертя плеври
- C. Шум тертя перикарда
- D. Плевроперикардіальний шум
- E. Дрібноміхурцеві хрипи

75. Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на оперізуючий біль у животі, нудоту, блювання та діарею, які виникли після вживання смаженої картоплі. Яку патологію можна припустити в пацієнтки?

- A. *Гострий панкреатит
- B. Гострий гастрит
- C. Гострий ентероколіт
- D. Виразкова хвороба шлунку
- E. Жовчнокам'яна хвороба

76. До емпіричних методів наукового дослідження належить:

- A. *Експеримент
- B. Моделювання

- C. Класифікація
- D. Абстрагування
- E. Порівняння

77. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з наведеною слід використати для його нейтралізації?

- A. *Налоксон
- B. Атропін
- C. Мезатон
- D. Адреналін
- E. Прозерин

78. У пацієнта 25 років, який лікується з приводу виразкової хвороби шлунка, раптово винikли скарги на загальну слабкість, головокружіння, блювання у вигляді «кавової гущі». Які незалежні медсестринські вtrучання першочергово повинна виконати медична сестра в цьому разі?

- A. *Покласти міхур із льодом на епігастральну ділянку
- B. Дати тепле солодке пиття
- C. Ввести кровозупинні препарати
- D. Увести знеболювальні препарати
- E. Покласти грілку на епігастральну ділянку

79. Медична сестра хірургічного відділення оглядає чоловіка 45 років зі скаргами на появу округлого утворення в ділянці пупка, яке виникло після фізичного навантаження. Об'єктивно: в ділянці пупка пальпується пухлиноподібне утворення до 5 см в діаметрі, м'яко-еластичної консистенції, в горизонтальному положенні вправляється в черевну порожнину. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Пупкова кила
- B. Фіброма
- C. Ліпома
- D. Омфаліт
- E. Флегмона

80. Для якого з наведених пневмоконіозів є характерним зменшення симптоматики у вихідні дні та наступне її посилення в робочі дні («синдром понеділка»):

- A. *Бісиноз
- B. Талькоз
- C. Антракоз
- D. Саркоїдоз
- E. Азбестоз

81. Сільська лікарська дільниця організовується для надання медичної допомоги мешканцям поселень, віддалених від районного центру. Що входить до складу сільської лікарської дільниці?

- A. *Дільнична лікарня, лікарська амбулаторія, фельдшерсько-акушерські пункти
- B. Районна лікарня, дільнична лікарня, фельдшерсько-акушерські пункти
- C. Дільнична лікарня, лікарська амбулаторія, жіноча консультація
- D. Дільнична лікарня, лікарська амбулаторія, диспансер
- E. Дільнична лікарня, лікарська амбулаторія, диспансер, фельдшерсько-акушерські пункти

- 82.** Постраждалий чоловік на полі бою отримав проникаюче поранення грудної клітки. Яке положення на період транспортування необхідно надати пацієнту з пневмотораксом?
- A. *Напівсидяче
 - B. З опущеною головою
 - C. Горизонтальне на животі
 - D. Горизонтальне на спині
 - E. З піднятими ногами
- 83.** Старша медична сестра приймального відділення подала головному лікарю документ про порушення виконання посадової інструкції старшою медичною сестрою гінекологічного відділення. Вкажіть вид документу:
- A. *Доповідна записка
 - B. Пояснювальна записка
 - C. Наказ
 - D. Розпорядження
 - E. Характеристика
- 84.** У великому місті проводиться оцінка організації медичної допомоги населенню. Який показник діяльності визначає медичну, соціальну та економічну ефективність роботи медичних закладів?
- A. *Коефіцієнт ефективності
 - B. Коефіцієнт досягнення результату
 - C. Рівень якості диспансеризації
 - D. Рівень якості лікування
 - E. Обґрунтовані скарги
- 85.** До пульмонологічного відділення надійшов пацієнт, якому встановлений по-передній діагноз бронхіальна астма. Яка тріада клінічних ознак характерна для цього захворювання?
- A. *Експіраторна задишка, сухі хрипи, скловидне мокротиння
 - B. Задишка, сухий кашель, кровохаркання
 - C. Інспіраторна задишка, клекочуче дихання, вологі хрипи
 - D. Задишка, вологі хрипи, крепітация
 - E. Змішана задишка, кашель, крепітация
- 86.** До якої групи якостей менеджера належать вміння оперативно змінювати рішення, формувати команду, мотивувати працівників, ефективно організовувати час, доводити справи до логічного завершення, запозичувати досвід підлеглих?
- A. *Адміністративно-організаційні якості
 - B. Моральні
 - C. Соціально-психологічні
 - D. Національно-патріотичні
 - E. Професійно-ділові
- 87.** До урологічного відділення надійшов чоловік з попереднім діагнозом розрив сечового міхура. Яке спеціальне дослідження потрібно провести для уточнення діагнозу?
- A. *Цистографія
 - B. Висхідна пієлографія
 - C. Внутрішньовенна урографія
 - D. Катетеризація сечоводів

E. Хромоцистоскопія

- 88.** Медсестра хірургічного відділення здала на стерилізацію перев'язувальний матеріал. Укажіть температурний режим і тривалість стерилізації перев'язувального матеріалу в паровому стерилізаторі:
- A. *120°C, 45 хв.
 - B. 100°C, 90 хв.
 - C. 150°C, 20 хв.
 - D. 132°C, 10 хв.
 - E. 180°C, 20 хв.
- 89.** До судинного хірурга звернулася вагітна жінка зі скаргами на біль у ногах та появу набряків на них наприкінці дня. Який вид судинної патології нижніх кінцівок трапляється під час вагітності найчастіше?
- A. *Варикозне розширення вен
 - B. Облітеруючий ендартеріїт
 - C. Хвороба Рейно
 - D. Гострий тромбоз артерії
 - E. Атеросклероз
- 90.** До сімейної медсестри звернулася пацієнтки зі скаргами на загальну слабкість, зниження працездатності, головний біль, запаморочення, задишку, кровоточивість ясен, носові кровотечі, субфебрильну температуру. В загальному аналізі крові - панцитопенія. Для якої анемії це характерно?
- A. *Апластичної
 - B. Залізодефіцитної
 - C. Мегалобластної
 - D. Гемолітичної
 - E. Постгеморагічної
- 91.** У колективі терапевтичного відділенні створився несприятливий соціально-психологічний клімат. Що може бути причиною цього?
- A. *Низька культура спілкування в колективі
 - B. Невдоволення розміром заробітної плати
 - C. Чітка організація праці
 - D. Оптимальний підбір і розстановка кадрів
 - E. Погодженість у керівництві
- 92.** У дитини 5 років відзначається біль у горлі, головний біль, нежить, слюзоточивість, світлобоязнь, підвищення температури тіла до 39°C, висипання на шкірі. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок виявлений плямисто-папульозний висип із тенденцією до злиття на незміненому фоні шкіри. З анамнезу відомо, що висип у перший день з'явився за вухами, потім на обличчі, на другий день - на тулубі, кінцівках. Яке захворювання можна припустити?
- A. *Кір
 - B. Вітряна віспа
 - C. Менінгококцемія
 - D. Скарлатина
 - E. Краснуха
- 93.** Для оформлення дитини в школу мати прийшла до дитячої поліклініки. Медсестра провела антропометрію. За якою формулою вираховується середній зріст

дитини після 1 року життя?

- A. * $75 + 5n$
- B. $m + 650$ ($550 - n$)
- C. $100 + 6(n - 4)$
- D. $10 + 2n$
- E. $800 + 50n$

94. Процес складання стислої характеристики документа, його частин або групи документів із погляду призначення, змісту, форми та інших особливостей - це:

- A. *Анотування
- B. Бібліографічний опис
- C. Індексування
- D. Підготовка оглядових творів
- E. Реферування

95. У разі виявлення нестачі, зіпсованості, бою медичних товарів, приймальний акт треба складати:

- A. *В 3-х примірниках
- B. В 4-х примірниках
- C. В 5-х примірниках
- D. В 2-х примірниках
- E. В 6-х примірниках

96. Якому освітленню треба надавати перевагу під час організації робочого місця медичної сестри кабінету щеплень у дитячій поліклініці?

- A. *Природному
- B. Немає значення
- C. Змішаному
- D. –
- E. Штучному

97. У новонародженого хлопчика на 3-й день життя з'явилася припухлість у ділянці грудних залоз, шкіра над припухлістю не змінена, температура тіла нормальна, загальний стан не порушений, годування задовільне. Який стан виник у дитини?

- A. *Статевий криз
- B. Флегмона грудної залози
- C. Катаральний мастит
- D. Абсцес грудної залози
- E. Пухлина грудної залози

98. Як називається вид медичної допомоги, що надається пацієнтам, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах?

- A. *Стационарна медична допомога
- B. Амбулаторно-поліклінічна медична допомога
- C. Екстрена медична допомога
- D. Реабілітаційна медична допомога
- E. Санаторно-курортна медична допомога

99. Згідно з результатами бактеріологічного обстеження поліклініки, старша медсестра поліклініки прийняла певні рішення щодо посилення протиепідемічного

режimu. Якому рівню управління відповідають ці рішення?

- A. *Оперативному
- B. Тактичному
- C. Перспективному
- D. Стратегічному
- E. Координаційному

100. Вивчення динаміки явищ є важливим складником аналізу здоров'я та діяльності системи охорони здоров'я. Назвіть, які показники застосовують для аналізу динаміки:

- A. *Темп росту, абсолютний приріст, темп приросту
- B. Показник співвідношення, наочності, інтенсивності
- C. Відносні величини, абсолютні величини
- D. Мода, медіана, частота, амплітуда
- E. Середні величини, відносні величини

101. Пацієнта 37 років госпіталізована до хірургічного відділення. Проведена операція - лапаротомія, спленектомія. В черевній порожнині виявлено 1,5 л крові. Під час операції перелито 1 л консервованої крові. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку:

- A. *10% розчин кальцію хлориду
- B. 1 % розчин вікасолу
- C. 0,9% розчин натрію хлориду
- D. 12,5% розчин дицинону
- E. 5% розчин амінокапронової кислоти

102. Пацієнта 35 років звернулася до лікаря зі скаргами на ранкову скутість, біль і деформацію дрібних суглобів кистей рук і стоп. Об'єктивно: кисті рук у вигляді «ластів моржа». Для якого захворювання характерні такі клінічні ознаки?

- A. *Ревматоїдного артриту
- B. -
- C. Системного червоного вовчака
- D. Остеохондрозу
- E. Деформуючого остеоартрозу

103. До сімейної медичної сестри звернулася мати з дитиною 4 років. Зі слів матері дитина хворіє другий день. Під час огляду виявлено: температура тіла - 38,5°C, блідість носогубного трикутника, відмежована гіперемія м'якого піднебіння, скupчення гною в лакунах мигдаликів; на помірно гіперемованій шкірі тулуба дрібно крапковий висип із переважною локалізацією в природних складках. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Скарлатина
- B. Менінгококцемія
- C. Краснуха
- D. Вітряна віспа
- E. Kip

104. Існує декілька моделей медичного страхування. Як називається модель державної системи охорони здоров'я, основними принципами якої є безкоштовність, загальна доступність кваліфікованої медичної допомоги, профілактична спрямованість, професійний високоякісний догляд, тісний зв'язок медичної науки та практики?

- A. *Модель Семашка
- B. Модель Беверіджа
- C. Модель Бісмарка
- D. Фінансова модель
- E. Приватна модель

105. У 3-річної дитини спостерігаються симптоми, характерні для кашлюку. Вкажіть, які з наведених симптомів є типовими для цього захворювання:

- A. *Кашель із репризами
- B. Гавкаючий кашель
- C. Дистанційні хрипи
- D. Інспіраторна задишка
- E. Експіраторна задишка

106. Старша медсестра ендокринологічного відділення отримала з аптечного складу флакони інсуліну. Вкажіть умови їх зберігання:

- A. *У холодильнику
- B. На підвіконні
- C. У шафі
- D. У морозильній камері
- E. На стелажі

107. Пацієнт 49 років надійшов до хірургічного відділення з різаною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що потрібно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

- A. *Сироватку пацієнта та еритроцити донора
- B. Сироватку пацієнта та розчин поліглюкіну
- C. Еритроцити пацієнта та розчин желатину
- D. Еритроцити пацієнта та сироватку донора
- E. Сироватку пацієнта та сироватку донора

108. Дівчинка 5 років скаржиться на свербіння навколо анального отвору, що посилюється вночі. Дитина дратівлива, погано спить, апетит знижений. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. *Ентеробіоз
- B. Кір, катаральний період
- C. Тріхоцефальоз
- D. Аскаридоз
- E. Бронхіальна астма, приступний період

109. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуєчи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень у практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A. *Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- C. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником
- D. Нової теми досліджень
- E. Регламенту

110. Управлінець повинен розвивати в собі якості, які забезпечуватимуть і формуватимуть ефективний стиль діяльності. Якими якостями не повинен бути наділений менеджер?

- A. *Авторитаризмом
- B. Внутрішнім контролем
- C. Чесністю
- D. Лідерськими здібностями
- E. Високою професійністю

111. До медичного закладу звернулась жінка зі скаргами на головний біль, шум у голові, біль у ділянці серця, зниження працездатності та іноді носові кровотечі. Під час огляду: верхівковий поштовх посилиний, акцент II тону над аортю, АТ - 185/100 мм рт. ст. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Гіпертонічна хвороба
- B. Ішемічна хвороба серця
- C. Гіпотенія
- D. Міокардит
- E. Хронічна ревматична хвороба серця

112. У пацієнта 35 років скарги на кашель із виділенням великої кількості гнійно-слизового мокротиння «повним ротом», озnob та періодичне підвищення температури тіла до 38,5-39°C. Мокротиння має неприємний запах, при відстоюванні ділиться на 3 шари. Яку патологію можна припустити в пацієнта?

- A. *Бронхоектатичну хворобу
- B. Сухий плеврит
- C. -
- D. Гострий бронхіт
- E. Пневмонію

113. Під час обстеження пацієнта медсестра провела топографічну перкусію. Що визначають за допомогою цього обстеження?

- A. *Межі органів
- B. Звуки в симетричних ділянках
- C. Функціональні шуми
- D. Патологічні рефлекси
- E. Флюктуацію

114. Дільнична медсестра проводить первинний патронаж новонародженої дитини. Який стан м'язового тонусу характерний для здорового немовляти?

- A. *Гіпертонус згиначів верхніх і нижніх кінцівок
- B. Знижений тонус м'язів тулуба
- C. Гіпотенія м'язів верхніх і нижніх кінцівок
- D. Нестабільність м'язового тонусу
- E. Підвищений тонус м'язів тулуба

115. Дитині 7 днів. Народилася з масою 4200 г, довжиною тіла 59 см. Пологи були стрімкі, в потиличному передлежанні. Об'єктивно: в ділянці потиличної кістки пальпуються пухлина м'якої консистенції, обмежена цією кісткою, не болюча та не пульсує, поверхня шкіри над нею не змінена. Загальний стан не порушений. Для якої пологової травми характерні такі симптоми?

- A. *Кефалогематома
- B. Підшкірний крововилив
- C. Запалення головного мозку
- D. Водянка головного мозку
- E. Пологова пухлина

116. В альпініста, який піднявся на висоту 4,5 км над рівнем моря, виникли сонливість, апатія, погіршився зір, порушилася координація рухів, з'явилися задишка, нудота, блювання, носова кровотеча. Що спричинило розвиток вказаних симптомів?

- A. *Знижений парціальний тиск кисню в повітрі
- B. Кесонна хвороба
- C. Підвищений атмосферний тиск
- D. Знижений атмосферний тиск
- E. Підвищений парціальний тиск кисню в повітрі

117. Дитина 6 років хворіє на цукровий діабет. Натще зробила інтенсивну ранкову гімнастику, після чого в неї з'явилися відчуття голоду, тремор кінцівок. Для запобігання розвитку гіпоглікемічної коми медсестра порекомендує дитині негайно:

- A. *Випити солодкий чай
- B. Випити лужної води
- C. Увести седуксен
- D. Випити регідрон
- E. Увести інсулін

118. Пацієнт 67 років надійшов до відділення проктології зі скаргами на біль під час акту дефекації, періодичне виділення крові з прямої кишki, хронічне порушення випорожнень. До якого додаткового методу діагностики потрібно підготувати пацієнта в цьому разі?

- A. *Ректороманоскопії
- B. Цистоскопії
- C. Лапароскопії
- D. Фіброгастродуоденоскопії
- E. УЗД

119. Пацієнт надійшов до гематологічного відділення зі скаргами на загальну слабкість, біль у кістках і суглобах, гарячку, біль у горлі. Під час огляду виявлені виразково-некротичні зміни слизової оболонки рота, збільшення шийних лімфатичних вузлів, крововиливи на шкірі. В периферичній крові - бластні клітини. Для якого захворювання це характерно?

- A. *Гострого лейкозу
- B. Залізодефіцитної анемії
- C. Лімфогранулематозу
- D. Тромбоцитопенічної пурпури
- E. Геморагічного васкуліту

120. Старша медична сестра кардіологічного відділення на початку робочого дня проводить нараду з працівниками відділення. Вкажіть мету її проведення:

- A. *Передача інформації, планування роботи
- B. Обмін інформацією
- C. Проведення інструктування працівників
- D. Розгляд скарг
- E. -

- 121.** У результаті ускладнених пологів народилася недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. До якого показника смертності належить цей випадок?
- A. *Постнеонатальна смертність
 - B. Перинатальна смертність
 - C. Рання неонатальна смертність
 - D. Загальний показник смертності
 - E. Неонатальна смертність
- 122.** Для проведення експертизи непрацездатності тривалохворіючих пацієнтів у поліклініці залучається ЛКК (лікарська консультативна комісія). На який максимальний термін ЛКК має право видати листок непрацездатності у разі безперервного захворювання?
- A. *4 місяці
 - B. 1 місяць
 - C. 5 місяців
 - D. 3 місяці
 - E. 2 місяці
- 123.** Дитині 13 років із попереднім діагнозом хронічний гастрит призначенні лабораторно-інструментальні дослідження для уточнення діагнозу. Застосування якого методу дослідження дозволяє оцінити секреторну функцію шлунка?
- A. *рН -метрія
 - B. УЗД черевної порожнини
 - C. Фіброезофагогастродуоденоскопія
 - D. Фіброколоноскопія
 - E. Дуоденальне зондування
- 124.** Пацієнта 39 років госпіталізовано до хірургічного відділення з великою крововтратою внаслідок шлунково-кишкової кровотечі. Ризик виникнення якого шоку можливий у цього пацієнта?
- A. *Геморагічного
 - B. Цитратного
 - C. Гемотрансфузійного
 - D. Кардіогенного
 - E. Анафілактичного
- 125.** Для покращення використання медичних та фармацевтичних товарів застосовується їх класифікація. Виберіть терміни, якими позначаються вищі категорії класифікації медичних та фармацевтичних товарів:
- A. *Розділ, підрозділ, клас, підклас
 - B. Розділ, клас, група
 - C. Група, підгрупа, вид
 - D. Вид, підвид
 - E. Розділ, вид
- 126.** На заняттях із медсестринським персоналом старша медична сестра розповіла про ліцензування медичних установ. У чому полягає основне завдання ліцензування?
- A. *Оцінка можливості надання різних видів медичної допомоги та послуг у лікувально-профілактичному закладі
 - B. Підвищення якості медичної допомоги
 - C. Захист пацієнтів від некомpetентного втручання некваліфікованих фахівців
 - D. Визначення та присвоєння лікувальному закладу певної категорії

E. Оптимізація структури лікувально- профілактичних закладів регіону

127. У дитини 8 місяців, яка перебуває на штучному вигодовуванні, спостерігаються блідість шкіри, зменшення підшкірної жирової клітковини на животі. Дефіцит маси тіла - 18%. Який розлад живлення в дитині?

- A. *Гіпотрофія I ступеня
- B. Гіпотрофія III ступеня
- C. Нормотрофія
- D. Паратрофія
- E. Гіпотрофія II ступеня

128. Під час проведення оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A. *Вартість медичних послуг
- B. Показники повторних купівель
- C. Імовірні стратегії конкурентів
- D. Загальні та відносні витрати
- E. Співвідношення збиту й цін

129. Назвіть фінансовий документ медичного закладу, в якому відображені прибутки і витрати на майбутній фінансовий рік, вказані джерела дохідної частини і статті витрат:

- A. *Кошторис закладу
- B. Фінансовий запит
- C. Пояснювальна записка
- D. Фінансовий звіт
- E. План зростання виробництва

130. У пацієнта періодично вночі з'являється гострий біль у великому пальці лівої стопи. Під час огляду виявлено: почевоніння та набряклість шкіри в ділянці великого пальця лівої стопи, різке обмеження рухів. У крові - підвищення рівня сечової кислоти. Розвиток якого захворювання можна припустити в пацієнта?

- A. *Подагри
- B. Ревматоїдного артриту
- C. Синдрому Рейтера
- D. –
- E. Деформуючого остеоартрозу

131. У пацієнта відкритий перелом правого стегна з пошкодженням стегнової артерії. З чого слід розпочати невідкладну допомогу такому пацієнту?

- A. *З накладанням артеріального джгута
- B. З наданням горизонтального положення
- C. З проведеннем туалету рані стегна
- D. З проведеннем іммобілізації кінцівки
- E. З внутрішньовенного знеболювання

132. У післяопераційному періоді пацієнту з гастростомою під час перев'язки для попередження мацерації шкіри найдоцільніше застосувати:

- A. *Пасту Лассара
- B. Хімотрипсин
- C. Розчин фурациліну
- D. Гіпертонічний розчин

E. Розчин перекису водню

133. Пацієнту з діагнозом гострий піөлонефрит призначене дослідження сечі за методом Зимницького. Яку функцію нирок допомагає оцінити ця проба?

- A. *Концентраційну
- B. Кислотовидільну
- C. Фільтраційну
- D. Азотовидільну
- E. Еритропоетичну

134. Бригадою екстреної медичної допомоги до приймального відділення доставлений пацієнт без свідомості. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, очні яблука м'які. Дихання у вигляді ритмічних рідких дихальних циклів з глибоким шумним вдихом і посищеним видихом. Цей тип дихання має назву:

- A. *Куссмауля
- B. Інспіраторна задишка
- C. Задуха
- D. Біота
- E. Чейна-Стокса

135. Який метод обстеження під час періодичних медоглядів найбільш інформативний для виявлення хворих на пневмоконіоз?

- A. *Рентгенографія органів грудної клітки
- B. Перкусія органів грудної клітки
- C. Проба Манту
- D. Аускультація органів грудної клітки
- E. Спірометрія

136. Пацієнт скаржиться на погіршення апетиту, відразу до м'яса, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці. Протягом останнього місяця схуд на 5 кг. Турбує загальна слабкість, швидка стомлюваність, зниження працездатності. Об'єктивно: шкіра обличчя землистого кольору. Для якого захворювання характерні вказані ознаки?

- A. *Рак шлунку
- B. Цироз печінки
- C. Хронічний гастрит
- D. Виразкова хвороба шлунку
- E. Хронічний гепатит

137. Границя максимальна вартість, за яку пацієнти згодні отримувати медичну послугу, називається:

- A. *Ціна попиту
- B. Ціна прибутку
- C. Ціна пропонування
- D. Ринкова ціна
- E. Ціна збитку

138. Який документ визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність?

- A. *Клінічний протокол
- B. Табель матеріально-технічного оснащення
- C. Стандарт медичної допомоги (медичний стандарт)
- D. Лікарський формулляр

E. Національний перелік

139. У пацієнта 40 років виник напад ниркової коліки. Яку долікарську допомогу має надати медична сестра пацієнту в цьому разі?

- A. *Покласти грілку на поперекову ділянку
- B. Провести гемостатичну терапію
- C. Провести катетеризацію сечового міхура
- D. Зробити очисну клізму
- E. Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку

140. Після введення інсуліну пацієнт, який хворіє на цукровий діабет I типу, відчув трепетіння кінцівок, з'явилося відчуття голоду, шкіра вкрилася холодним потом, згодом втратив свідомість. Який стан розвинувся в пацієнта?

- A. *Гіпоглікемічна кома
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Непритомність
- D. Судомний напад
- E. Колапс

141. Дитина 7 місяців захворіла раптово. Підвищилася температура тіла до 38,6°C, з'явилися блювання, рідкі випорожнення, неспокій. Стан дитини тяжкий. Шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин знижений, спостерігається втрата маси тіла. З чого слід розпочати лікування дитини?

- A. *Регідратаційної терапії
- B. Антибактеріальної терапії
- C. Призначення пробіотиків
- D. Дієтотерапії
- E. Призначення ферментів

142. Працівнику центру медичної статистики потрібно розрахувати демографічні показники. Вкажіть основне джерело інформації про чисельність і склад населення:

- A. *Перепис населення
- B. Смертність немовлят
- C. Народжуваність
- D. Смертність населення
- E. Звернення до лікувально-профілактичного закладу

143. Яке обстеження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу гострий лейкоуз?

- A. *Стернальна пункція
- B. Загальний аналіз крові
- C. Аналіз сечі за Зимницьким
- D. Біохімічний аналіз крові
- E. Цистографія

144. Пацієнт госпіталізований до терапевтичного відділення з діагнозом сухий плеврит. Його турбує біль у правій половині грудної клітки, посилюється при глибокому вдиху; шум тертя плеври відчувається долонею. Якого положення слід надати пацієнту для полегшення стану?

- A. *На правому боці
- B. На лівому боці
- C. На животі

- D. На спині
- E. Напівсидяче

145. Чоловік 45 років, хворіє на бронхіальну астму. Назвіть метод діагностики, який дає можливість щоденно контролювати стан прохідності бронхів:

- A. *Пікфлуометрія
- B. Спірометрія
- C. Бронхографія
- D. Дослідження мокротиння
- E. Бронхоскопія

146. Який різновид тарифів передбачає сплату надавачам медичних послуг фіксованої суми за визначену кількість послуг чи визначений період?

- A. *Глобальна ставка
- B. Ставка за медичну послугу
- C. Оплата за діагностично-споріднену групу
- D. Ставка на пролікований випадок
- E. Ставка за результатами виконання договорів про медичне обслуговування

147. Мати 8-річного хлопчика скаржиться на появу в дитини рідких випорожнень з великою кількістю слизу та прожилками крові, тенезми, підвищення температури тіла до 38,5°C. Для якого захворювання найбільш характерні такі симптоми?

- A. *Шигельозу
- B. Вірусного гепатиту
- C. Сальмонельозу
- D. Вірусної діареї
- E. Холери

148. Операційна сестра готує первомур для обробки рук. Які головні антисептичні засоби необхідні для його приготування?

- A. *171 мл 30-33% перекису водню та 69 мл 100% мурашиної кислоти
- B. 171 мл 30-33% етилового спирту та 69 мл 100% мурашиної кислоти
- C. 171 мл 30-33 % перекису водню та 69 мл 100% сірчаної кислоти
- D. 100 мл 6% перекису водню та 70 мл 30-33% мурашиної кислоти
- E. 17 мл 30-33% перекису водню та 69 мл 50% мурашиної кислоти

149. До приймального відділення надійшла пацієнта 42 років, зі скаргами на різкий біль у животі та поперековій ділянці зліва, часте сечовипускання невеликими порціями. Біль виник раптово, раніше вже спостерігалися подібні напади. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом, живіт м'який, здутий, позитивний симптом Пастернацького. У сечі виявлені свіжі еритроцити в значній кількості. Яке захворювання можна припустити?

- A. *Сечокам'яна хвороба
- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий піелонефрит
- D. Травма нирок
- E. Гострий гломерулонефрит

150. Пацієнту проводиться туберкулінова проба Манту. Через який час оцінюють результати цієї проби?

- A. *72 год.
- B. 96 год.

- C. 48 год.
- D. 24 год.
- E. 12 год.