

1. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.

- a. Гепарин
- b. Лізоцим
- c. Фібринолізин
- d. Гістамін
- e. Гірудин

Правильна відповідь: Гірудин

2. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок.

- a. Швидка втомлюваність
- b. Підвищена пітливість
- c. Порушення менструального циклу
- d. Субфебрилітет
- e. Безпліддя

Правильна відповідь: Безпліддя

3. Вкажіть місце накладання електроду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- a. Права рука
- b. Ліва рука
- c. —
- d. Права нога
- e. Ліва нога

Правильна відповідь: Ліва нога

4. Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастродуоденоскопії.

- a. За 1 годину до обстеження треба випити барій
- b. Напередодні застосувати харчову клізму
- c. Вранці застосувати олійну клізму
- d. Дослідження проводиться натще
- e. Призначити розвантажувальну дієту

Правильна відповідь: Дослідження проводиться натще

5. Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- a. Порушення виділення плаценти
- b. Щільне прикріплення плаценти
- c. Защемлення плаценти
- d. Порушення зсідання крові
- e. Затримка частин плаценти

Правильна відповідь: Затримка частин плаценти

6. Вкажіть прояви дизуричного синдрому.

- a. Гіпертензія, набряки
- b. Позитивний симптом Пастернацького
- c. Альбумінурія, кетонурія
- d. Часте болісне сечовипускання
- e. Піурія, протеїнурія

Правильна відповідь: Часте болісне сечовипускання

7. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- a. Підвищення температури тіла

- b. Набряки на нижніх кінцівках
  - c. Пітливість
  - d. Набряки на обличчі
  - e. Крововиливи на шкірі
- Правильна відповідь: Набряки на нижніх кінцівках

8. Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.
- a. 10-15 хв
  - b. 30-40 хв
  - c. 1-2 хв
  - d. 5-7 хв
  - e. 50-60 хв
- Правильна відповідь: 10-15 хв

9. Вкажіть шлях уведення контрастної речовини в кровоносне русло під час проведення холецистографії?
- a. Сублінгвально
  - b. Внутрішньошкірно
  - c. Внутрішньом'язово
  - d. Підшкірно
  - e. Внутрішньовенно
- Правильна відповідь: Внутрішньовенно

10. Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?
- a. 18-20°C
  - b. 20-25°C
  - c. 39-40°C
  - d. 25-27°C
  - e. —
- Правильна відповідь: 39-40°C

11. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?
- a. Рецидиву захворювання
  - b. Печінкової недостатності
  - c. Генералізації інфекції
  - d. Розриву селезінки
  - e. Кишкової кровотечі
- Правильна відповідь: Кишкової кровотечі

12. Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?
- a. Сечокам'яної хвороби
  - b. Ниркової недостатності
  - c. Хронічного гломерулонефриту
  - d. Гострого пієлонефриту
  - e. Гострого гломерулонефриту
- Правильна відповідь: Гострого пієлонефриту

13. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?
- a. Цирозу печінки

- b. Хронічного атрофічного гастриту
  - c. Хронічного панкреатиту
  - d. Виразкової хвороби шлунку
  - e. Хронічного гіпертрофічного гастриту
- Правильна відповідь: Хронічного атрофічного гастриту

14. До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: обвід живота—98 см, ВСДМ—40 см, вислуховується серце-биття—146/хв справа вище від пупка і 160/хв зліва нижче пупка. Визначте вид вагітності.

- a. Переношена
- b. Багатоплідна
- c. Завмерла
- d. Несправжня
- e. Одноплідна

Правильна відповідь: Багатоплідна

15. До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26-27 тижнів, яка скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень з піхви вночі, в стані спокою. На момент огляду кровотеча припинилася, загальний стан задовільний. Який метод діагностики треба провести для уточнення діагнозу в цьому разі?

- a. Зовнішнє акушерське обстеження
- b. Трансвагінальне УЗД
- c. Амніоскопію
- d. Внутрішнє акушерське обстеження
- e. Кольпоскопію

Правильна відповідь: Трансвагінальне УЗД

16. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий біль в епігастральній ділянці, який виникає за 15-30 хв після вживання їжі. Захворювання пов'язує з нерегулярним харчуванням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки блідо-рожеві, язик вкритий білим нальотом. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Хронічного панкреатит
- b. Хронічного гіпоацидного гастриту
- c. Виразкової хвороби шлунку
- d. Раку шлунку
- e. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

Правильна відповідь: Виразкової хвороби шлунку

17. До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?

- a. Антиконвульсанти
- b. Транквілізатори
- c. Міорелаксанти
- d. Антидепресанти
- e. Ноотропи

Правильна відповідь: Транквілізатори

18. До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження під час виконання плану медсестринських втручань?

- a. Проби із затримкою дихання

- b. Велоергометрії
  - c. -
  - d. Кліноортостатичної проби
  - e. Атропінової проба
- Правильна відповідь: Велоергометрії

19. До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічний інсульт?

- a. Електрокардіографії
- b. Ехокардіографії
- c. Магнітно-резонансної томографії
- d. Рентгенографії кісток черепа
- e. Електроміографії

Правильна відповідь: Магнітно-резонансної томографії

20. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік.

Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці. Дихання часте, поверхнєве. Температура тіла—37,4оС. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно над легенями спостерігає-тьс я чіткий легеневий звук. Аускультативно вислуховується шум тертя плев-ри. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- a. Сухого плевриту
- b. Міжреберної невралгії
- c. Негоспітальної пневмонії
- d. Гострого бронхіту
- e. Ексудативного плевриту

Правильна відповідь: Сухого плевриту

21. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла—37,5оС, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд «ластів моржа». Який лабораторний показник найдоцільніше визначити в цьому разі?

- a. Ревматоїдний фактор
- b. Сечову кислоту
- c. АлАТ, АсАТ
- d. С-реактивний білок
- e. Білірубін

Правильна відповідь: Ревматоїдний фактор

22. Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної та смаженої їжі. Для якого синдрому характерні ці клінічні прояви?

- a. Больового синдрому
- b. Шлункової диспепсії
- c. Кишкової диспепсії
- d. Інтоксикаційного синдрому
- e. Астеновегетативного синдрому

Правильна відповідь: Шлункової диспепсії

23. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- a. -
- b. Гіпопластичної
- c. Фолієводефіцитної
- d. Гемолітичної
- e. Залізодефіцитної

Правильна відповідь: Залізодефіцитної

24. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження

- a. 19%
- b. 51%
- c. 25%
- d. 39%
- e. 37%

Правильна відповідь: 37%

25. Жінка після ДТП скаржиться на біль і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду виявлено вкорочення лівого надпліччя, його деформацію та набряк, згладження надключичної ямки. Для якого ушкодження характерні ці симптоми?

- a. Вивиху ключиці
- b. Забою у ділянці ключиці
- c. Відкритого перелому ключиці
- d. Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- e. Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків

Правильна відповідь: Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків

26. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- a. Регулярні перейми
- b. Часте сечовипускання
- c. Розкриття шийки матки
- d. Біль у ділянці крижів
- e. Опущення дна матки

Правильна відповідь: Регулярні перейми

27. Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у достатній кількості в раціоні харчування жінки?

- a. Борошняні вироби
- b. Овочі і фрукти
- c. Молочні продукти
- d. Морська капуста
- e. М'ясні продукти

Правильна відповідь: М'ясні продукти

28. З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- a. Для попередження підвищення температури тіла
- b. Для уникнення запаморочення
- c. Для кращої взаємодії з назальними краплями

- d. Для підсилення лікувального ефекту
  - e. Для попередження виникнення кашлю
- Правильна відповідь: Для уникнення запаморочення

29. За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?

- a. За 1 год.
- b. За 10 год
- c. —
- d. За добу
- e. За 8 год.

Правильна відповідь: За добу

30. На яку глибину вводиться газовідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?

- a. 5-10 см
- b. 15-20 см
- c. 10-15 см
- d. 3-4 см
- e. 20-30 см

Правильна відповідь: 20-30 см

31. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- a. III
- b. II
- c. —
- d. IV
- e. I

Правильна відповідь: II

32. Під час парентерального введення камфорної олії сестра медична після введення шприца відтягнула його поршень на себе. Профілактику якого ускладнення вона виконала?

- a. Некрозу
- b. Інфільтрату
- c. Медикаментозної емболії
- d. Гематоми
- e. Повітряної емболії

Правильна відповідь: Медикаментозної емболії

33. Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу на збільшення маси тіла пацієнта та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. Зробіть висновок за результатами обстеження.

- a. Порушення метаболізму
- b. Ожиріння
- c. Поява прихованих набряків
- d. —
- e. Зневоднення

Правильна відповідь: Поява прихованих набряків

34. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?

- a. Сухого плевриту
- b. Бронхоектатичної хвороби
- c. Туберкульозу легень
- d. Бронхіальної астми
- e. Гострого бронхіту

Правильна відповідь: Бронхіальної астми

35. Під час обстеження роділля виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над входом у малий таз розташована м'яка частина плода, яка не балотує і не має чітких контурів. Яке розташування плода у порожнині матки?

- a. Задній вид, головне передлежання
- b. Задній вид, тазове передлежання
- c. Друга позиція, головне передлежання
- d. Перша позиція, тазове передлежання
- e. Друга позиція, тазове передлежання

Правильна відповідь: Друга позиція, тазове передлежання

36. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- a. Дихання Чейна-Стокса
- b. Дихання Біота
- c. Експіраторна задишка
- d. Дихання Куссмауля
- e. Інспіраторна задишка

Правильна відповідь: Дихання Біота

37. Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС — 120/хв, дихання регулярне, крик голосний, шкіра рожева, рухи активні, реакція на подразники жвава. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.

- a. 5 балів
- b. 7 балів
- c. 4 бали
- d. 10 балів
- e. 2 бали

Правильна відповідь: 10 балів

38. Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції?

- a. 45°
- b. 90°
- c. 15°
- d. 70°
- e. 30°

Правильна відповідь: 90°

39. Після роботи з електроприладами чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром 4 мм. Який вид електротравми виник у чоловіка?

- a. Опік

b. Електроофтальмія

c. —

d. Знак

e. Металізація

Правильна відповідь: Знак

40. Пацієнту віком 38 років сімейним лікарем призначено внутрішньом'язові ін'єкції біциліну-5. Розчин якого препарату використовується для проведення внутрішньошкірної проби на індивідуальну чутливість до біциліну-5?

a. Бензилпеніциліну натрієвої солі

b. Амоксициліну

c. Цефазоліну

d. Канаміцину

e. Стрептоміцину сульфату

Правильна відповідь: Бензилпеніциліну натрієвої солі

41. Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба I ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату магнію. Яка методика проведення процедури використовується у цьому разі?

a. Електрофорез за Вермелем

b. Гальванічний комір за Щербаком

c. Півмаска Бергоньє

d. —

e. Електрофорез по Келату

Правильна відповідь: Гальванічний комір за Щербаком

42. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 000 ОД). Сестра медична розчинила його у співвідношенні 1 : 2 (1 мл розчинника на 200 000 ОД антибіотика). Який об'єм лікарського засобу треба увести пацієнту внутрішньом'язово?

a. 8 мл

b. 10 мл

c. 5 мл

d. 4 мл

e. 3 мл

Правильна відповідь: 4 мл

43. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100/хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

a. УЗД щитоподібної залози

b. Аналіз крові на глюкозу

c. Загальний аналіз крові

d. Аналіз крові на тиреоїдні гормони

e. МРТ головного мозку

Правильна відповідь: Аналіз крові на тиреоїдні гормони



44. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Поліурія
- b. Ніктурія
- c. Олігурія
- d. Ниркова колька
- e. Гостра затримка сечі

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі

45. Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру, а потім мізерні, з домішками слизу та крові по типу «ректального плевка»). Під час пальпації живота спостерігається біль та виражений спазм у ділянці сигмоподібної кишки. З боку інших органів патології не виявлено. Який лабораторний метод діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу?

- a. Біохімічний аналіз крові
  - b. Бактеріологічний
  - c. Аналіз крові на глюкозу
  - d. Копрологічний
  - e. Загальний аналіз крові
- Правильна відповідь: Бактеріологічний

46. Пацієнт скаржиться на надсадний кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання. Попередній діагноз — рак легень. До якого обстеження треба підготувати пацієнта для уточнення діагнозу

- a. Колоноскопії
- b. Бронхоскопії з біопсією
- c. ФГДС із біопсією
- d. Тригоскопії
- e. Електрокардіографії

Правильна відповідь: Бронхоскопії з біопсією

47. Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З анамнезу відомо, що тиждень тому повернувся з Африки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 40°C, шкіра обличчя гіперемована, у легенях жорстке дихання, живіт пальпаторно безболісний, печінка та селезінка збільшені. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Вірусного гепатиту
- b. Висипного тифу
- c. Лептоспірозу
- d. Малярії
- e. Грипу

Правильна відповідь: Малярії

48. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у суглобах упродовж двох тижнів. З анамнезу відомо, що чоловік вживає ін'єкційні наркотики. Під час об'єктивного обстеження виявлено: жовтяниця шкіри і склер, збільшення печінки та селезінки, сеча темного кольору, випорожнення знебарвлені. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- a. Висипного тифу
- b. ВІЛ-інфекції
- c. Лептоспірозу

- d. Кишкового ієрсиніозу
  - e. Вірусного гепатиту С
- Правильна відповідь: Вірусного гепатиту С

49. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної у цьому разі?

- a. Третій контейнер залишити порожнім
- b. Увести пацієнту сечогінний препарат
- c. Виконати катетеризацію сечового міхура
- d. Дати пацієнту випити води
- e. Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання

Правильна відповідь: Третій контейнер залишити порожнім

50. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом моротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Вогнищевої пневмонії
- b. Гострого бронхіту
- c. Раку легень
- d. Пневмосклерозу
- e. Абсцесу легень

Правильна відповідь: Абсцесу легень

51. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- a. Гострий холецистит
- b. Парез кишечника
- c. Гострий аднексит
- d. Гострий панкреатит
- e. Гострий перитоніт

Правильна відповідь: Парез кишечника

52. Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатності та пам'яті, мерзлякуватість, підвищену сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, не береться в складку, волосся сухе, ламке, випадає. Пульс — 54/хв, ритмічний, АТ— 100/60 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Гіпотиреозу
- b. Атеросклерозу
- c. Гіпертиреозу
- d. Цукрового діабету
- e. Акромегалії

Правильна відповідь: Гіпотиреозу

53. Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методикою Вермеля. Як треба розташувати електроди у цьому разі?

- a. Один електрод на потилицю, другий - на попереково-крижову ділянку
- b. Обидва електроди між правою та лівою лопатками

- c. Один електрод між лопатками, другий - на грудну клітку
  - d. Один електрод між лопатками, другий - на литкові м'язи
  - e. Один електрод на низ живота, другий - на попереково-крижову ділянку
- Правильна відповідь: Один електрод між лопатками, другий - на литкові м'язи

54. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього захворювання?

- a. Жовтувато-зеленуватий
  - b. Безбарвний
  - c. Каламутний
  - d. Прозорий
  - e. Червоний
- Правильна відповідь: Червоний

55. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Скільки мілілітрів препарату треба набрати в шприц для виконання ін'єкції?

- a. 0,5 мл
- b. 1 мл
- c. 3 мл
- d. 1,5 мл
- e. 2 мл

Правильна відповідь: 1,5 мл

56. Породілля в ранньому післяпологовому періоді перебуває в пологовій залі. Як часто треба виконувати зовнішній масаж матки для профілактики кровотечі?

- a. Кожні 15 хвилин
- b. Кожні 10 хвилин
- c. Кожні 5 хвилин
- d. Кожні 60 хвилин
- e. Кожні 30 хвилин

Правильна відповідь: Кожні 30 хвилин

57. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчували в повітрі спе-цифічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися сльозотеча, різі в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- a. Фосгеном
- b. Аміаком
- c. Вуглецю оксидом
- d. Сірководнем
- e. Хлором

Правильна відповідь: Сірководнем

58. Семирічна дитина скаржить на біль в епігастрії, періодичні нудоту, відрижку повітрям, печію, відчуття важкості у шлунку. Які особливості підготовки дитини до дослідження на *Helicobacter Pylori*?

- a. Припинити приймання антибіотиків за 4-6 тижнів до дослідження
- b. Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням
- c. Застосувати очисну клізму напередодні
- d. Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження

е. Перед обстеженням збільшити вживання рідини

Правильна відповідь: Припинити приймання антибіотиків за 4-6 тижнів до дослідження

59. Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла 2300 г до щеплення проти туберкульозу. Яку вакцину вона застосує?

- a. БЦЖ-М
- b. «Пентаксім»
- c. БЦЖ
- d. «Інфанрікс»
- e. «Пріорікс»

Правильна відповідь: БЦЖ-М

60. Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- a. Заліза
- b. Кальцію
- c. Калію
- d. Магнію
- e. Натрію

Правильна відповідь: Калію

61. У дівчини за декілька місяців після початку статевого життя у ділянці великих статевих губ з'явилися сосочко-подібні розростання. Який збудник, найімовірніше, спричинив цю патологію?

- a. Трихомонада
- b. Папіломавірус
- c. Гарднерела
- d. Протей
- e. Хламідія

Правильна відповідь: Папіломавірус

62. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Токсикодермії
- b. Екземи
- c. Дерматиту
- d. Висівкоподібного лишая
- e. Мікроспорії

Правильна відповідь: Висівкоподібного лишая

63. У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла — 500 г за тиждень та підвищення АТ — 150/90 мм рт. ст. Яке додаткове лабораторне дослідження треба провести жінці насамперед?

- a. Бактеріологічне дослідження сечі
- b. Загальний аналіз крові
- c. Коагулограма
- d. Біохімічний аналіз крові
- e. Визначення білка в сечі

Правильна відповідь: Визначення білка в сечі

64. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття 160/хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- b. Неповне передлежання плаценти
- c. Аборт у ході
- d. Загроза розриву матки
- e. Розрив матки, що відбувся

Правильна відповідь: Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

65. У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: шийка матки розкрита на 8 см, внутрішнє вічко на 1/3 перекрите м'якою, губчастою тканиною, поруч пальпується навколоплідний міхур. У роділлі спостерігається активна пологова діяльність. Вкажіть вид передлежання плаценти.

- a. Центральне
- b. Бокове
- c. Низьке
- d. Крайове
- e. Оболонкове

Правильна відповідь: Крайове

66. У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини ма-тки підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися біль унизу живота та слизово-гнійні виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка збільшена, болюча, м'яка. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування цього ускладнення?

- a. Седативні
- b. Антибактеріальні
- c. Глюкокортикоїди
- d. Гемостатики
- e. Цитостатики

Правильна відповідь: Антибактеріальні

67. У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться для уточнення діагнозу?

- a. Аналіз крові на білірубін
- b. Аналіз крові на креатинін
- c. Аналіз калу на приховану кров
- d. Аналіз сечі на а-амілазу
- e. Аналіз сечі на глюкозу

Правильна відповідь: Аналіз сечі на а-амілазу

68. У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість шкіри, загострення рис обличчя, блювання «фонтаном», діарея більше 15 разів на добу, періодичні судомні. Випорожнення водянисті, каламутні, з білими пластівцями. Який механізм розвитку діареї у пацієнта?

- a. Ексудативний
- b. Секреторний

- c. Запальний
- d. Інвазивний
- e. Осмотичний

Правильна відповідь: Осмотичний

69. У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із підвищенням м'язового тону та фізіологічних рефлексів. Який це вид рухового порушення?

- a. Центральний геміпарез
- b. Центральна геміплегія
- c. Центральний парапарез
- d. Периферична геміплегія
- e. Периферичний геміпарез

Правильна відповідь: Центральний геміпарез

70. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Яку тактику треба застосувати сестрі медичній для зниження температури пацієнту?

- a. Поставити банки
- b. Обкласти грілками
- c. Накласти зігрівальний компрес
- d. Поставити гірчичники
- e. Фізичні методи охолодження

Правильна відповідь: Фізичні методи охолодження

71. У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характерний для цього патологічного стану?

- a. Аміачний запах з рота
- b. Підвищення апетиту
- c. Гіперемія шкірних покривів
- d. Підвищення температури тіла
- e. Збільшення лімфатичних вузлів

Правильна відповідь: Аміачний запах з рота

72. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла, шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігаються у разі цього невідкладного стану?

- a. Тахікардія, зниження АТ
- b. Брадикардія, зниження АТ
- c. Аритмія, АТ не змінюється
- d. Брадикардія, підвищення АТ
- e. Тахікардія, підвищення АТ

Правильна відповідь: Тахікардія, зниження АТ

73. У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівномірне розподілення жирової тканини. Який це вид ожиріння?

- a. Церебральне
- b. Аліментарно-конституційне
- c. Диспластичне
- d. Гіпотиреоїдне
- e. —

Правильна відповідь: Аліментарно-конституційне

74. У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Який спосіб уведення цієї вакцини?

- a. Перорально
- b. Підшкірно
- c. Внутрішньошкірно
- d. Внутрішньовенно
- e. Внутрішньом'язово

Правильна відповідь: Внутрішньошкірно

75. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Матка м'яка, погано скорочується, під час огляду плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується у цьому разі?

- a. Огляд пологових шляхів
- b. зовнішній масаж матки
- c. Введення токолітичних препаратів
- d. Масаж матки на кулаці
- e. Ручна ревізія порожнини матки

Правильна відповідь: Ручна ревізія порожнини матки

76. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Спазмофілії
- b. Рахіту
- c. Алергічного діатезу
- d. Гіпотрофії
- e. Гіпервітамінозу

Правильна відповідь: Рахіту

77. У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке підвищення артеріального тиску (АТ—160/100 мм рт.ст). Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Стенокардія
- b. Артеріальна гіпертензія
- c. Інфаркт міокарда
- d. Серцева астма
- e. Ішемічний інсульт

Правильна відповідь: Артеріальна гіпертензія

78. У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишки та кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- a. Бронхіальної астми
- b. Туберкульозу
- c. Серцевої астми
- d. набряку легень
- e. Інфаркту міокарда

Правильна відповідь: набряку легень

79. У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути свистячі хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Напад ларингостенозу
- b. Напад бронхіальної астми
- c. Напад серцевої астми
- d. Набряк Квінке
- e. Напад ниркової кольки

Правильна відповідь: Напад бронхіальної астми

80. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- a. Кандидозу
- b. Сикозу
- c. Фурункулу
- d. Мікроспорії
- e. Імпетиго

Правильна відповідь: Сикозу

81. У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла 39-40°C, спостерігається дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a. Пенетрація
- b. Шлункова кровотеча
- c. Бактеріальний перитоніт
- d. Перфорація
- e. Печінкова кома

Правильна відповідь: Печінкова кома

82. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- a. Накладання артеріального джгута
- b. Тиснуча пов'язка
- c. Підвищене положення кінцівки
- d. Туга тампонада рани
- e. Максимальне згинання кінцівки в суглобі

Правильна відповідь: Накладання артеріального джгута

83. У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болісне сечовипускання, виділення кров'янистої сечі. Пацієнт збуджений, спостерігається блювання. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Харчове отруєння
- b. Гостра затримка сечі
- c. —
- d. Напад ниркової кольки
- e. Напад жовчної кольки

Правильна відповідь: Напад ниркової кольки



84. У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал треба взяти для проведення лабораторного дослідження у цьому разі?

- a. Мокротиння
- b. Промивні води шлунку
- c. Слиз методом «кашльових пластинок»
- d. Промивні води бронхів
- e. Змиви із носоглотки

Правильна відповідь: Слиз методом «кашльових пластинок»

85. У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, дихання утруднене, обличчя бліде та набрякле, ціаноз губ. Пульс—86/хв, ритмічний, АТ—120/80 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Синдром Лайєлла
- b. набряк Квінке
- c. Анафілактичний шок
- d. Астматичний стан
- e. Кропив'янка

Правильна відповідь: набряк Квінке

86. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- a. Імунологічній
- b. Бактеріологічній
- c. Клінічній
- d. Вірусологічній
- e. Біохімічній

Правильна відповідь: Вірусологічній

87. Ускладненням якого захворювання є кретинізм?

- a. Нецукрового діабету
- b. Вродженого гіпотиреозу
- c. Хвороби Аддісона
- d. Цукрового діабету
- e. Хвороби Іценко-Кушинга

Правильна відповідь: Вродженого гіпотиреозу

88. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. —
- b. Розчином бетадину
- c. Розчином фурациліну
- d. Мильним розчином
- e. 10% розчином натрію хлориду

Правильна відповідь: Мильним розчином

89. Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліве плече та ліву лопатку. Біль триває упродовж двох годин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизо-ві оболонки бліді, ціаноз губ, пульс—84/хв, ритмічний, АТ —130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається

патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1- V2. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- a. —
- b. Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма
- c. Q-інфаркт міокарда, астматична форма
- d. Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма
- e. Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма

Правильна відповідь: Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма

90. Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спостерігається блювання. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначається ригідність потиличних м'язів. Артеріальний тиск — 200/110 мм рт. ст. Отриманий у результаті люмбальної пункції ліквор забарвлений кров'ю. Для якого захворювання це характерно?

- a. Дисциркуляторної енцефалопатії
- b. Субарахноїдального крововиливу
- c. Транзиторного порушення мозкового кровообігу
- d. Ішемічного інсульту
- e. Геморагічного інсульту

Правильна відповідь: Субарахноїдального крововиливу

91. Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, обличчя гіперемоване, пульс — 92/хв, напружений, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст., тони серця ослаблені, акцент другого тону над аортою. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

- a. Кордіамін
- b. Анальгін
- c. Магнію сульфат
- d. Димедрол
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Магнію сульфат

92. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Хронічного холециститу
- b. Жовчнокам'яної хвороби
- c. Цирозу печінки
- d. Вірусного гепатиту
- e. Хронічного гепатиту

Правильна відповідь: Цирозу печінки

93. Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться на біль в епігастрії постійного характеру, що іррадіює в спину, значне схуднення, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?

- a. Малігнізація
- b. Пілоростеноз
- c. Шлункова кровотеча

d. Перфорація

e. Пенетрація

Правильна відповідь: Малігнізація

94. Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, слабкість, задишку та появу нестерпного болю в ділянці серця, що поширюється на ліву руку та не проходить після приймання нітрогліцерину. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

a. Серцевої астми

b. Стенокардії

c. Пневмонії

d. Артеріальної гіпертензії

e. Інфаркту міокарда

Правильна відповідь: Інфаркту міокарда

95. Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Під час огляду виявлено щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7-8 см, різко болючий під час пальпації, покритий дрібними множинними отворами, з яких виділяється гнійна рідина. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

a. Фурункулу

b. Дерматофітії

c. Карбункулу

d. Бешихи

e. Контагіозного молюска

Правильна відповідь: Карбункулу

96. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт приймає участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

a. УЗД

b. Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини

c. Колоноскопія

d. Іригоскопія

e. Комп'ютерна томографія

Правильна відповідь: Колоноскопія

97. Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ — 120/80 мм рт.ст, пульс — 82 уд/хв. Яке захворювання розвинулося у чоловіка?

a. Набряк Квінке

b. Геморагічний васкуліт

c. Анафілактичний шок

d. Кропив'янка

e. Короста

Правильна відповідь: Кропив'янка

98. Чоловік скаржиться на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту. Пацієнт збуджений, метушливий. Під час огляду шкірні покриви

бліді, симптом Пастернацького позитивний з правого боку. Яку тактику треба застосувати насамперед для полегшення стану пацієнта?

- a. Уведення спазмолітичних препаратів
- b. Холод на поперекову ділянку
- c. Уведення сечогінних препаратів
- d. Уведення знеболювальних засобів
- e. Тепло на поперекову ділянку

Правильна відповідь: Тепло на поперекову ділянку

99. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Під час огляду виявлено: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні плями та бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками, незначний свербіж. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Червоного плоского лишая
- b. Нейродерміту
- c. Системного червоного вовчака
- d. Псоріазу
- e. -

Правильна відповідь: Псоріазу

100. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110/хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання допомоги?

- a. На лівому боці, з відхиленою назад головою
- b. На правому боці, з відхиленою назад головою
- c. На животі, з повернутою на бік головою
- d. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- e. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка

Правильна відповідь: На спині, з піднятим головним кінцем ліжка

101. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- a. Бактеріостатична
- b. Спазмолітична
- c. Антисекреторна
- d. Бактерицидна
- e. Антигістамінна

Правильна відповідь: Антисекреторна

102. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- a. «Холодний абсцес»
- b. Інфільтрат
- c. Виразка
- d. Олійна емболія
- e. Ліподистрофія

Правильна відповідь: «Холодний абсцес»

103. Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниження працездатності працівника?

- a. Шкідливий
- b. —
- c. Допустимий
- d. Небезпечний
- e. Оптимальний

Правильна відповідь: Шкідливий

104. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- a. Ректороманоскопія
- b. Бронхоскопія
- c. Езофагогастродуоденоскопія
- d. Цистоскопія
- e. Колоноскопія

Правильна відповідь: Цистоскопія

105. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- a. Спірографія
- b. УЗД легень
- c. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- d. Бронхоскопія
- e. Шкірні алергологічні тести

Правильна відповідь: Спірографія

106. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- a. Легенева кровотеча
- b. Анафілактичний шок
- c. Кардіогенний шок
- d. Астматичний статус
- e. набряк легень

Правильна відповідь: Астматичний статус

107. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості у ньому?

- a. Поліартрит
- b. Артроз
- c. Полікістоз
- d. Арталгія
- e. Артрит

Правильна відповідь: Арталгія

108. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- a. Поліурія
- b. Дизурія
- c. Полакіурія
- d. Ніктурія

е. Олігурія

Правильна відповідь: Олігурія

109. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- a. Гістероскопія
- b. Кольпоскопія
- c. Лапароскопія
- d. Пертубація
- e. Гідротубація

Правильна відповідь: Гідротубація

110. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- a. Прямий
- b. —
- c. Косий
- d. Поперечний
- e. Інтерспінальний

Правильна відповідь: Прямий

111. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- a. Амбулаторія
- b. Клініка
- c. Поліклініка
- d. Хоспіс
- e. Санаторій

Правильна відповідь: Хоспіс

112. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?

- a. Невербальна
- b. Офіційна
- c. Вербальна
- d. Виховна
- e. Дистанційна

Правильна відповідь: Вербальна

113. Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсультом?

- a. Профілактику гіпостатичної пневмонії
  - b. Уведення протиблювотних засобів
  - c. Зняття ЕКГ
  - d. Уведення анальгетиків
  - e. Промивання шлунку
- Правильна відповідь: Профілактику гіпостатичної пневмонії

114. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- a. Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- b. Гіпертермія, гіпотензія

- c. Анурія, свербіж шкіри
  - d. Гарячка, часте і болісне сечовипускан-ня
  - e. Гіпертензія, набряки
- Правильна відповідь: Гіпертензія, набряки

115. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- a. Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помийв»
- b. Анурія, свербіж шкіри
- c. Гіпертензія, набряки
- d. —
- e. Гарячка, біль у поперековій ділянці

Правильна відповідь: Гарячка, біль у поперековій ділянці

116. Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?

- a. Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- b. Маскоподібне обличчя, рот у вигляді «кисету»
- c. Параорбітальний набряк із пігментацією
- d. Еритематозна висипка на обличчі у вигляді «метелика»
- e. Деформації пальців рук у вигляді «плавників моржа»

Правильна відповідь: Маскоподібне обличчя, рот у вигляді «кисету»

117. Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після струмектомії або тиреоїдектомії?

- a. Наркотичні анальгетики
- b. Тиреоїдні гормони
- c. Антибіотики
- d. Антидепресанти
- e. Транквілізатори

Правильна відповідь: Тиреоїдні гормони

118. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- a. Артеріальний тиск
- b. Частота, тривалість та інтенсивність перейм
- c. Частота та ритмічність пульсу
- d. Температура тіла
- e. Серцебиття плода

Правильна відповідь: Частота, тривалість та інтенсивність перейм

119. Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?

- a. Каву, міцний чай
- b. М'ясо, печінку
- c. Яблука, гарбуз
- d. Капусту, бобові
- e. Яйця, гречану крупу

Правильна відповідь: Капусту, бобові

120. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- a. УФО
- b. Зігрівальний компрес
- c. Фототерапію

- d. ЛФК, масаж
- e. Гірудотерапію

Правильна відповідь: ЛФК, масаж

121. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- a. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- b. Передня поверхня стегна
- c. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- d. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- e. Підлопаткова ділянка

Правильна відповідь: Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча

122. Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?

- a. Ноотропи
- b. Антikonвульсанти
- c. Міорелаксанти
- d. Антихолінестеразні
- e. Кортикостероїди

Правильна відповідь: Антихолінестеразні

123. Яка дія електричного струму проявляється у подразненні та збудженні тканин організму людини?

- a. Термічна
- b. Механічна
- c. -
- d. Біологічна
- e. Електролітична

Правильна відповідь: Біологічна

124. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування алергічних захворювань?

- a. Антидепресанти
- b. Антигістамінні
- c. Антациди
- d. Антиагреганти
- e. Антагоністи кальцію

Правильна відповідь: Антигістамінні

125. Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного обстеження товстої кишки?

- a. Верографін
- b. Холевід
- c. Біліграфін
- d. Барію сульфат
- e. Уротраст

Правильна відповідь: Барію сульфат

126. Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

- a. Шлункова



- b. Кишкова
- c. —
- d. Легенева
- e. Носова

Правильна відповідь: Легенева

127. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- a. NIHSS
- b. MMSE
- c. FAST
- d. ABCDE
- e. NRS

Правильна відповідь: FAST

128. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- a. Тригоскопію
- b. УЗД
- c. Холецистографію
- d. Ректороманоскопію
- e. Бронхоскопію

Правильна відповідь: УЗД

129. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- a. На лівому боці
- b. На спині, з припіднятими ногами
- c. Напівсидяче
- d. На спині, з повернутою на бік головою
- e. На животі

Правильна відповідь: На спині, з повернутою на бік головою

130. Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі уведення інсуліну в одне й теж місце?

- a. Абсцес
- b. Гематома
- c. Некроз
- d. Ліподистрофія
- e. Інфільтрат

Правильна відповідь: Ліподистрофія

131. Яке ускладнення розвивається внаслідок потрапляння олійного розчину в просвіт судини під час виконання підшкірної ін'єкції?

- a. Алергічна реакція
- b. Жирова емболія
- c. Інфільтрат
- d. Абсцес
- e. Гематома

Правильна відповідь: Жирова емболія

132. Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артриту?

- a. Астенія
- b. Гарячка
- c. Адинамія
- d. Невралгія
- e. Анкілоз

Правильна відповідь: Анкілоз

133. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?

- a. Біохімічний аналіз крові
- b. Стернальна пункція
- c. Спірометрія
- d. Рентгенографія органів грудної клітки
- e. Загальний аналіз крові

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

134. Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?

- a. Склоподібне
- b. «Малинового желе»
- c. «Перлинне»
- d. «Іржаве»
- e. Пінисте рожеве

Правильна відповідь: «Малинового желе»

135. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- a. Внутрішньокісткова
- b. За Оберстом-Лукашевичем
- c. Термінальна
- d. Інфільтраційна
- e. За Вишневським

Правильна відповідь: За Оберстом-Лукашевичем

136. Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

- a. Хірургічна стерилізація
- b. Презерватив
- c. Внутрішньоматкова спіраль
- d. Сперміциди
- e. Шийковий ковпачок

Правильна відповідь: Презерватив

137. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- a. Анаеробні коки
- b. Епідермальний стафілокок
- c. Протей
- d. Золотистий стафілокок
- e. Стрептокок

Правильна відповідь: Золотистий стафілокок

138. Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів?

- a. Інсулін
- b. Новокаїн
- c. Глюкоза
- d. Мерказоліл
- e. Преднізолон

Правильна відповідь: Мерказоліл

139. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнту з анафілактичним шоком?

- a. Диклофенак
- b. Епінефрин
- c. Еритроміцин
- d. Атропін
- e. Ампіцилін

Правильна відповідь: Епінефрин

140. Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?

- a. Коагулограма
- b. Стернальна пункція
- c. Загальний аналіз сечі
- d. Біохімічний аналіз крові
- e. Імунологічний аналіз крові

Правильна відповідь: Стернальна пункція

141. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- a. За Аддіс-Каковським
- b. За Зимницьким
- c. —
- d. За Амбурже
- e. За Нечипоренко

Правильна відповідь: За Зимницьким

142. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- a. Інструментальний
- b. Візуальний
- c. Бактеріологічний
- d. Хімічний
- e. Фізичний

Правильна відповідь: Бактеріологічний

143. Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для усунення психомоторного збудження, що супроводжується галюцинаціями та маячними ідеями?

- a. Пірацетам
- b. Димедрол
- c. Налоксон
- d. Аміназин
- e. Натрію оксибутират

Правильна відповідь: Аміназин

144. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

- a. 2% р-н натрію гідрокарбонату
- b. 6% р-н перекису водню
- c. 0,02% р-н фурациліну
- d. 5% р-н глюкози
- e. 3% р-н хлораміну

Правильна відповідь: 0,02% р-н фурациліну

145. Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?

- a. Бабінського
- b. Щоткіна-Блюмберга
- c. Пастернацького
- d. Кера
- e. Ортнера

Правильна відповідь: Пастернацького

146. Який спеціальний інструмент треба підготувати сестрі медичній для аспіраційної біопсії слизової оболонки матки?

- a. Скальпель
- b. Корцанг
- c. Пайпель
- d. Конхотом
- e. Пінцет

Правильна відповідь: Пайпель

147. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- a. Ціаноз шкіри
- b. Свербіж шкіри
- c. Іктеричність шкіри
- d. Мерзлякуватість
- e. Сльозотеча

Правильна відповідь: Свербіж шкіри

148. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?

- a. Крепітація
- b. Інспіраторна задишка
- c. Шум тертя плеври
- d. Експіраторна задишка
- e. Біль у грудній клітці

Правильна відповідь: Експіраторна задишка

149. Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено наявність сечокислих каменів у нирках?

- a. Сульфатну
- b. Гідрокарбонатну (лужну)
- c. Хлоридну
- d. Вуглекислу
- e. Сірководневу

Правильна відповідь: Гідрокарбонатну (лужну)

150. Яким способом проводиться дренажування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу?

- a. Стрічковим дренажем
  - b. По Суботіну
  - c. По Бюлау
  - d. Мікроіригатором
  - e. Трубчастим дренажем
- Правильна відповідь: По Бюлау